

نکات فصل 1 .. ایمنی بدن

- در پیرامون ما انواع میکروب های بیماری زا وجود دارد (باکتری ها .. قارچ ها .. ویروس ها .. آغازیان) . (1)
- دستگاه ایمنی ما بیشتر اوقات مانع از فعالیت عوامل بیماری زا و بروز بیماری می شود . (2)
- به دفاع بدن در مقابل عوامل بیگانه ایمنی گفته می شود . (3)
- دستگاه ایمنی ، دستگاهی است که اجزای تشکیل دهنده آن در سراسر بدن پراکنده‌اند و به طور مداوم و هماهنگ با هم مولکول ها و سلول های بیگانه را شناسایی می کنند و آنها را : 1- یا از بین می بوند 2- یا بی خطر می کنند . (4)

mekanisem hāy Dafā'ع

- بدن ما با دو روش : 1- دفاع غیر اختصاصی 2- دفاع اختصاصی از خود دفاع می کنند . (5)

Dafā'ع غیر اختصاصی

- دفاع غیر اختصاصی نخستین خط دفاعی در مقابل هجوم میکروب ها به بدن است . (6)
- این مکانیسم در برابر اغلب میکروب ها یکسان عمل می کند و نمی تواند میکروب های مختلف را از یکدیگر شناسایی کند (به همین جهت غیر اختصاصی می باشد) . (7)
- دفاع غیر اختصاصی خود شامل دو خط دفاعی است : 1- نخست پوست و لایه های مخاطی 2- پاسخ التهابی .. پاسخ دمایی .. گلbul های سفید .. پروتئین ها (8)

Nekat-e-Nazaran-e-Dafā'ع غیر اختصاصی

- لایه های شاخی پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن می شوند . (9)
- چربی و عرق پوست ، سطح پوست را اسیدی کرده و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری می کنند . (10)
- آنزیم لیزوژیمی که در عرق وجود دارد ، دیواره سلولی باکتری ها را تخریب کرده و باکتری ها را از بین می برد . (11)
- سطح داخلی لوله گوارش ، مجرای تنفسی و مجراهای ادراری لایه شاخی ندارند اما از لایه مخاطی پوشیده شده اند . (12)
- مایعی مخاطی که از این لایه ها ترشح می شوند علاوه بر لیزوژیمی که دارند ، میکروب ها را نیز به دام می اندازند و مانع نفوذ آنها به بخش های عمیق تر می شود . (13)

- (14) در مجاری تنفسی مایع مخاطی میکروب‌ها را به دام می‌اندازد به کمک **مزک‌های سلول‌های مجرما** آنها را به سمت بالا یعنی حلق می‌راند که در آنجا یا از بدن خارج می‌شود و یا اینکه بلعیده می‌شود و در اثر **شیره** معده میکروب‌ها از بین می‌روند.
- (15) لیزوزیم موجود در **اشک و بzac**، میکروب‌ها را از بین می‌برد.
- (16) عطسه و سرفه میکروب‌ها را دفع می‌کند.
- (17) میکروب‌ها از طریق **دفع ادرار و مدفوع** از بدن دور می‌شوند.
- ### دومین خط دفاع غیر اختصاصی
- (18) اگر میکروب‌ها به نحوی از خط اول دفاعی عبور کنند، آنگاه با دومین خط دفاعی غیر اختصاصی روبرو می‌شوند.
- (19) دومین خط دفاعی ۴ مکانیسم دارد: **۱- پاسخ التهابی ۲- پاسخ دمایی ۳- گلبول‌های سفید ۴- پروتئین‌ها**
- (20) **پاسخ التهابی**، پاسخی است موضعی که به دنبال خراش یا بریدگی یا هر نوع آسیب بافتی دیگر بروز می‌کند.
- (21) **پاسخ التهابی** باعث **سرکوب عفونت و تسریع بهبودی** می‌شود.
- (22) در **پاسخ التهابی** سلول‌های آسیب دیده ماده‌ای به نام **هیستامین** تولید می‌کنند که **موجب گشادی رگ‌ها** و افزایش حجم خون در محل آسیب دیده می‌شود.
- (23) غیر از **هیستامین** **ترکیبات شیمیایی دیگری** در محل آسیب تولید می‌شود که برخی از آنها **گلبول‌های سفید خون** را متوجه خود می‌کنند.
- (24) **گلبول‌های سفید به ویژه نوتروفیل‌ها** طی **دیاپذ** به محل عفونت می‌روند.
- (25) **نوتروفیل** به همراه **ماکروفازهای بافتی** به عوامل بیماری زا حمله می‌کنند و می‌کوشند تا عفونت را سرکوب کنندو مانع از انتشار عوامل بیماری زا و آسیب سایر بافت‌ها می‌شوند.
- (26) **ماکروفازها** علاوه بر **فاگوسیتوز** میکروب‌های مهاجم، بدن را از سلول‌های مرده و اجزای سلولی فرسوده پاکسازی می‌کنند.
- (27) علائم التهابی عبارتند از: **قرمزی .. تورم و گرم** تر بودن محل آسیب دیده.
- (28) در برخی آسیب‌های بافتی و عفونت‌ها مایعی به نام **چرک** به وجود می‌آید که شامل **گلبول‌های سفید .. سلول‌ها و میکروب‌های کشته شده است.**
- (29) **تب** حالتی است که در آن دمای بدن بیشتر به دلیل عواملی مانند **عوامل بیماری زا** یا مانند آنها افزایش می‌یابد.
- (30) **تب نشانهء مبارزهء بدن** در برابر عوامل بیماری زا است.
- (31) بسیاری از عوامل بیماری زا در **گرمای حاصل از تب نمی‌توانند به خوبی رشد کنند.**
- (32) مهمترین بخش دفاع غیر اختصاصی بدن در برابر میکروب‌ها، **گلبول‌های سفید** هستند که **فاگوسیت** نامیده می‌شوند.
- (33) **نوتروفیل‌ها و ماکروفازهای** در **گروه فاگوسیت‌ها** قرار دارند.

فاگوسیت ها از طریق **فاگوسیتوz** (ذره خواری) میکروب ها را می بلعند و متلاشی می کنند. (34)

فاگوسیتوz فرآیندی است که در آن ذرات خارجی و میکروب ها توسط غشای سلول احاطه و به صورت یک **وزیکول** وارد سلول می شوند ، سپس در آنجا به کمک آنزیم های لیزوزومی هضم می شوند. (35)

انواعی از پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت دارند که برخی از آنها **پروتئین های مکمل** نامیده می شوند. (36)

نام مکمل به خاطر این است که کار بعضی از اجزای دستگاه ایمنی را تکمیل می کنند. (37)

پروتئین های مکمل در خون هستند و توسط ماکروفازها و سلول های پوششی روده و کبد ساخته می شوند. (38)

پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب ها فعال می شوند و با کمک یکدیگر ساختارهایی حلقه مانند ایجاد می کنند ، این ساختارها منافذی در غشای میکروب ها ایجاد می کند در نتیجه باعث نشت مواد درون سلول ها به خارج از سلول و سرانجام مرگ سلول مهاجم می شوند.

پروتئین دیگر **ایترفرون** است که توسط سلول های آلووده به ویروس تولید می شود. (40)

ایترفرون تولیدی ، از تکثیر ویروس ها در سلول های دیگر جلوگیری می کند و موجب **مقاومت سلول های سالم** در برابر ویروس می شود. (41)

سلول های آلووده به ویروس که ایترفرون تولید می کنند خود از بین می روند. (42)

ایترفرونی که در پاسخ به یک نوع ویروس تولید می شود سبب **مقاومت کوتاه مدت** در برابر بسیاری از ویروس های دیگر نیز می شود. (43)

دفاع اختصاصی

میکروب هایی که از تأثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده‌اند ، سرانجام با **دفاع اختصاصی** روبرو می شوند. (44)

در دفاع اختصاصی گروهی از گلبول های سفید به نام **لنسفوسیت ها** دخالت دارند . (45)

لنسفوسیت ها به طور **اختصاصی** عمل می کنند ، یعنی اینکه یک نوع میکروب خاص را از سایر میکروب ها شناسایی و با آن مبارزه می کنند. (46)

لنسفوسیت ها از سلول هایی به نام **سلول های بنیادی در مغز قرمز استخوان ها** مشتاً می گیرند. (47)

لنسفوسیت ها در ابتدا **نابالغ** هستند و بعد از تکامل یافتن توانایی شناسایی و مقابله با عوامل بیماریزا را پیدا می کنند. (48)

عدهای از لنسفوسیت ها در مغز قرمز استخوان تکامل می یابند و سلول های تخصص یافته‌ای به نام **لنسفوسیت های B** را به وجود می آورند. (49)

عدهای دیگر از لنسفوسیت های نابالغ از طریق خون به غدهای در پشت جناغ سینه (در جلو نای) به نام **تیموس** منتقل شده و در آنجا بالغ می شوند و (50)

سلولهای تخصص یافته ای به نام **لنسفوسیت های T** را به وجود می آورند.

در طی تکامل لنفوسيت ها :

- 1- **توانایی شناسایی مولکول ها و سلول های خودی را از مولکول ها و سلول های غیر خودی کسب می کنند.**
- 2- در عین حال آمادگی لازم را برای شناسایی و مقابله با نوع خاصی از میکروب های بیماریزا و سایر عوامل بیگانه به دست می آورند.
- تعدادی از لنفوسيت های بالغ بین خون و لنف گردش می کنند و عده ای دیگر به گره های لنفي .. طحال .. لوزه ها و آپاندیس منتقل شده و در این اندامها مستقر می شوند. (52)
- در این اندام (گره های لنفي ، طحال ، لوزه ها و آپاندیس) **ماکروفاژ های موجود نیز به نابودی عوامل بیگانه کمک می کنند.** (53)
- هر ماده ای که سبب بروز پاسخ ایمنی شود **آنثی ژن** نام دارد. (54)
- اغلب آنتی ژنهای ، مولکول های پروتئینی یا پلی ساکاریدی هستند که در سطح عوامل بیگانه قرار دارند. (55)
- مولکول های سطح سلول های سرطانی .. سم باکتری ها و دانه های گرده** نیز انواعی از آنتی ژن ها هستند. (56)
- در سطح هر لنفوسيت ، پروتئین هایی به نام **گیرنده های آنتی ژنی** وجود دارد. (57)
- گیرنده های آنتی ژنی شکل خاصی دارند و به آنتی ژنهای خاص که از نظر شکل مکمل آنها هستند متصل می شوند. (58)
- به دلیل اینکه هر لنفوسيت نوع خاصی از گیرنده های آنتی ژنی را دارد ، آنتی ژن خاصی را شناسایی و با آن مبارزه می کند (دفاع اختصاصی). (59)
- دفاع اختصاصی خود شامل : **1- ایمنی همورال 2- ایمنی سلولی** است. (60)

ایمنی همورال

- در ایمنی همورال ، **لنفوسيت های B** نقش اصلی را دارند و در این نوع ایمنی **پادتن** تولید می شود. (61)
- هنگامی که **لنفوسيت B** برای نخستین بار با آنتی ژن مکمل گیرنده خود متصل می شود ، رشد می کند ، تقسیم می شود و پس از تغییراتی تعدادی سلول به نام **پلاسموسیت و سلول B خاطره** به وجود می آورد.
- پلاسموسیت ها** پروتئین هایی به نام **پادتن** تولید و ترشح می کنند. (63)
- پادتن** در خون **محلول** است و به همین دلیل دفاع اختصاصی را که به کمک پادتن صورت می گیرد **ایمنی همورال گویند** (همورال = مایعات بدن). (64)
- پادتن ها** نیز مانند گیرنده های آنتی ژن **اختصاصی عمل می کنند**؛ یعنی هر نوع پادتن به آنتی ژن خاصی که مکمل آن است متصل می شود. (65)
- پادتن به روش های مختلف آنتی ژن را غیر فعال می کند. (66)
- پادتن ها در ساده ترین روش به آنتی ژن های سطح میکروب ها می چسبند و مانع از اتصال و تأثیر میکروب ها بر سلول های میزبان می شوند. (67)
- اتصال پادتن به آنتی ژن موجب می شود ماکروفاژها راحت تر آنتی ژن را **بلعند** . (68)

(69) سلول‌های خاطره در حالت آماده باش هستند و در صورت برخورد مجدد با همان آنتی‌ژن (پاسخ ایمنی ثانویه) با سرعت تقسیم می‌شوند و تعداد بیشتری پلاسموسیت و تعداد کمی سلول خاطره تولید می‌کنند.

(70) در دومین برخورد (پاسخ ثانویه) پادتن بیشتری در برابر آنتی‌ژن تولید می‌شود.

(71) در دومین برخورد (پاسخ ثانویه) آنتی‌ژن **سریعتر** از نخستین برخورد شناسایی می‌شود و با شدت بیشتری با آن مبارزه می‌شود.

ایمنی سلولی

(72) در ایمنی سلولی **لنسوسیت‌های T** فعالیت دارند.

(73) لنسوسیت‌های T پس از اتصال به آنتی‌ژن خاص خود، تکثیر پیدا می‌کنند و انواعی از سلول‌های T از جمله تعدادی سلول T کشنده و

سلول T خاطره تولید می‌کنند.

(74) سلول‌های T کشنده به طور مستقیم به سلول‌های آلوده به **ویروس و سلول‌های سرطانی** حمله می‌کنند.

(75) در این حمله لنسوسیت‌های T با تولید پروتئین خاصی به نام **پروفورین** منافذی در این سلول‌ها ایجاد و باعث مرگ آنها می‌شوند.

(76) به دلیل حملهء مستقیم سلول‌های T به سلول‌های بیماری‌زا، این نوع ایمنی، به **ایمنی سلولی** معروف است.

بیماری واگیردار

(77) میکروب‌های بیماری‌زا از راه‌های مختلف (هوای آب.. غذا.. حشرات.. تماس) منتشر می‌شوند.

(78) بیماری که بتواند از شخصی به شخص دیگر سرایت کند، **بیماری واگیردار** نام دارد.

(79) فردی که به یک بیماری واگیر دار مبتلا می‌شود، معمولاً پس از بهبود نسبت به ابتلای مجدد به این بیماری ایمن می‌شود.

(80) دلیلی این نوع ایمنی وجود تعدادی سلول خاطره است که در بیماری اول تولید شده‌اند.

(81) ایمنی که پس از ابتلای بیماری واگیر و بهبودی پس از آن به وجود می‌آید، **ایمنی فعال** نام دارد.

(82) نام ایمنی فعال به این جهت است که در طی آن دستگاه ایمنی خود فرد نقش فعالی در مبارزه با عامل بیماری‌زا دارد.

(83) واکسن؛ میکروب ضعیف شده یا کشتی شده و یا سم خنثی شده میکروب است که باعث ایجاد ایمنی فعال می‌شود.

(84) هنگامی که در فردی، پیوند عضو صورت می‌گیرد، ممکن است دستگاه ایمنی بدن فرد گیرنده، سلول‌های عضو پیوند شده را به عنوان یک عامل بیگانه شناسایی کرده و به آن حمله کند.

دستگاه ایمنی و پیوند اعضا

(85) دستگاه ایمنی ما می‌تواند حتی سلول‌های بدن ما را از سلول‌های بدن سایر افراد تشخیص دهد.

برای جلوگیری از رد عضو پیوندی: (86)

a. باید از فردی عضو دریافت شود که پروتئین های سطحی سلول های وی شباهت بیشتری به پروتئین های سطحی سلولهای فرد گیرنده

داشته باشد.

b. به فرد گیرنده عضو، داروهایی می دهنند که فعالیت دستگاه ایمنی آنها را تا حدی کاهش دهند.

دستگاه ایمنی و سلول های سرطانی

(87) در سطح سلول های سرطانی مولکول های خاصی به نام آنتی ژن های سرطانی وجود دارد، بنابراین دستگاه ایمنی به سلول های سرطانی حمله می کند و به طور معمول آنها را از بین می برد.

واضح است که آنتی ژن های سرطانی بر روی سلول های عادی وجود ندارند. (88)

در مبارزه با سلول های سرطانی **لنسوسیت های T**، به ویژه **سلول های T کشند و ماکروفافاژها** نقش اصلی را به عهده دارند. (89)در مبارزه با سلول های سرطانی **پادتن از اهمیت کمتری** برخوردار است. (90)

خود ایمنی

(91) در برخی از افراد دستگاه ایمنی مولکول های خودی را بیگانه تلقی می کند و همین امر موجب بروز بیماری به نام **خود ایمنی** می شود.

(92) در خود ایمنی، دستگاه ایمنی مولکول ها و یا سلول های خودی را نیز مورد حمله قرار می دهد و در برابر آنها پاسخ ایمنی ایجاد می کند.

(93) خود ایمنی ممکن است در اثر؛ **تولید نابجا و نامتناسب پادتن هایی** باشد که علیه مولکول های سطحی سلول های بدن به وجود می آیند.

(94) در بیماری **مالتیپل اسکلروزیس (MS)** دستگاه ایمنی، **پوشش اطراف سلول های عصبی مغز و نخاع** را مورد تهاجم قرار می دهد و به تدریج آنها را

از بین می برد.

(95) در MS فعالیت سلول های عصبی اختلال پیدا می کند و بر اساس **محل و شدت تخریب علائم مختلفی** مثل **ضعف .. خستگی زودرس اختلال در تکلم .. اختلال در بینایی و عدم هماهنگی حرکات بدن** ممکن است در بیمار مشاهده شود.

(96) در برخی بیماران ممکن است پس از یک بار حمله MS، پوشش سلول های عصبی **تومیم** شده و علائم بیماری از بین بروند.

آلرژی

(97) **آلرژی** یا حساسیت، نوع دیگری از اختلال در دستگاه ایمنی است.(98) پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژن ها **آلرژی** نام دارد.

آنچه از موجب ایجاد آلرژی می‌شود به **آلرژن** (مادهٔ حساسیت زا) معروف است. (99)

(100) گرد و غبار، دانه‌های گرده، مواد موجود در برخی از غذاها و داروهای ممکن است برای بعضی از افراد، آلرژن باشند.

(101) در اولین برخورد فرد حساس با آلرژن، بدن او نوع خاصی از پادتن تولید می‌کند، این پادتن در سطح **ماستوپیت‌های بافتی** قرار می‌گیرد.

(102) **ماستوپیت‌های بازووفیل‌های خون** هستند ولی در بافت‌ها وجود دارند.

(103) اگر فرد بعد از مدتی دوباره در معرض همان آلرژن قرار بگیرد، مادهٔ آلرژن به پادتن سطح **ماستوپیت‌های بافتی** متصل می‌شود در نتیجه این سلول‌ها

موادی مثل **هیستامین** تولید می‌کنند و **هیستامین** باعث بروز علائم آلرژی می‌شود.

(104) علائم آلرژی ممکن است تورم .. قرمزی .. خارش چشم‌ها .. گرفتگی و آبریزش بینی و تنگی نفس باشد.

(105) افراد مبتلا به آلرژی برای مقابله با اثرات شدید **هیستامین** از **داروهای ضد هیستامین** (آنتی هیستامین) استفاده می‌کنند.

ایدز (نقص ایمنی اکتسابی)

(106) گاهی ممکن است در یک تا تعدادی از اجزاء دستگاه ایمنی نقصی بروز کند.

(107) **نقص ایمنی** ممکن است **مادرزادی** باشد یا در اثر **عوامل محیطی** به وجود آید (اکتسابی).

(108) **ایدز AIDS** مثال بارز نقص ایمنی اکتسابی است.

(109) **ایدز** در اثر ویروسی به نام HIV به وجود می‌آید.

(110) این ویروس‌ها گروه خاصی از **لطفوپیت‌های T** را که در دفاع نقش دارند مورد تهاجم قرار می‌دهند، در آنها تکثیر می‌شوند. آنها را از بین می‌برند.

(111) در بیماری ایدز به مرور **قدرت دفاعی بدن کم می‌شود**، به ترتیبی که افراد مبتلا توانایی مقابله با خفیف ترین عفونت‌ها را ندارند و سرانجام در اثر

ابتلا به انواعی از بیماری‌های باکتریایی .. قارچی .. ویروسی و یا سرطان می‌میرند.

(112) از زمان آلوده شدن بدن به ویروس ایدز تا بروز علائم بیماری ممکن است 6 ماه تا 10 سال یا بیشتر طول بکشد.

(113) در این مدت اگر چه فرد به ظاهر سالم است اما **ناقلاً بیماری** است و می‌تواند بیماری را به افراد دیگر انتقال دهد.

(114) ویروس ایدز از سه راه به بدن منتقل می‌شود :

a . **تزریق خون** یا فرآورده‌های خونی آلوده به ویروس

b . مادر آلوده ممکن است در دوران بارداری ، **زایمان** و یا شیردهی ویروس را به فرزند منتقل

کند.

c . از راه **تماس جنسی**

(115) ایدز از راه هوا، غذا، آب، نیش حشرات، دست دادن، صحبت کردن، روپوشی، بzac، اشک و ادرار منتقل نمی‌شود.

ایمنی در بدن سایر جانداران

(116) دفاع اختصاصی اساساً در مهره داران وجود دارد.

(117) بی مهرگان از راه دفاع غیر اختصاصی با عوامل بیماری زا مبارزه می کنند.

(118) مثال هایی از دفاع غیر اختصاصی در بی مهرگان :

-1- مایع مخاطی روی بدن بسیاری از کرم های حلقوی و نرمتنان.

-2- سلول هایی مشابه فاگوسیت ها در اسفنج ها و بندپایان و نیز های لیزوژویی و لیزوژومی.

-3- اسفنج ها و ستاره های دریابی حتی می توانند پیوند بافت بیگانه را پس بزنند.

-4- در گیاهان توکیبات خاصی ساخته می شوند که نقش دفاعی دارند.

-5- انواعی از پروتئین ها و پپتید های کوچک غنی از گوگرد در گیاهان شناخته شده که فعالیت ضد میکروبی

-6- نوعی از این پپتید های غنی از گوگرد در یونجه فعالیت ضد قارچی دارد. دارند.

نکات فصل 2 .. دستگاه عصبی

- دستگاه عصبی با ساختار و کار ویژه‌ای که دارد برای ایجاد هم آهنگی بین اعمال سلول‌ها و اندام‌های مختلف به وجود آمده و تکامل حاصل کرده است.
1. خواص ویژه دستگاه عصبی عبارتند از :
 - a- تأثیر پذیری نسبت به محرک‌ها.
 - b- ایجاد یک جریان عصبی که نتیجه اثر محرک است.
 - c- هدایت جریان عصبی از یک نقطه دستگاه به نقطه دیگر.
 - d- انتقال پیام از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر.

تنظیم عصبی و انواع آن

- فعالیت‌های عصبی جانوران به طور کلی در دو جهت انجام می‌شود :
3. - تنظیم فعالیت‌های درونی
 - a- تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی
 4. به عنوان مثال در عمل خوردن غذا نیاز به :
 - 1- کمک گیرنده‌های صورت ، که وجود غذا را در قسمت‌های مختلف دهان حس کنند.
 - 2- اعصابی که این خبر را به مراکز تنظیم کننده مغز ببرند.
 - 3- اعصابی که از این مراکز به عضلات و غدد گوارشی دستورها را برسانند.
 5. در بسیاری موارد ، هر دو نوع تنظیم عصبی داخلی و خارجی با هم کار می‌کنند ، مانند فرار گربه در اثر شنیدن صدای وحشتناک .

ساختمان نورون

6. واحد ساختمان و عمل در دستگاه عصبی نورون نام دارد. (نورون = سلول عصبی)
7. نورون‌ها پیام‌های عصبی را به بافت‌ها و اندام‌های بدن مانند ماهیچه‌ها ، غده‌ها و نیز نورون‌های دیگر می‌فرستند.
8. نورون‌ها انواع گوناگونی دارند اما اساس ساختاری همه آنها مانند یکدیگر است.
9. ساختمان نورون دارای بخش‌های مختلف است که در شکل کتاب رسم و نامگذاری شده است.(ص 28 کتاب)
10. رشته‌هایی که از جسم سلولی نورون بیرون زده‌اند دو دسته‌اند : 1- دندربیت 2- آکسون
11. دندربیت‌ها پیام را دریافت کرده و به جسم سلولی می‌رسانند.
12. آکسون پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می‌کند.

13. انتهای آکسون، پایانه آکسون نام دارد.
14. پیام عصبی از محل پایانه آکسون از یک نورون به نورون دیگر یا یک سلول دیگر انتقال می‌یابد.

نورون‌های میلین دار

15. بسیاری از نورون‌ها لایه‌ای از جنس غشا (پروتئین و فسفولیپید) به نام **غلاف میلین** پوشانده است.
16. عمل میلین به اینصورت است که: ۱- رشته‌های آکسون و دندریت را **عایق بندی** می‌کند.
- ۲- باعث افزایش سرعت حرکت پیام عصبی می‌شود.**
17. میلین را **سلول‌های پشتیبانی** که آکسون و دندریت را احاطه کرده‌اند، تولید می‌کنند.
18. غلاف میلین در قسمت‌هایی از رشته‌های عصبی (دندریت یا آکسون) قطع می‌شود. به این قسمت‌ها **گره رانویه** گفته می‌شود.
19. در محل گره رانویه غشای رشته‌های عصبی در تماس با مایع اطراف سلول قرار می‌گیرد.
20. هدایت پیام عصبی در رشته‌های دارای میلین سریع‌تر است زیرا **پیام عصبی** از یک گره رانویه به گره دیگر جهش می‌کند.
21. رشته‌های عصبی دارای قطر بیشتر پیام عصبی را سریع‌تر هدایت می‌کنند.
22. وجود میلین در نورون‌هایی که مربوط به حرکات سریع بدن هستند بسیار مفید است.

انواع نورون‌ها

23. نورون‌ها از نظر عملی که انجام می‌دهند ۳ نوع هستند: ۱- نورون‌های **حسی** ۲- نورون‌های **حرکتی** ۳- نورون‌های **رابط**
24. نورون‌های **حسی** اطلاعات را از اندام **حسی** مثل پوست به نخاع و **مغز** می‌رسانند. در این نورون‌ها طول دندریت بلندتر از آکسون است.
25. نورون‌های **حرکتی** فرمان‌های **مغز** و **نخاع** را به **ماهیچه‌ها** و **اندام‌های دیگر** می‌برند. در این نورون‌ها طول آکسون بلندتر از دندریت است.
26. نورون‌های **رابط میلین** ندارند و رابط بین یک نورون **حسی** و یک نورون **حرکتی** هستند. در این نورون‌ها **آکسون** و **دندریت** چندان تفاوتی با هم دیگر ندارد.

فعالیت نورون

27. بین دو سوی غشای نورون **اختلاف پتانسیل الکتریکی** وجود دارد که به دو صورت ۱- آرامش و ۲- فعال مشاهده می‌شود.
28. زمانی که نورون در حال **فعالیت عصبی** نیست، گفته می‌شود که نورون در حال استراحت یا **آرامش** است.
29. اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو سوی غشا در حال استراحت نورون، **پتانسیل آرامش** نام دارد.
30. در هنگام پتانسیل آرامش، پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون سلول عصبی، منفی تر است.

31. به طور معمول غلظت سدیم در بیرون سلول و نیز غلظت پتاسیم در درون سلول بیشتر است.
32. یون های سدیم تمایل دارند که وارد سلول شوند و یون های پتاسیم تمایل به خروج از سلول را دارند.
33. در حالت استراحت ، نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذپذیری آن نسبت به سدیم است. در نتیجه درون سلول نسبت به بیرون آن منفی خواهد شد.
34. در صورت ادامه روند نفوذ سدیم و پتاسیم تعادل یونی سلول به هم می خورد و سلول باید به نحوی مانع به هم خوردن تعادل شود.
35. پروتئینی در غشا به نام پمپ سدیم .. پتاسیم ، ب ۱ مصرف انرژی ATP ، ایون های سدیم را به خارج و یون های پتاسیم را به داخل

سلول

- می راند و باعث ایجاد و حفظ حالت تعادل می شود.
36. پتانسیل عمل عبارت است از تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا .
37. در طی پتانسیل عمل در زمان بسیار کوتاهی پتانسیل داخل غشا نسبت به خارج آن مثبت تر می شود و بلافاصله به حالت اول بر می گردد. (منظور از حالت اول همان پتانسیل آرامش است).
38. چون پتانسیل عمل پس از تولید در یک نقطه از سلول عصبی ، در نقاط مجاور هم ایجاد می شود و نقطه به نقطه در طول رشته عصبی سیر می کند، به آن پیام عصبی گفته می شود.
39. در منحنی تغییر پتانسیل غشا ، در ابتدا پتانسیل داخل غشا مثبت شده (بخش بالا رو منحنی) و سپس منفی می شود (بخش پائین رو منحنی) و سرانجام به حالت پتانسیل آرامش می رسد.
40. علت مثبت تر شدن پتانسیل درون سلول (بالا رفتن منحنی) باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی و ورود ناگهانی یون های سدیم به درون سلول است.
41. علت منفی شدن درون سلول (پائین رفتن منحنی) باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی و خروج ناگهانی یون های پتاسیم از سلول است.
42. در پتانسیل عمل در ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و بعد از بسته شدن آنها نوبت به باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی میرسد.
43. بعد از پایان پتانسیل عمل ، فعالیت بیشتر پمپ پمپ سدیم .. پتاسیم سبب می شود که غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت غشا به حالت پتانسیل آرامش برگردد.

ارتباط نورون‌ها با یکدیگر و با سلول‌های غیر عصبی

44. وقتی پیام عصبی به پایانه آکسون می‌رسد ، می‌تواند به سلول‌های دیگر منتقل شود.
45. محلی را که در آن یک نورون با یک سلول دیگر ارتباط برقرار می‌کند ، سیناپس می‌نامند.
46. در محل سیناپس ، نورون انتقال دهنده را نورون پیش سیناپسی و سلول دریافت کننده ، سلول پس سیناپسی خوانده می‌شود.
47. وقتی جریان عصبی به پایانه آکسون نورون پیش سیناپسی می‌رسد ، باید فضای سیناپسی را طی کند و به سلول پس سیناپسی منتقل شود. این کار با آزاد شدن ماده‌ای که انتقال دهنده عصبی نام دارد انجام می‌شود.
48. انتقال دهنده‌های عصبی انواع گوناگونی دارند . مثلاً انتقال دهنده عصبی در ماهیچه‌های آدمی استیل کولین است.
49. وقتی پیام عصبی به پایانه آکسون نورون پیش سیناپسی می‌رسد ، وزیکول‌های محتوی انتقال دهنده‌ها با غشای سلول آمیخته می‌شود و مولکول‌های انتقال دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می‌شوند و به سلول پس سیناپسی می‌رسند.
50. انتقال دهنده‌های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی ، سبب تغییر پتانسی الکتریکی آن می‌شوند.
51. تغییر در نورون پس سیناپسی می‌تواند در جهت **فعال کردن** یا **مهار کردن** نورون پس سیناپسی باشد.

اثر مواد مخدر

52. موادی که عملکرد دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می‌دهند ، **مواد روان گردان** نامیده می‌شوند.
53. **الکل** .. **نیکوتین** .. **کوکائین** .. **هروئین** .. **کافئین** (در قهوه یا نوشابه) از جمله مواد روان گردان هستند.
54. **هممه** این مواد می‌توانند باعث **وابستگی روانی** مصرف کننده شوند و بیشتر آنها موجب **وابستگی جسمی** نیز می‌شوند.
55. مواد مخدر عملکرد نورون‌ها را تغییر می‌دهند.
56. اعتیاد ؛ پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف مکرر مواد مخدر باعث آن می‌شود.
57. اعتیاد عملکرد طبیعی نورون‌ها و سیناپس‌ها را تغییر می‌دهد.
58. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی کار نمی‌کند مگر در حضور آن ماده مخدر.
59. شخص با مصرف مکرر ماده مخدر به آن معتاد می‌شود و بدن او نسبت به آن ماده مخدر عادت می‌کند.
60. شخص با گذشت زمان مقدار ماده مخدر مصرفی خود را **افزایش** می‌دهد ، تا خواسته بدنش تأمین شود.

اثرات نیکوتین

61. نیکوتین ماده‌ای اعتیاد آور است که در برگ‌های گیاه تنباکو یافت می‌شود.

62. تنباقو یک ماده سمی است که ۶۰ میلی گرم آن برای انسان کشنده و مرگ آور است.
63. نیکوتین سریعاً وارد جریان خون می شود و در بدن به گردش در می آید.
64. عملکرد نیکوتین شبیه به عملکرد انتقال دهنده عصبی استیل کولین در بدن است.
65. نیکوتین به علت شباهت ساختاری با استیل کولین، به محل مخصوصی در سلول های عصبی که به طور طبیعی محل گیرنده های استیل کولین است متصل می شود، این جایگاهها از **مراکز کنترل مغز** هستند که بسیاری از فعالیت های مغزی را کنترل می کنند.
66. اتصال نیکوتین به این جایگاه ها باعث می شود که بعد از مدتی دستگاه عصبی فرد سیگاری فقط در حضور نیکوتین به طور طبیعی کار کند و با حذف نیکوتین، حالت طبیعی بدن مختل شود.
67. در این حالت تنها راه برای برقراری و نگهداری حالت طبیعی بدن کشیدن سیگار است و به این ترتیب می گوئیم فرد، به کشیدن سیگار معتاد شده است.

اثرات تنباقو

68. کشیدن سیگار با ابتلا به سرطان دهان و حنجره ارتباط مستقیم دارد و نیز امکان ابتلا به سرطان های پانکراس و مثانه را افزایش می دهد.
69. همچنین امکان ایجاد ناراحتی های تنفسی مهلک در افراد سیگاری بیشتر است.
70. دود توتون باعث تحریک مخاط دهان .. بینی و گلو می شود.
71. دود توتون در شش ها تجمع پیدا می کند و **مزه های دستگاه تنفسی** را از کار می اندازد.
72. دود توتون بافت ریه را تیره می کند و باعث کاهش ظرفیت تنفسی می شود.
73. افرادی هم که به طور غیر مستقیم در معرض دود سیگار قرار می گیرند، همانند افراد سیگاری در معرض همه عوارض مربوطه قرار می گیرند.
74. احتمال سقط جنین و به دنیا آمدن جنین مرد در زنان سیگاری نیز زیاد است.

داروهای روان گردان

75. داروهای روان گردن نوعی مواد مخدر هستند که در تسکین درد ها و القای خواب نقش دارند.
76. بسیاری از این داروها از گیاهان **تیره خشخاش** به دست می آیند.
77. مواد مخدری که از **تریاک استخراج** می شوند شامل: **مورفین .. هروئین و کدئین** هستند.
78. پزشکان برای تسکین درد بیماران گاه از **کدئین و گاه از مورفین** استفاده می کنند.
79. گیرنده های درد، محرک ایجاد درد را شناسایی می کنند.
80. نقش درد در بدن بسیار با اهمیت است چون درد به ما می گوید که یکی از بافت های ما آسیب دیده و یا زخمی شده است.
81. هنگامی که عضوی آسیب می بیند از انتهای اعصاب آسیب دیده آن، پیام های انتقال می یابد که باعث احساس درد می شود.
82. پیام های عصبی حامل درد به نخاع و سپس به **مغز** انتقال می یابند. پس از رسیدن پیام درد به **طناب عصبی**، این پیام توسط گروهی از انتقال

دهنده‌های عصبی به نام **انکفالین‌ها** سرکوب می‌شود.

.83. انکفالین از انتقال پیام عصبی از **نخاع به مغز** **جلوگیری** می‌کند.

.84. مواد مخدر عملکردی شبیه به انکفالین‌ها دارند و به گیرنده‌های پروتئینی درد در طناب عصبی می‌پیوندند و از انتقال پیام درد به مغز و احساس درد **جلوگیری** می‌کنند.

ساختار و کار دستگاه عصبی

.85. وظایف دستگاه عصبی در ارتباط‌های متقابل بین نورون‌های آن وابسته است.

.86. در دستگاه عصبی دو بخش اصلی وجود دارد : **1- دستگاه عصبی مرکزی 2- دستگاه عصبی محیطی**

.87. دستگاه عصبی مرکزی شامل **مغز و نخاع** است که **مرکز نظارت بر اعمال بدن** هستند.

.88. دستگاه عصبی مرکزی اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را **تفسیر کرده** و به آنها **پاسخ می‌دهد**.

.89. دستگاه عصبی مرکزی از دو بخش : **1- مادهٔ خاکستری 2- مادهٔ سفید** تشکیل شده است.

.90. **مادهٔ خاکستری** بیشتر محتوی جسم سلولی نورون‌ها است و **مادهٔ سفید** از اجتماع بخش‌های میلیون‌دار نورون‌ها تشکیل شده است.

.91. دستگاه عصبی محیطی شامل تعداد زیادی **عصب** است.

.92. هر عصب **مجموعه‌ای از آکسون‌ها .. دندربیت‌ها .. یا هر دوی آنها** است که دور آنها را غلافی پوشانده است.

.93. به **آکسون‌ها یا دندربیت‌های بلند** : **تار عصبی** گفته می‌شود.

.94. **اعصاب محیطی** خود سه دسته‌اند : **1- اعصاب حسی** که پیام‌های عصبی را از اندام‌ها به مغز می‌برند.

.94. **2- اعصاب حرکتی** که پیام‌های عصبی را از مغز و نخاع به ماهیچه‌ها یا غده‌ها می‌برند.

.94. **3- اعصاب مختلط** که مجموعی از تارهای حسی و حرکتی هستند.

مغز

.95. **مغز مرکز اصلی پردازش اطلاعات** در بدن است.

.96. مغز در حدود **100 میلیارد** نورون دارد و به طور متوسط در یک فرد بالغ **1/5 کیلوگرم** وزن دارد.

.97. افکار .. عواطف .. رفتار .. ادراک .. احساس و حافظه از وظایف مغز هستند.

.98. مغز شامل چند بخش است که عبارتند از : **1- مخ 2- مخچه 3- ساقهٔ مغز**

- مخ**
99. مخ بزرگترین بخش مغز است.
100. مخ ؛ توانایی یادگیری .. حافظه .. ادراک و عملکرد هوشمندانه را دارد.
101. مخ دارای یک لایه خارجی چین خورده ، با برآمدگی ها و شیار های بسیار است که این لایه قشر مخ نامیده می شود.
102. یک شیار عمیق و طولانی در وسط مخ ، آن را به دو نیمکره راست و چپ تقسیم می کند.
103. نیمکره های مخ از طریق دسته ای از تارهای عصبی به نام جسم پینه ای ، به یکدیگر مرتبط می شوند.
104. به طور معمول نیمکره چپ مخ اطلاعات حسی را از سمت راست بدن دریافت و حرکات آن را کنترل می کند و بر عکس نیمکره راست اطلاعات حسی سمت چپ بدن را دریافت و حرکات آن را کنترل می کند.
105. همچنین هر یک از نیمکره ها ، کارهای مخصوص به خود نیز دارند.
106. بیشتر پردازش اطلاعات حسی و حرکتی در قشر خاکستری مخ انجام می گیرد که لایه خارجی چین خورده و نازک مخ است .
107. چین خورده های قشر مخ باعث افزایش سطح قشر مخ و در عین حال باعث می شوند که مغز در درون جمجمه جا بگیرد.
- مخچه**
108. مخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و از دو نیمکره که در وسط آن بخشی به نام کرمینه قرار دارد تشکیل شده است.
109. مخچه مهمترین مرکز هماهنگی و یادگیری حرکات لازم برای تنظیم حالت بدن و حفظ تعادل است.
110. مخچه اطلاعات لازم برای انجام وظیفه خود را از ماهیچه ها .. مفاصل .. پوست .. چشم ها .. گوش و همچنین بخش هایی از مغز و نخاع که مربوط به حرکات بدن هستند دریافت می کند.
111. مخچه با پیش بینی وضعیت بدن در لحظه بعد پیام هایی را برای مغز و نخاع می فرستد و موجب تصحیح و یا تغییر حرکات بدن می شود.
112. صدمه به مخچه باعث می شود که فرد در هنگام راه رفتن تلو تلو بخورد و اعمال خود را به طور غیر ماهرانه انجام دهد . این فرد توانایی انجام حرکات دقیق را ندارد ؛ نمی تواند یک خط مستقیم رسم کند و یا با چکش بر روی میخ بکوبد.
- ساقه مغز**
113. ساقه مغز در قسمت پائینی مغز قرار دارد و از یک سو به نخاع متنه می شود و از سوی دیگر ، به نیمکره های مخ و مخچه متنه می شود.

114. ساقه مغز خود شامل سه بخش : ۱- مغز میانی ۲- پل ۳- بصل النخاع می باشد.

115. ساقه مغز که اطلاعات را درون دستگاه عصبی مرکزی انتقال می دهد ، نقش مهمی در **تنظیم فعالیت های بدن** بر عهده دارند.

تalamous .. هیپوتalamous .. دستگاه لیمبیک

116. در بالای ساقه مغز ، مراکز مهم تقویت و انتقال پیام عصبی وجود دارد که اطلاعات را در بخش های مختلف مغز رد و بدل می کنند.

117. یکی از این مراکز **تalamous** است که در پردازش اطلاعات حسی نقش مهمی دارد.

118. اطلاعات حسی از اغلب نقاط بدن در **تalamous** ها گرد هم می آیند ، تقویت می شوند و به بخش های مربوطه در قشر منخ فرستاده می شوند.

119. در زیر **تalamous** ، **هیپوتalamous** قرار دارد که بهمراه بصل النخاع بسیاری از اعمال حیاتی بدن مانند تنفس و ضربان قلب را تنظیم می کند.

120. **هیپوتalamous** همچنین مرکز احساس تشنجی .. گرسنگی و تنظیم دمای بدن است و نیز اعمال غده های ترشح کننده هورمون ها را

تنظیم

میکند.

121. **تalamous** و **هیپوتalamous** را شبکه گسترده ای از نورون ها ، به نام **دستگاه لیمبیک** به قسمت هایی از قشر منخ ارتباط می دهند .

122. **دستگاه لیمبیک** نقش مهمی در حافظه .. یادگیری و احساسات مختلف مانند رضایت .. عصبانیت و لذت بر عهده دارد.

نخاع

123. نخاع درون ستون مهره ه از بصل النخاع تا کمر امتداد دارد.

124. نخاع ، مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند . همچنین نخاع مرکز برخی از انعکاس های بدن است.

125. انعکاس ، پاسخ ناگهانی و غیر ارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست.

126. 31 جفت عصب به نخاع متصل هستند.

127. هر عصب نخاعی یک ریشه پشتی و یک ریشه شکمی دارد.

128. ریشه های پشتی ، محتوى نورون های حسی اند که اطلاعات را از گیرنده های حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد می کنند.

129. ریشه های شکمی ، محتوى نورون های حرکتی اند که پاسخ حرکتی را از دستگاه عصبی مرکزی به غده ها و ماهیچه ها ، منتقل می کنند.

130. در برش عرضی نخاع دو بخش دیده می شود :

1- بخشی در وسط از جنس ماده خاکستری که شامل جسم سلولی نورون هاست .

2- بخشی از جنس ماده سفید که محتوى آکسون و دندریت نورون ها که بخش خاکستری را در بر گرفته است.

131. در بخش خاکستری نخاع ، نورون های رابط وجود دارند که باعث ارتباط نورون ها با یکدیگر می شوند.

محافظت از دستگاه عصبی

- .132. دستگاه عصبی مرکزی مهره داران به چند طریق محافظت می‌شود:
- 1 استخوان‌های جمجمه و ستون مهره‌ها
 - 2 مغز و نخاع را پرده‌ای سه لایه‌ای به نام مننژ حفاظت می‌کند.
 - 3 سد خونی .. مغزی
- .133. استخوان‌های جمجمه و ستون مهره‌ها، جعبه‌ای محکم و استخوانی برای حفاظت مغز و نخاع به وجود می‌آورند.
- .134. لایه‌های مننژ از خارج به سمت داخل عبارتند از: 1- سخت شامه 2- عنکبوتیه 3- نرم شامه
- .135. سخت شامه از جنس بافت پیوندی محکم است.
- .136. لایه‌ء عنکبوتیه در زیر میکروسکوپ ظاهری شبیه با تارهای عنکبوت دارد و سخت شامه و نرم شامه را به هم متصل می‌کند.
- .137. لایه‌ء داخلی نرم شامه است که دارای مویرگ‌های خونی فراوان است و بافت عصبی را تغذیه می‌کند. همچنین نرم شامه مایع مغزی .. نخاعی را ترشح می‌کند.
- .138. بین عنکبوتیه و نرم شامه فضایی وجود دارد که از مایعی به نام مایع مغزی .. نخاعی پر شده است.
- .139. مایع مغزی نخاعی نقش ضربه‌گیر دارد و از برخورد مغز و نخاع به استخوان‌ها در حین حرکت، جلوگیری می‌کند.
- .140. سلول‌های پوششی دیواره مویرگ‌های مغزی، قادر منافذی هستند که در بافت‌های دیگر دیده می‌شود. در نتیجه بسیاری مواد که در متابولیسم سلول‌های مغزی نقشی ندارند و نیز میکروب‌ها معمولاً نمی‌توانند وارد مغز شوند. (سد خونی .. مغزی)
-
- ## دستگاه عصبی محیطی
- .141. دستگاه عصبی محیطی، مغز و نخاع را به قسمت‌های دیگر بدن ارتباط می‌دهد و شامل 31 جفت عصب نخاعی و 12 جفت عصب مغزی است.
- .142. دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش حسی و حرکتی است.
- .143. بخش حسی، اطلاعات اندام‌های حس را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می‌کند.
- .144. بخش حرکتی، ارسال پیام عصبی را به اندام‌های حرکتی بر عهده دارد.
- .145. بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی، خود شامل دو دستگاه مستقل است: 1- دستگاه عصبی پیکری 2- دستگاه عصبی خود مختار
- .146. دستگاه عصبی پیکری، شامل نورون‌های حرکتی است که ماهیچه‌های اسکلتی را که تحت کنترل آگاهانه ما قرار دارند کنترل می‌کنند.
- .147. انعکاس‌ها نیز جزء فعالیت‌های دستگاه عصبی پیکری هستند.
- .148. انعکاس‌ها بسیار سریع هستند زیرا در انجام آنها اغلب نخاع و دستگاه عصبی محیطی دخالت دارد و مغز نقشی ندارد.

- .149 نمونه انعکاس‌ها ، انعکاس زرد پی زیر زانو در اثر ضربه است.
- .150 مکانیسم انعکاس زرد پی زیر زانو :
- 1** - ضربه وارد شده به زیر زانو ، نورون حسی متصل به **ماهیچه جلو ران** را تحریک می‌کند .
- 2** - نورون حسی پیام را به **نخاع ارسال** می‌کند و **نورون حرکتی** مربوطه تحریک می‌شود و در نتیجه **ماهیچه جلو ران** منقبض می‌شود و پا به سرعت بالا می‌آید .
- 3** - **نورون حسی همچنین یک نورون رابط** را در **نخاع** تحریک می‌کند که این نورون رابط ، نورون حرکتی مربوط به **ماهیچه عقب ران** را از فعالیت باز می‌دارد.
- .151 پژوهش‌ها ، از این آزمایش برای بررسی سالم بودن مسیر انعکاس و نیز میزان اضطراب فرد استفاده می‌کنند.
- .152 اعصاب حرکتی خود مختار ، خود به دو بخش : **1** - دستگاه عصبی **سمپاتیک** **2** - دستگاه عصبی **پاراسمپاتیک** تقسیم می‌شوند.
- .153 این دو دستگاه **حالت پایدار بدن را حفظ می‌کنند** و عمل آنها به طور معمول **برخلاف یکدیگر** است.
- .154 عمل دستگاه **پاراسمپاتیک** باعث **برقراری حالت آرامش** در بدن می‌باشد که در این حالت ، فشار خون کاهش و ضربان قلب کم می‌شود . اما فعالیتهای **گوارشی** زیاد می‌شود.
- .155 بخش **سمپاتیک** در موقع **هیجان‌های روانی** و یا **جسمی** بر **پاراسمپاتیک** غلبه دارد و بدن را در **حالت آماده باش** نگاه می‌دارد.
- .156 در **حالت آماده باش** ، **فشار خون افزایش** می‌یابد و **تعداد ضربان قلب** و **تعداد تنفس افزایش** می‌باید . همچنین جریان خون به سوی **قلب** و **ماهیچه‌های اسکلتی** هدایت می‌شود.
- ### دستگاه عصبی جانوران
- .157 هیدر که از کیسه تنان است **ساده ترین دستگاه های عصبی** را دارد .
- .158 دستگاه عصبی هیدر به شکل یک **شبکه عصبی** است که شامل شبکه‌ای از رشته‌های عصبی است که در تمام بدن جانور پخش شده است.
- .159 هیدر **سر و مغز ندارد** و تقسیم بندی مرکزی و محیطی در دستگاه عصبی آن معنی ندارد.
- .160 شبکه عصبی برای ساختار بدنی هیدر و نحوه فعالیت آن کاملاً مناسب است.
- .161 در سر **پلاناریا** که از کرم‌های پهنه است **مغز کوچکی وجود دارد** . این **مغز از گره‌های عصبی** تشکیل شده است.
- .162 پلاناریا دارای دو طناب عصبی موازی است که همراه با **مغز دستگاه عصبی مرکزی** آن را تشکیل می‌دهند.
- .163 از این دو طناب عصبی اعصاب کوچکتری منشعب می‌شوند که **دستگاه عصبی محیطی** آن را تشکیل می‌دهند.
- .164 مغز حشرات از چند گره به هم **جوش خورده** تشکیل شده است.
- .165 **طناب عصبی شکمی** حشرات در هر قطعه از بدن ، دارای یک گره عصبی است که فعالیت ماهیچه‌های آن قطعه را کنترل می‌کند.

.166 دستگاه عصبی مهره داران تقریباً شبیه به دستگاه عصبی انسان است.

مقایسه مغز مهره داران

167. مغز مهره داران در دوره جنینی شامل سه بخش: ۱- مغز جلویی ۲- مغز میانی ۳- مغز عقبی است.
168. در بین مهره داران، اندازه نسبی مغز پستانداران و پرندگان (نسبت به وزن بدن) از بقیه بیشتر است.
169. نیمکره های مخ نیز در پرندگان و پستانداران، نسبت به سایرین رشد بیشتری داشته است. (دلیل رفتار های پیچیده تر نسبت به سایر مهره داران)
170. در میان مهره داران، سطح قشر چین خورده مخ انسان نسبت به اندازه بدن، بیشترین مقدار را دارد.
171. چین خورده های قشر مخ در وال و پریمات ها (گروهی از پستانداران شامل لمورها .. میمونها و انسان) بیشتر از سایر مهره داران است.
172. وال ها در زندگی اجتماعی خود دارای ارتباط های پیچیده ای از طریق ایجاد صدا هستند.
173. بیشتر قشر مخ در وال ها، احتمالاً به پردازش اطلاعات در مورد صداها، اختصاص یافته است.

نکات فصل ۳ .. حواس

کار حواس درک محرک های محیطی است. -1

حس جزئی از بخش حسی دستگاه عصبی محیطی است که اطلاعاتی درباره محرکها جمع آوری می کند. -2

گیرنده ها حس

گیرنده های حس نورون های تمایز یافته ای هستند که محرک ها را شناسایی و اثر آنها را به پیام عصبی تبدیل می کنند. -3

تفسیر پیام های حسی بر عهده دستگاه عصبی مرکزی است. -4

گیرنده های حس در سراسر بدن پراکنده‌اند. -5

بیشتر گیرنده های حس در اندام های حس (پوست .. چشم .. گوش .. بینی .. زبان) مرکز شده‌اند. -6

انواع گیرنده های حس در انسان عبارتند از: ۱- گیرنده های دما ۲- گیرنده های درد ۳- گیرنده های مکانیکی ۴- گیرنده های نور

گیرنده های شیمیایی

گیرنده های دما بیشتر در پوست هستند. -8

گیرنده های درد در همه بدن پراکنده‌اند و به آسیب به بافت ها واکنش می دهند. -9

گیرنده های مکانیکی در پوست و گوش مرکز دارند و نسبت به حرکت .. کشش .. فشار و ارتعاش حساس است. -10

گیرنده های نور در چشم هستند. -11

گیرنده های شیمیایی در زبان و بینی مرکز دارند. -12

پوست

پوست بدن ما دارای گیرنده‌های درد .. دما و مکانیکی می باشد. -13

هر گیرنده، دندانیت هایی از یک یا چند نورون است که اغلب این دندانیت ها را پوششی از بافت پیوندی احاطه کرده است. -14

انتهاي دندانیت های گیرنده درد، پوشش ندارد. -15

اگر محرک آنچنان شدید باشد که احتمال آسیب به بافت باشد، گیرنده درد تحریک خواهد شد. -16

درد، احساس بسیار مهمی است، زیرا ما را از خطر .. جراحت و بیماری آگاه می کند. -17

بسیاری از پاسخ های محافظت کننده مثل: انعکاس ها، پس از تحریک گیرنده‌های درد، فعال می شوند. -18

گیرنده‌های دما در پوست ، سرما و گرما را تشخیص می‌دهند.	-19
در درون بدن نیز گیرنده‌های دمایی که به دمای خون حساس هستند ، وجود دارند.	-20
هیبیوتالاموس مرکز اصلی تنظیم دمای بدن است.	-21
گیرنده‌های مکانیکی پوست به محرك هایی مثل : لمس .. فشار و کشش حساس اند.	-22
در دیواره برقی از وگ های خونی نیز گیرنده‌هایی مکانیکی وجود دارند که به فشار خون حساس اند.	-23
ماهیچه های اسکلتی ما نیز گیرنده‌های مکانیکی به نام گیرنده‌های کششی دارند که به تعییرات طول ماهیچه حساس اند و وضعیت قسمت های مختلف بدن را به دستگاه عصبی مرکزی اطلاع می‌دهند.	-24

چشم

کره چشم ما سه لایه دارد که به ترتیب از خارج به داخل عبارتند از : ۱- صلبیه ۲- مشیمیه ۳ - شبکیه	-25
صلبیه ، لایه ای محکم و سفید رنگ از جنس بافت پیوندی است که کره چشم را می‌پوشاند.	-26
صلبیه در جلو چشم شفاف است و قرنیه نام دارد.	-27
مشیمیه در زیر صلبیه است ، مشیمیه نازک و رنگدانه دار است.	-28
مشیمیه در جلو چشم ، بخش رنگین عنبیه را به وجود می‌آورد.	-29
عنبیه ماهیچه هایی دارد که سوراخ مردمک را که در وسط عنبیه است ، تنگ و گشاد می‌کند.	-30
تنگ و گشاد شدن مردمک تحت کنترل اعصاب سمپاتیک .. پاراسمپاتیک است.	-31
نور در هنگام عبور از قرنیه و عدسی ، همگرایی پیدا می‌کند (شکسته می‌شود).	-32
عدسی در پشت مردمک قرار دارد و کار آن متمرکز کردن نور بر روی شبکیه است .	-33
شبکیه داخلی ترین لایه چشم است و گیرنده‌های نوری بر روی آن قرار دارند.	-34
گیرنده‌های نوری در شبکیه دو دسته اند : ۱- سلول های مخروطی ۲- سلول های استوانه ای .	-35
این سلول های گیرنده ، انرژی نورانی را به پیام های عصبی تبدیل می‌کنند و آن را به مغز می‌فرستند.	-36
تفسیر این پیام های عصبی در مغز صورت می‌گیرد یعنی در اصل تصویر واقعی توسط مغز ایجاد می‌شود.	-37
سلول های استوانه ای در نور ضعیف بیشتر تحریک می‌شوند (سیاه و سفید).	-38
سلول های مخروطی به ما توانایی دیدن جزئیات ظرفی اشیاء را می‌دهند و در نور قوی بیشتر تحریک می‌شوند (دید رنگی).	-39
پیام های عصبی چشم توسط عصب بینایی به مغز فرستاده می‌شوند.	-40
جایی که عصب بینایی از شبکیه چشم خارج می‌شود ، نقطه کور نام دارد.	-41

- 42 بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری چشم است و نور بر روی آن متمرکز می‌شود، لکه زرد نام دارد.
- 43 لکه زرد در دقیق و تیز بینی چشم اهمیت دارد (به دلیل تمرکز بیشتر سلول‌های مخروطی در آنجا).
- 44 فضای پشت عدسی را ماده‌ای ژله‌ای و شفاف به نام **زجاجیه** پر کرده است.
- 45 زجاجیه باعث حفظ حالت کروی چشم می‌شود.
- 46 فضای جلو عدسی را مایع شفاف دیگری به نام **زلالیه** پر می‌کند.
- 47 **زلالیه** از مویرگ‌های چشم ترشح می‌شود و مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم می‌کند.
- 48 زلالیه همچنین مواد دفعی عدسی و قرنیه را جمع آوری و از طریق خون از آنها دور می‌کند.
- 49 قرنیه و عدسی رگ خونی و مویرگ ندارند.
- 50 عدسی چشم به وسیله رشته‌هایی به **ماهیچه مژکی** (در عنبیه (مشیمیه)) متصل شده است. این ماهیچه‌ها قطر عدسی را کم و زیاد می‌کنند.
- 51 هنگام نگاه کردن به اشیاء دور قطر عدسی کم و هنگام نگاه کردن به اشیاء نزدیک قطر عدسی زیاد می‌شود.
- 52 تغییر قطر عدسی برای تشکیل تصویر بر روی شبکیه، تطابق نام دارد.

بیماری‌های چشم

- 53 سفت شدن و کاهش انعطاف عدسی چشم و در نتیجه کاهش قدرت تطابق آن به دلیل افزایش سن را **پیر چشمی** گویند.
- 54 پیر چشمی با عینک‌های مخصوص تا حدی اصلاح و درمان می‌شود.
- 55 کدر شدن عدسی به دلیل افزایش سن و در نتیجه کاهش قدرت بینایی را **آب مروارید** می‌گویند.
- 56 برای درمان آب مروارید، عدسی را به وسیله جراحی خارج کرده و به جای آن یک عدسی مصنوعی قرار می‌دهند و با کمک عینک بینایی بیمار را تا حدی بر می‌گردانند.
- 57 اگر کره چشم بیش از حد بزرگ باشد، تصویر در جلو شبکیه تشکیل می‌شود که به این حالت **نزدیک بینی** گویند.
- 58 نزدیک بینی با استفاده از عینک‌های دارای **لنژهای واگرا** (مقعر) اصلاح می‌شود.
- 59 اگر کره چشم بیش از حد کوچک باشد، تصویر در پشت شبکیه تشکیل می‌شود که به این حالت دور بینی گویند.
- 60 دوربینی با استفاده از عینک‌های دارای **لنژهای همگرا** (محدب) اصلاح می‌شود.
- 61 اگر سطح قرنیه و یا عدسی کاملاً کروی و صاف نباشد، پرتوهای نوری درست بر روی شبکیه متمرکز نمی‌شوند و تصویر واضحی ایجاد نمی‌شود که به این حالت **آستیگماتیسم** گفته می‌شود.
- 62 برای درمان آستیگماتیسم از عینکی استفاده می‌شود که عدسی آن عدم یکنواختی انحنای قرنیه و عدسی را جبران کند.

گوش

- گوش ما: ۱- امواج صوتی را به پیام عصبی تبدیل کرده و به مغز ارسال می‌کند (شنوایی). -63
- ۲- همچنین گوش در حفظ تعادل نیز نقش دارد. -64
- گوش از سه بخش: ۱- بیرونی ۲- میانی ۳- درونی تشکیل شده است. -64
- گوش بیرونی شامل: ۱- لاله‌گوش ۲- مجرای گوش است. -65
- کار گوش بیرونی، جمع آوری امواج صوتی و انتقال آنها به گوش میانی است. -66
- درون مجرای گوش موهای ظریفی وجود دارد که هوا را تصفیه می‌کنند. -67
- همچنین درون مجرای گوش، غده‌های عرق تغییر شکل یافته‌ای وجود دارند که ماده مووم مانندی را ترشح می‌کنند. -68
- کار این ماده مووم مانند این است که از ورود مواد خارجی به گوش جلوگیری می‌کند. -69
- بخش انتهایی مجرای گوش و نیز گوش میانی و درونی توسط استخوان گیجگاهی جمجمه محافظت می‌شود. -70
- مجرایی به نام شیپور استاش رابط هوا بین گوش میانی و حلق است. -71
- شیپور استاش هوا را بین گوش میانی و حلق انتقال می‌دهد تا فشار هوا در دو طرف پرده‌های صماخ یکسان شود. -72
- در انتهایی مجرای گوش، پرده‌ای به نام پرده‌های صماخ وجود دارد که در اثر برخورد امواج صوتی، مرتعش می‌شود. -73
- در پشت پرده‌های صماخ (گوش میانی) ۳ استخوان کوچک به نام‌های: ۱- چکشی ۲- سندانی ۳- رکابی به ترتیب قرار دارند. -74
- این سه استخوان، ارتعاش پرده‌های صماخ را به معنی که محفظه گوش درونی را پر کرده است انتقال می‌دهند. -75
- بخشی از محفظه گوش درونی، حلزون شنوایی نام دارد که دلیل آن شکل ظاهری آن است که شبیه حلزون پیچ خورده‌گی دارد. -76
- در حلزون شنوایی، نوعی گیرنده‌های مکانیکی به نام سلول‌های مژکدار قرار دارد. -77
- ارتعاش مایع درون حلزون، سرانجام باعث تحریک سلول‌های مژکدار می‌شود و پیام عصبی تولید می‌شود که توسط عصب شنوایی به مغز فرستاده می‌شود. -78
- در بخش گوش درونی، سه مجرای نیم دایره نیز وجود دارند که بر یکدیگر عمود هستند و درون آنها نیز پر از مایع است. -79
- در مجراهای نیم دایره نیز سلول‌های مژکدار وجود دارد که در اثر حرکت سر و جابجایی مایع درون مجراهای تحریک می‌شوند و پیام عصبی تولید می‌کنند. -80
- پیام‌های عصبی مجراهای نیم دایره توسط عصب دیگری به نام عصب تعادلی به مغز فرستاده می‌شود. -81
- نتیجه اینکه از گوش دو عصب خارج می‌شود: ۱- عصب شنوایی ۲- عصب تعادلی. -82

زبان	
بر روی زبان هزاران جوانه چشایی وجود دارد.	-83
یک جوانه چشایی خود شامل 50 تا 100 سلول چشایی است.	-84
سلول های چشایی، گیرنده های شیمیایی 4 مزه اصلی هستند (شیرینی .. شوری .. ترشی .. تلخی).	-85
نوک زبان به مزه <u>شیرینی</u> ، کناره های زبان به مزه <u>شوری</u> و <u>ترشی</u> و عقب زبان به مزه <u>تلخی</u> حساس هستند.	-86
با حل شدن مولکولهای غذا در بزاق، مولکول ها به پروتئین های غشای سلول های چشایی متصل و آنها را تحریک می کنند و پیام عصبی تولید می شود.	-87
بینی	
در بینی گیرنده های شیمیایی مربوط به تشخیص بوها قرا دارند (گیرنده های بویایی).	-88
گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند.	-89
ترکیبات شیمیایی موجود در هوا پس از حل شدن در مخاط بینی، سلول های گیرنده را تحریک و پیام عصبی بویایی تولید می شود.	-90
حس بویایی بر درک مزه غذا نیز تأثیر دارد.	-91
در هنگام سرماخوردگی که دچار گرفتگی بینی شده ایم، به نظر می رسد که اغلب غذاهای بی مزه اند.	-92
پردازش اطلاعات حسی	
شیار هایی عمیق، نیمکره های مخ را به 4 ناحیه (لوب) تقسیم می کنند: a- لوب پس سری b- لوب آهیانه c- لوب گیجگاهی d- لوب پیشانی	-93
پردازش اطلاعات بینایی در لوب پس سری و پردازش اطلاعات شنوایی در لوب گیجگاهی صورت می گیرد.	-94
احتمالاً همه جانوران گیرنده درد دارند.	-95
موهای سیل گربه و خرس در قاعده خود دارای گیرندهای لمس بسیار حساس هستند که به جانور امکان می دهد که در تاریکی نیز اشیای نزدیک خود را تشخیص دهد.	-96
ماهی های استخوانی خط جانبی دارند که در دو سوی بدن ماهی امتداد یافته است.	-97
خط جانبی ماهی حاوی گیرندهای مکانیکی است و نسبت به ارتعاش امواج آب حساس اند.	-98
جانور به کمک خط جانبی قادر است از حرکت ماهی های دیگر در پیرامون خود مطلع شود.	-99
خط جانبی در واقع کanalی است که در زیر پوست ماهی قرار دارد و به وسیله سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط پیدا می کند.	-100

- 101 درون این کانال ساختار های متعددی به نام **کاپولا** قرار دارد که هر کاپولا حاوی سلول های مژه دار مخصوصی است که مژه های آن با ماده ژلاتینی پوشانده شده است.
- 102 جریان آب در خط جانبی سبب حرکت کاپولا و تحريك سلول های مژه دار می شود ، در نتیجه وجود هر نوع جسم متحرک در اطراف ماهی به دلیل امواج حاصل از حرکت آن جسم ، توسط خط جانبی ماهی تشخیص داده می شود.
- 103 ماهی به کمک خط جانبی قادر به تشخیص اجسام ساکن نیز هست که بر مبنای **بازتاب حاصل از برخورد لرزش ها** به جسم ساکن است .
- 104 یکی از حساس ترین انواع گیرنده های شیمیایی روی شاخک جنس نر نوعی پروانه ابریشم قرار دارد.
- 105 شاخک این جانور را ، هزاران جسم مو مانند ظریف پوشانده که اغلب دارای گیرنده های شیمیایی قوی هستند.
- 106 این گیرنده های شیمیایی به بوی بدن **جنس ماده** حساس اند و با برخورد مولکول های بوی بدن جنس ماده تحريك می شوند.
- 107 ساده ترین گیرنده های نوری در پلاناریا وجود دارد که **چشم جامی** شکل نامیده می شود.
- 108 چشم جامی شکل از گروهی از سلول های تیره رنگ تشکیل شده است که بخش هایی از سلول های گیرنده نور را می پوشانند.
- 109 سلول های گیرنده نور مولکول هایی به نام رنگیزه های بینایی دارند که نور را جذب و به پیام عصبی تبدیل می کنند و به مغز جانور می فرستند.
- 110 بر اساس موقعیت جانور و اینکه کدام قسمت از سلول های گیرنده نور دریافت کنند ، مغز شدت و چهت نور را تعیین می کند و دستور فرار از نور و پیدا کردن جای مناسب برای پنهان شدن را صادر می کند.
- 111 **خرچنگ ها و حشرات** دارای **چشم مرکب** هستند.
- 112 چشم مرکب از تعداد زیادی واحد مستقل بینایی که هر کدام یک قرنیه و یک عدسی دارد و نور را بر روی تعدادی سلول گیرنده متتمرکز می کند ، تشکیل شده است.
- 113 چون هر یک از واحد ها ، نور را از بخش کوچکی از میدان دید دریافت می کند ، در نتیجه تصویری که تشکیل می شود ، **حالت موزائیکی** دارد.
- 114 جانور به کمک چشم مرکب قادر است جزئی ترین حرکات محیطی را تشخیص دهد و وجود شکارچی را به موقع احساس کند.
- 115 بعضی حشرات مانند **زنبور عسل** ، با استفاده از چشم مرکب قادر به دیدن **رنگ ها** و حتی **پرتو های فرابینفش** هستند.
- 116 این مسأله به جانور امکان می دهد که گل های تولید کننده شهد را بهتر دریابی کند.
- 117 نور مرئی بخش کوچکی از طیف تابش های الکترومغناطیسی است که محدوده بین طول موج های بنفش تا قرمز را شامل می شود.
- 118 امواجی با طول موج کوتاهتر یا بلندتر از این دو برای انسان قابل روئیت نیستند.
- 119 بسیاری از حشرات می توانند این پرتو ها را ببینند که این توانایی در گرده افسانی مهم است.
- 120 بعضی گل ها **الگوهایی** دارند که برای ما قابل دیدن نیست ، اما اگر با یک فیلم حساس به پرتوهای قرابینفش از آنها عکس بگیریم ، آن الگوها را خواهیم دید . این الگوها حاوی اطلاعاتی برای حشرات گرده افسان هستند.
- 121 در آن سوی طیف مرئی نور ، **پرتوهای فرو سرخ** قرار دارند که ما آنها را به صورت **گرما** حس می کنیم.
- 122 پرتوهای فرو سرخ می توانند با تابش از سطح بدن شکار ، موقعیت آن را برای شکارچی مشخص کنند.

- 123 بعضی از مارهای زنگی ، در جلو چشم خود دارای دو سوراخ حساس به امواج فروسرخ هستند.
- 124 این مارها می توانند در تاریکی مطلق ، با نهایت دقیق ، شکار کنند.
- 125 تعدادی از گونه ها با انتشار امواج صوتی در محیط و تجزیه و تحلیل پژواک آن ، تصویری از محیط ایجاد کنند.
- 126 خفاش ها ، دلفین ها و به مقدار کمتری وال ها ، پژواک سازی می کنند.
- 127 بعضی خفاش ها امواجی تولید می کنند که از محدوده شنوایی ما خارج است و خفاش برای اینکه کرنشود در گوش میانی خود **ماهیچه هایی** دارد که با منقبض کردن آنها حساسیت گوش را در هنگام تولید امواج کاهش می دهند .
- 128 خفاش در هنگام دریافت پژواک ها فوراً این ماهیچه ها را به حالت استراحت در می آورد.
- 129 خفاش می تواند در یک اتاق کاملاً تاریک که در سراسر آن تارهای سیمی کشیده اند به دقیق حشرات در حال پرواز را شکار کند و از لای سیم ها بگذرد.
- 130 بعضی ماهی ها مثل **گربه ماهی** ، در خط جانبی خود **گیرنده های الکتریکی** دارند که آن را قادر می سازد تا میدان های الکتریکی ضعیفی را که توسط طعمه تولید می شود ، تشخیص دهد.
- 131 **مارماهی** در دم خود اندامی حساس به الکتریسته دارد که به طور پیوسته ، تکانه های الکتریکی تولید می کند و در نتیجه میدان ضعیفی در اطراف او ایجاد می شود ، هر شیئی که در اطراف ماهی قرار داشته باشد، سبب آشفتگی در خطوط این میدان می شود و **گیرنده های الکتریکی** خط جانبی در مارماهی را تحریک می کند.

نکات فصل 4 .. هورمون ها و دستگاه درون ریز

- هورمون ها موادی هستند که سلول های خاصی آنها را به درون خون ترشح می کنند تا فعالیت سلول های دیگری را در بدن تنظیم کنند.
- سلول هایی که تحت تأثیر هورمون قرار می گیرند، سلول های هدف نامیده می شوند.
- کار کلی هورمون ها در اصل، **هماهنگ کردن** فعالیت های بافت ها و اندام های گوناگون بدن با همدیگر است.
- چهار عمل اصلی هورمون ها عبارتند از :
 - a. **تنظیم فرآیند های مختلف**؛ از قبیل رشد .. نمو .. رفتار و تولید.
 - b. **ایجاد هماهنگی**؛ بین تولید .. مصرف و ذخیره انرژی.
 - c. **حفظ حالت پایدار بدن** مثل: ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف درون بدن.
 - d. **وادار کردن بدن به انجام واکنش در برابر**؛ محرک ها .. مانند: ستیز و گریز.
- هورمون ها، نوعی **پیک شیمیایی** هستند.
- **پیک شیمیایی، ماده ای شیمیایی** است که پیامی را از بخشی از بدن به بخش یا بخش های دیگری از بدن می رساند.
- هورمون ها بعد از ترشح **توسط جریان خون**، خود را به سلول های هدف می رسانند.
- **پیک های شیمیایی** مثل: انتقال دهنده های عصبی که وارد خون نمی شوند، هورمون محسوب نمی شوند.
- دستوری که هورمون به سلول هدف می دهد، هم بستگی به نوع هورمون و هم بستگی به سلول هدف دارد.
- یک نوع هورمون می تواند بر دو نوع سلول هدف، دو تأثیر متفاوت داشته باشد.

هورمون ها در اندام ها و بافت های خاصی ساخته می شوند

- **غده، اندامی** است که سلول های آن موادی از خود ترشح می کنند.
- **غده درون ریز اندامی** است که کار اصلی آن ترشح هورمون است.
- بعضی از اندام های بدن، ضمن انجام کارهای خاص خود، ترشح هورمون را نیز به عنوان یک **وظیفه فرعی**، انجام می دهند.
- **مغز .. معده .. روده باریک .. کلیه و قلب**، نمونه این اندام ها هستند که دارای سلول های درون ریز هستند.
- به **مجموعه غده ها و سلول های درون ریز** بدن، دستگاه درون ریز گفته می شود.
- **غده برون ریز**، غده ای است که مواد خاصی را به درون ساختار های لوله مانند خود که مجرحا نامیده می شوند، ترشح می کند.
- این مجرحا، ماده ترشح شده را به قسمت های خاصی که در درون یا بیرون بدن است، هدایت می کنند.

-18 دستگاه درون ریز ، به ترتیب از بالا به پائین دارای قسمت های اصلی زیر است :

1- هیپوتalamوس 2- هیپوفیز 3- پینهآل (صنوبری) 4- تیروئید 5- پارا تیروئید

6- تیموس 7- فوق کلیه 8- پانکراس (لوزالمعده) 9- غدد جنسی (بیضه ها در مردان .. تخمدان ها در زنان)

-19 قسمت برون ریز پانکراس ، بی کربنات و آنزیم های گوارشی می سازد که به روده باریک می ریزند ؛ و قسمت درون ریز آن دو هورمون انسولین و گلوکاگن می سازد که هر دو در تنظیم قند خون دخالت دارند.

-20 پانکراس ، غده ای است که هم دارای قسمت درون ریز و هم دارای قسمت برون ریز است .

-21 غدد برازی .. غده های عرق .. غده های ترشح کننده آنزیم های گوارشی و جگر (با تولید صفرا) ، نمونه هایی از غدد برون ریز می باشند.

-22 در مقایسه هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی می توان گفت که شباهت آنها این است که هر دوی آنها پیک شیمیایی هستند . تفاوت آنها در این

است که :

a. به پیک شیمیایی دستگاه درون ریز ، هورمون می گویند .. ولی به پیک شیمیایی دستگاه عصبی ، انتقال دهنده عصبی.

b. انتقال دهنده های عصبی عمل سریع و عمر کوتاه دارند .. ولی هورمون ها اثرات کندتر و طولانی تری ایجاد می کنند.

c. انتقال دهنده های عصبی از نورون آزاد می شوند و به فضای سیناپسی می ریزند .. ولی هورمون ها از سلول های درون

ریز به داخل مایع میان بافتی و سپس خون ترشح می شوند.

-23 بعضی مواد در دستگاه عصبی نقش انتقال دهنده عصبی و در دستگاه درون ریز نقش هورمون دارند مثل اپی نفرین .

مکانیسم عمل هورمون ها

-24 هورمون ها عمل اختصاصی دارند ، یعنی اینکه فقط به سلول های هدف متصل می شوند و بر آنها اثر می کنند.

-25 اگر هورمون ها به صورت اختصاصی عمل نمی کردند ، با آزاد شدن آن ، همه سلول های بدن تحت تأثیر قرار می گرفت و فعالیت های نامنظمی ایجاد می شد.

-26 هورمون ها سلول های هدف را از روی گیرنده آن شناسایی می کنند.

-27 گیرنده مولکولی است که روی سلول و یا درون سلول (درون سیتوپلاسم یا هسته) قرار دارد و از نظر شکل سه بعدی به گونه ای است که فقط با

ماده شیمیایی مکمل خود (مثلاً هورمون) جفت و جور می شود.

-28 گیرنده ها معمولاً ساختار پروتئینی دارند.

انواع هورمون ها

- 29 هورمون ها را می توان در دو گروه : 1- هورمون های آمینو اسیدی 2- هورمون های استروئیدی قرار داد.
- 30 هورمون های آمینو اسیدی از یک آمینو اسید تغییر شکل یافته(مانند تیروکسین) ، یا تعدادی آمینو اسید به هم متصل شده (پروتئین) تشکیل شده است.
- 31 هورمون استروئیدی ، دارای ساختار لبیدی هستند و از کلسترول ساخته می شوند.
- 32 چون هورمون های آمینو اسیدی نمی توانند از غشای سلول عبور کنند ، گیرنده آنها بر روی غشای سلول قرار دارد.
- 33 مراحل عمل هورمون های آمینو اسیدی به شرح زیر است :
- .a. با اتصال هورمون به گیرنده ، شکل گیرنده را تغییر می دهد .
 - .b. این تغییر شکل سبب ایجاد ماده ای در درون سلول می شود که به آن پیک دومین گفته می شود.
 - .c. پیک دومین سبب فعال یا غیر فعال شدن یک آنزیم یا زنجیره ای از آنزیم ها در درون سلول می شود.
 - .d. سرانجام فعالیت سلول هدف در اثر تغییر عملکرد آنزیم یا آنزیم ها بی که گفته شد ، تغییر می کند.
- 34 در واقع پیک اول همان هورمون است و پیک دوم ، AMP حلقوی است که از تغییر ATP به وجود می آید.
- 35 هورمون های استروئیدی به راحتی در غشای سلول حل شده و از آن عبور می کنند.
- 36 گیرنده هورمون های استروئیدی ، در سیتوپلاسم و یا هسته سلول هدف قرار دارند.
- 37 بعد از اتصال هورمون استروئیدی به گیرنده خود ، فعالیت سلول تغییر می کند.
- 38 گلوکagon یک هورمون آمینواسیدی است که گیرنده آن بر روی غشا قرار دارد .
- 39 تیروکسین نیز یک هورمون آمینواسیدی است ولی گیرنده آن در داخل هسته قرار دارد (استثناء هورمون های آمینو اسیدی).
- 40 تنظیم ترشح یک هورمون بر اساس مقدار همان هورمون در خون را خود تنظیمی گویند.
- 41 خود تنظیمی به دو صورت منفی و مثبت وجود دارد.
- 42 اگر زیاد شدن یک هورمون در خون ، سرانجام سبب کاهش ترشح آن هورمون شود و بر عکس ، به این حالت مکانیسم خود تنظیمی منفی گفته می شود.
- 43 اگر زیاد شدن یک هورمون در خون ، سرانجام سبب افزایش ترشح آن هورمون شود و بر عکس ، به این حالت مکانیسم خود تنظیمی مثبت گفته می شود.
- 44 بیشتر مکانیسم های خود تنظیمی هورمون ها از نوع خود تنظیمی منفی هستند.

غده های درون ریز اصلی بدن

- 45 دو غده درون ریز **هیپوتالاموس** و **هیپوفیز** ترشح اولیه بسیاری از هورمون ها را کنترل می کنند و **مرکز اصلی کنترل** برای سایر غدد درون ریز هستند.
- 46 هیپوتالاموس مرکزی در مغز است که فعالیت های **دستگاه عصبی** و **دستگاه درون ریز** را با هم هماهنگ می کند.
- 47 هیپوتالاموس همچنین بسیاری از اعمال بدن مثل **دماهی بدن** .. **فشار خون** .. **احساسات** و .. را هم کنترل می کند.
- 48 هیپوتالاموس از قسمت های دیگر مغز اطلاعاتی را درباره شرایط بدن به دست می آورد و سپس به این اطلاعات و نیز غلظت هورمون ها در خون پاسخ می دهد.
- 49 هیپوتالاموس در واقع با صادر کردن دستورهایی به غده هیپوفیز کار کنترل هورمونی خود را انجام می دهد.
- 50 دستورهای هیپوتالاموس به هیپوفیز ، با آزاد کردن هورمون های آزاد کننده و یا هورمون های مهار کننده ای است که از راه رگهای خونی ، به هیپوفیز می رساند.
- 51 هیپوفیز هم در پاسخ به هورمون های هیپوتالاموس ، مقدار هورمون های تولیدی خود را تغییر می دهد.
- 52 هیپوفیز دو دسته هورمون تولید می کند :
- 1- هورمون هایی که مستقیماً روی **سلول های هدف** خود اثر می گذارند.
 - 2- هورمون هایی که بر روی سایر غدد درون ریز دیگر اثر می کنند و کار آنها را کنترل می کنند.
- 53 بعضی از سلول های عصبی هیپوتالاموس دارای آکسون هایی هستند که تا **قسمت پشتی غده هیپوفیز پسین** ادامه می یابند . این سلول ها دو هورمون به نام های **اکسی توسین** و **هورمون ضد ادراری** تولید می کنند که در هنگام لزوم وارد خون می شوند.
- 54 **اکسی توسین** سبب خروج شیر از غده های پستانی مادر و نیز سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان می شود.
- 55 **هورمون ضد ادراری** سبب می شود که در موقع لزوم ، ادرار غلیظ شود و در نتیجه آب بدن حفظ شود.
- 56 غده تیروئید غده درون ریز سپری شکلی است که در جلوی گلو قرار گرفته است .
- 57 کلمه تیروئید از کلمه یونانی " **تیروس** " به معنی " **سپر** " گرفته شده است.
- 58 غده تیروئید ، هورمون های تیروئیدی تولید می کند که :
1. تنظیم سوخت و ساز بدن.
 2. رشد طبیعی مغز ، استخوان و ماهیچه ها را طی **دوران کودکی** افزایش می دهند.
- 59 هورمون های تیروئیدی در بزرگسالان در **افزایش هوشیاری** نقش دارند.
- 60 هورمون های تیروئیدی آمینواسید های تغییر شکل یافته ای هستند که از **افزوده شدن** بد به آمینواسید تیروزین ایجاد می شوند.(تیروکسین)

- 61- اگر نمک های ید در غذا کم باشند ، غده تیروئید به خاطر تلاش بیشتر برای ساخت هورمون بزرگ می شود که به غده تیروئید بزرگ گواهر گفته می شود.
- 62- گواهر با افزودن ید به نمک خوراکی قابل پیشگیری است.
- 63- اگر میزان تولید هورمون های تیروئیدی در بدن کم شود ، اصطلاحاً به آن کم کاری تیروئید (هیپو تیروئیدیسم) گفته می شود.
- 64- کم کاری تیروئید در کودکان ممکن است باعث کاهش رشد بدن و یا عقب افتادگی ذهنی و یا هر دوی این عوارض شود.
- 65- کم کاری تیروئید در بزرگسالان ممکن است سبب خشکی پوست .. کمبود انرژی بدن و افزایش وزن بدن شود.
- 66- افزایش تولید هورمون تیروئید در بدن را پرکاری تیروئیدی (هایپر تیروئیدیسم) گویند.
- 67- پرکاری تیروئید در بزرگسالان ممکن است سبب بی قراری .. اختلالات خواب .. افزایش ضربان قلب و کاهش وزن شود.

تنظیم مقدار کلسیم بدن

- 68- بالا بودن مقدار کلسیم در خون سبب ترشح هورمونی به نام کلسی تونین از غده تیروئید می شود.
- 69- کلسی تونین سبب افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوانی و در نتیجه کاهش آن در خون می شود.
- 70- کلسیم برای انقباض ماهیچه ها و نیز برای ترشح بعضی مواد از سلول ها ... لازم است.

رابطه غده پاراتیروئید و کلسیم

- 71- چهار غده پاراتیروئید به پشت غده تیروئید چسبیده اند .
- 72- غدد پاراتیروئید هورمونی به نام پاراتورمون تولید می کنند.
- 73- پاراتورمون باعث افزایش کلسیم خون می شود و عمل آن بر عکس کلسی تونین است.
- 74- این هورمون در سه قسمت اثر می کند :

- .a. سلول های استخوانی را وادار می کند تا بافت استخوانی را تجزیه کنند و کلسیم را به جریان خون بریزند.
- .b. در کلیه ها سبب افزایش باز جذب کلسیم از ادرار می شود.
- .c. این هورمون سبب فعال شدن ویتامین D در روده ها می شود که نتیجه آن افزایش جذب کلسیم از غذا خواهد بود.

غده فوق کلیه

- 75- در بدن انسان دو غده فوق کلیه وجود دارد که روی کلیه ها قرار دارند و هر کدام به اندازه یک بادام هستند.
- 76- هر غده فوق کلیه ، خود در اصل از دو غده تشکیل شده است : 1- بخش مرکزی غده فوق کلیه 2- بخش قشری غده فوق کلیه

پاسخ آنی به فشارهای روحی .. جسمی

- 77 قسمت مرکزی فوق کلیه در موقع فشار روحی .. جسمی مانند یک دستگاه هشدار دهنده عمل می کند و **هورمون های ستیز و گریز** را آزاد می کند.
- 78 هورمون های ستیز و گریز عبارتند از : **1- اپی نفرین (آدرنالین) 2- نور اپی نفرین (نورآدرنالین)**.
- 79 اثر هورمون های ستیز و گریز ، آماده کردن بدن برای موقع اضطراری است.
- 80 عمل این هورمون ها در واقع شبیه به عمل دستگاه عصبی **سمپاتیک** است اما اثر این هورمون ها طولانی تر است.
- 81 هورمون های ستیز و گریز باعث :
- a. افزایش ضربان قلب
 - b. افزایش فشار خون
 - c. افزایش قند خون
 - d. افزایش جریان خون به قلب و ششها می شوند.

پاسخ دیرپا به فشارهای روحی.. جسمی

- 82 قسمت قشری غده فوق کلیه خصوصاً دو هورمون مهم تولید می کند که عبارتند از : **1- کورتیزول 2- آلدوسترون**.
- 83 این هورمون ها نسبت به اپی نفرین و نور اپی نفرین ، پاسخ آهسته تر اما دیرپاتری در برابر فشار ها ایجاد می کنند.
- 84 کورتیزول مقدار انرژی در دسترس بدن را زیاد می کند و باعث افزایش قند خون می شود و پروتئین ها را برای مصرف انرژی می شکند.
- 85 وجود مقادیر زیاد کورتیزول در بدن ، سبب سرکوب سیستم ایمنی می شود.
- 86 آلدوسترون باعث می شود که کلیه ها دفع سدیم از طریق ادرار را کاهش دهند و در عوض پتاسیم را بیشتر دفع کنند.
- 87 کاهش دفع سدیم باعث افزایش غلظت آن در خون و در نتیجه افزایش فشار خون می شود که برای مقابله با فشار های روحی..جسمی مناسب است.
- 88 کمبود آلدوسترون سبب افزایش پتاسیم خون می شود که گاهی خطرناک و کشنده است.

پانکراس (لوزالمعده) و تنظیم قند خون

- 89 پانکراس دارای دو بخش درون ریز و برون ریز است.
- 90 بخش درون ریز آن شامل مجموعه هایی از سلول ها است که **جزایر لانگرهانس** نامیده می شوند.
- 91 جزایر لانگرهانس دو هورمون تولید می کنند که در کنترل مقدار قند خون دخالت دارند : **1- انسولین 2- گلوکاگن**.

-92 انسولین به دو صورت زیر باعث تولید گلیکوژن موجب افزایش ذخیره قند بدن و کاهش قند خون میشود :

a. افزایش تولید و تجمع گلیکوژن در کبد.

b. همچنین با جذب گلوکز توسط سلول های ماهیچه ای و تبدیل آن به گلیکوژن.

-93 گلوکاگن با تجزیه گلیکوژن کبد به گلوکزهای سازنده آن و ورود آن ها به خون ، قند خون را افزایش می دهد.

-94 عمل انسولین و گلوکاگن در کبد و تنظیم قند خون بر عکس یکدیگر است.

دیابت شیرین

-95 دیابت شیرین ، یک نوع بیماری شایع است که در آن سلول ها ، توانایی گرفتن گلوکز خون را ندارند و در نتیجه قند خون زیاد می شود.

-96 در بیماری دیابت شیرین :

a. کلیه ها قند اضافه خون را دفع می کنند .

b. چون آب هم به همراه گلوکز دفع می شود ، حجم ادرار شخص افزایش می یابد .

c. به دلیل دفع آب شخص احساس تشنگی دارد.

d. سلول ها از چربی و پروتئین خود برای انرژی استفاده می کنند که تولید محصولات اسیدی خواهد کرد .

e. به خاطر تولید محصولات اسیدی و ورود آنها به خون ، خون اسیدی می شود (PH خون پائین می آید) که می تواند موجب اغما و یا

حتی مرگ شود

-97 دو نوع دیابت وجود دارد : 1- دیابت نوع یک 2- دیابت نوع دو

-98 دیابت نوع 1 که درصد کمی به آن مبتلا هستند ، یک نوع بیماری ارشی خود ایمنی است که در آن دستگاه ایمنی به جزایر لانگرهانس حمله می کند

و توانایی تولید انسولین در بدن کاهش می یابد.

-99 به دیابت نوع 1 ، دیابت واپسته به انسولین هم گفته می شود چون با تزریق روزانه انسولین علائم بیماری از بین میروند .

-100 دیابت نوع 1 معمولاً قبل از بیست سالگی ایجاد می شود.

-101 در دیابت نوع دو ، مقدار انسولین در خون از حد طبیعی بیشتر است ولی تعداد گیرنده های انسولین در سطح سلول ها کم است.

-102 دیابت نوع دو معمولاً در سنین بالاتر از 40 سال و به دنبال چاقی و عدم تحرک در افرادی که زمینه ارشی دارند ، ایجاد می شود.

-103 دیابت نوع دو معمولاً با ورزش ، مراعات رژیم غذایی و با کمک داروهای خوارکی ، کنترل می شود.

غده پینه آل

-104 به اندازه یک نخود است و در مغز قرار دارد.

-105 هورمون غده پینه آل مالاتونین نام دارد.

-106 حدس زده می شود که ملاتونین در انسان ، در پاسخ به تاریکی ترشح می شود و بنابراین احتمالاً در ایجاد ریتم های شبانه روزی دخالت دارد.

نکات فصل ۵ .. ماده ژنتیک

-1 عاملی که باعث انتقال صفات و ویژگی ها از نسل به نسل دیگر می‌شود، **ماده ژنتیک** نام دارد.

-2 در ماده ژنتیک **اطلاعات و دستورالعمل هایی** نهفته است که بسیاری از ویژگی های جاندار به آن بستگی دارد.

-3 برای آنکه مولکولی بتواند نقش ماده ژنتیک را داشته باشد باید:

a. بتواند اطلاعات ژنتیک را در خود ذخیره کند.

b. آنها را از نسلی به نسل دیگر منتقل کند.

c. نسبتاً پایدار باشد تا بتواند در سراسر زندگی فرد، خود را حفظ کند.

در جستجوی ماده ژنتیک

-4 در سال ۱۹۲۸، فردریک گریفیت که باکتری شناس بود، سعی داشت تا واکسنی علیه باکتری مولد ذات الریه بسازد.

-5 نام علمی باکتری مولد ذات الریه، **استرپتوکوکوس نومونیا** می‌باشد.

-6 گریفیت روی دو سویه از این باکتری کار می‌کرد که یکی از آنها **کپسولی پلی ساکاریدی** دارد که اطراف باکتری را احاطه کرده ولی دیگری بدون

کپسول پلی ساکاریدی است.

-7 سویه کپسول دار باعث ایجاد بیماری می‌شود ولی سویه بدون کپسول بیماری‌زا نیست.

-8 آزمایش‌های گریفیت به ترتیب زیر است:

a. او باکتری‌های کپسول دار را به موش‌ها تزریق کرد و دید که موش‌ها بیمار شدند و لی با تزریق باکتری‌های بدون کپسول موش‌ها بیمار

نشدند.

b. گریفیت برای اینکه بفهمد آیا کپسول باعث بیماری می‌شود، تعدادی باکتری کپسول دار را با گرمکش و به موش‌های سالم

تزریق کرد و

دید که این بار موش‌ها بیمار نشدند. در نتیجه فهمید که خود کپسول، عامل بیماری نیست.

c. او سپس باکتری‌های بدون کپسول زنده و باکتری‌های کپسول دار کشته شده را با هم مخلوط و به موش‌ها تزریق کرد و

مشاهده کرد

که همه موش‌ها بیمار شده و مردند.

d. او با کمال تعجب مشاهده کرد که در خون این موش‌ها، بعضی از باکتری‌های بدون کپسول، کپسول دار شده‌اند.

-9 تغییر شکل دادن باکتری‌های بدون کپسول و کپسول دار شدن آنها، **ترانسفورماسیون** نامیده می‌شود.

-10 باکتری‌های بدون کپسول با دریافت مواد ژنتیک از محیط خارج، در خصوصیات ظاهری خود، تغییراتی به وجود آورند.

آزمایش ایوری

- آزمایش ایوری به شناسایی عامل ترانسفورماتیون انجامید و ماهیت ماده ژنتیک را آشکار کرد.
- ایوری و همکارانش می دانستند که در سلول چهار نوع ماده شیمیایی اصلی وجود دارد و عامل ترانسفورماتیون هر چه باشد ، باید یکی از این چهار نوع باشد ، که عبارتند از : ۱-کربوهیدرات ها ۲- لیپید ها ۳- پروتئین ها ۴- نوکلئیک اسیدها
- در زمان ایوری ، آنزیم های تخریب کننده این چهار نوع ماده شیمیایی در دسترس بود.
- مراحل آزمایش به این صورت بود که :
- (a) آنان ابتدا **عصاره سلولی** باکتری های کپسول دار کشته شده را استخراج کردند.
 - (b) آنان این عصاره سلولی را چند قسمت کردند و به هر قسمت آنزیم تخریب کننده یکی از مواد شیمیایی اصلی را اضافه کردند.
 - (c) آنها کوشیدند که با هر قسمت به صورت جداگانه ، با وارد کردن باکتری های بدون کپسول زنده باعث ترانسفورماتیون بشوند.
- آنها مشاهده کردند که **فقط زمانی ترانسفورماتیون رخ می دهد** که نوکلئیک اسید (DNA) تخریب نشده باشد. در نتیجه عامل ترانسفورماتیون DNA می باشد.
- تا پیش از ایوری دانشمندان به دو دلیل فکر می کردند که عامل ترانسفورماتیون نوعی پروتئین است :
- پروتئین ها بسیار متنوع هستند ۲-پروتئین ها در سلول کارهای مختلفی انجام می دهند.
- ایوری دریافت که اگر پروتئین ها را با آنزیم تخریب کننده از بین ببریم ، باز هم ترانسفورماتیون انجام می شود . پس پروتئین نمی تواند عامل ترانسفورماتیون باشد.
- ایوری برای تحقیم ادعای خود ، DNA ای باکتری های کپسول دار را به صورت خالص تهیه کرد و آن را وارد محیط کشت باکتری های بدون کپسول کرد و مشاهده کرد که ترانسفورماتیون رخ می دهد. پس بدون تردید عامل ترانسفورماتیون ، DNA می باشد.
- ### ساختمان شیمیایی نوکلئیک اسید ها
- قبل از ایوری دانشمندان با ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها آشنایی داشتند اما از کار این مولکول ها اطلاعی نداشتند.
- در سال 1870 ، فدریک میشر از هسته سلول ، ماده ای استخراج کرد که خاصیت اسیدی داشت و به همین خاطر آن را **نوکلئیک اسید (اسید هسته‌ی)** نامید.
- نوکلئیک اسید های سلول دو نوع هستند : ۱- ریبو نوکلئیک اسید RNA ۲- دئوکسی ریبونوکلئیک اسید DNA .
- ریبو نوکلئیک RNA در ساختار خود دارای قند ریبوز است. ولی در DNA (دئوکسی ریبونوکلئیک اسید) قند دئوکسی ریبوز به کار رفته است.
- نوکلئیک اسید ها همانند قند ها نوعی پلی مر هستند و واحد های مونومری آنها نوکلئوتید نام دارد.

-24 هر نوکلئوتید خود از سه بخش تشکیل شده است:

- 2- یک قند 5 کربنه باز آلی نیتروژن دار (دو حلقه ای = پورین .. تک حلقه‌ای = پرمیدین)
- 25 قند 5 کربنه در DNA، دئوكسی ریبوز و در RNA، ریبوز است.
- 26 بازهای آلی نیتروژن دار در DNA چهار نوع هستند: 1- آدنین (A) 2- تیمین (T) 3- سیتوزین (C) 4- گوانین (G)
- 27 در RNA به جای باز آلی تیمین، باز آلی دیگری به نام یوراسیل (U) به کار رفته است.
- 28 تفاوت‌های RNA با DNA در:
- نوع قند (ریبوز در RNA و دئوكسی ریبوز در DNA).
 - تعداد رشته (tRNA) (اتک رشته ای و دو رشته‌ای).
 - باز آلی نیتروژن دار (در DNA تیمین و در RNA یوراسیل).
 - محل قرار گرفتن (DNA در هسته و RNA هم در هسته و هم در سیتوپلاسم) است.
- 29 از اتصال نوکلئوتید‌ها با یکدیگر، پلیمری خطی به وجود می‌آید که به آن رشته پلی نوکلئوتیدی گفته می‌شود.
- 30 اتصال نوکلئوتید‌ها با هم از طریق ایجاد پیوند کوالان، بین قند از یک نوکلئوتید با گروه فسفات از نوکلئوتید دیگر، صورت می‌گیرد.
- 31 نوکلئوتید‌ها به حالت آزاد سه گروه فسفات دارند ولی هنگام برقراری پیوند دو گروه فسفات (پیروفسفات) خود را از دست می‌دهند.
- 32 پیوند بین دو نوکلئوتید را پیوند فسفودی استر (نوعی کووالان) می‌نامند.
- 33 دو انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی با هم متفاوت هستند به صورتی که در یک انتهای فسفات داریم و در انتهای دیگر فسفات نداریم.
- 34 چون دو انتهای رشته پلی نوکلئوتیدی مثل هم نیست، می‌گویند که رشته پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است.

کشف ساختار DNA

-35 مشاهدات چارگف که:

- (a) در آغاز دهه ۱۹۵۰، مقدار بازهای DNA را در جانداران مختلف اندازه گیری کرد او مشاهده کرد که بین نسبت بازهای DNA رابطه خاصی وجود دارد به این صورت که:
- <> نسبت A به T و نسبت C به G برابر عدد 1 است <<
- (c) یعنی اینکه مقدار A و T و همچنین مقدار C و G با هم برابر است.
- 36 داده‌های حاصل از پراش پرتو X:
- (a) در این روش، پرتو X مستقیماً به بلور جسمی که می‌خواهد به ساختار آن پی ببرند، تابانده می‌شود و پرتوها پس از برخورد به جسم پراکنده می‌شوند و روی صفحه حساس فیلم که در پشت بلور قرار دارد، ثبت می‌شود.

- (b) پژوهشگران با تجزیه و تحلیل الگوهای پیچیده‌ای که روی فیلم ثبت می‌شود، می‌توانند ساختار مولکول را تعیین کنند.
- (c) این کار برای بررسی ساختار DNA انجام شد.
- 37 موریس ویلکینز و روزالین فرانکلین؛ با روش پراش اشعه X، تصاویری از بلور DNA تهیه کردند و با بررسی این تصاویر روشن کردند که مولکول DNA به صورت مارپیچی است که دو یا سه زنجیره دارد.
- 38 مدل واتسون و کریک:
- (a) این دو سرانجام در سال 1953 با کمک یافته‌های چارگف و داده‌های حاصل از روش پرتوهای X توسط ویلکینز و فرانکلین و نیز شناختی که خود از پیوند های شبیهایی داشتند، مدلی برای DNA پیشنهاد دادند.
- (b) مدل امروزی DNA، همان مدل واتسون و کریک است.
- (c) طبق مدل این دو، DNA :
- (i) از دو رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است که حول یک محور فرضی، به دور یکدیگر پیچ خورده اند. (مدل مارپیچ دو رشته‌ای)
- (ii) مارپیچ دو رشته ای شبیه نرده‌بانی است که حول یک محور فرضی پیچ خورده است.
- (iii) نرده‌های این نرده‌بان را گروه‌های قند..فسفات تشکیل میدهند و پله‌های آن را باز‌های آلی که به صورت جفت در مقابل هم هستند.
- (iv) بین باز‌های آلی که در مقابل هم هستند، پیوند هیدروژنی وجود دارد که همین پیوند های هیدروژنی بین بازها، دو رشته را در کنار هم نگه می‌دارد.
- (v) دو بازی که در دو رشته در مقابل هم هستند و با هم پیوند هیدروژنی دارند را جفت باز می‌نامند.
- (vi) جفت شدن باز‌ها از قوانین خاصی پیروی می‌کند که مربوط به ساختار بازها است به صورتی که مکمل هم هستند.
- (vii) همیشه آدنین از یک رشته در مقابل تیمین از رشته دیگر و سیتوزین از یک رشته در مقابل گوانین از رشته دیگر قرار می‌گیرد.
- 39 جفت بودن بازها در DNA، اصل چارگف را را توجیه می‌کند.
- 40 بر اساس جفت بودن باز‌ها می‌توان گفت که هر رشته مکمل رشته مقابل است.
- 41 ترتیب باز‌های یک رشته، ترتیب بازهای رشته مقابل را تعیین می‌کند.
- 42 تحقیقات نشان دهد است که اطلاعات وراثتی را ترتیب و تعداد بازها، تشکیل می‌دهند.
- 43 هیچ محدودیتی برای تعداد و ترتیب بازها در یک رشته وجود ندارد. اما با مشخص شدن توالی بازهای یک رشته، رشته مقابل باید مکمل آن باشد.

همانند سازی DNA

- 44 واتسون و کریک بیان کردند که وجود رابطه مکملی بین بازها در DNA می تواند در فرآیند همانند سازی آن نقش اساسی داشته باشد.
- 45 در همانند سازی DNA ، دو رشته آن به کمک آنزیم هلیکاز ، مانند زیپ از یکدیگر جدا می شوند و سپس از روی هر رشته ، رشته جدیدی ساخته می شود.
- 46 در همانند سازی ، با استفاده از نوکلئوتید های آزاد در سیتوپلاسم ، در مقابل A ، باز T و در مقابل C ، باز G قرار می گیرد.
- 47 چون هر DNA دختر ، یک رشته قدیمی و یک رشته جدید دارد ، می گویند که همانند سازی DNA به طریقه نیمه حفاظت شده است.
- 48 در همانند سازی دو ملکول DNA تولید می شود که هر یک دارای یک رشته DNA جدید و یک رشته DNA قدیمی هستند.
- 49 ردیف نوکلئوتید ها در هر یک از ملکول های DNA ی حاصل ، یکسان است.
- 50 همانند سازی DNA به کمک آنزیم DNA پلی مراز صورت می گیرد.
- 51 آنزیم DNA پلی مراز در طول DNA حرکت می کند و نوکلئوتید های آزاد را در مقابل نوکلئوتید مکمل خود در رشته قرار می دهد.
- 52 آنزیم DNA پلی مراز دارای توانایی ویرایش هم می باشد یعنی در صورتی که نوکلئوتیدی اشتباهی به DNA اضافه شود (مکمل نباشد) آنزیم DNA پلی مراز بر می گردد و آن را جدا کرده و نوکلئوتید درست را به جای آن قرار می دهد.
- 53 اگر DNA پلی مراز نتواند کار ویرایش را درست انجام دهد ، به این اشتباه تصحیح نشده جهش می گویند.
- 54 اگر جهش مربوط به سلول های جنسی باشد ، می تواند به نسل بعد نیز منتقل شود.
- 55 در همانند سازی ، دوراهی همانند سازی ایجاد می شود ، یعنی در یک نقطه خاص دوراهی باز می شود و همانند سازی پیش می رود .
- 56 در باکتری ها دو دوراهی همانند سازی ایجاد می شود که همانند سازی در آن ها در دو جهت پیش می رود تا سرانجام در نقطه ای مقابل نقطه شروع به همدیگر برسند.
- 57 در سلول های یوکاریوٹی ، به خاطر طویل بودن DNA ، چندین دوراهی همانند سازی ایجاد می شود تا کار همانند سازی سریعتر صورت گیرد.
- 58 اگر همانند سازی انسان مانند باکتری با دو دوراهی همانند سازی انجام می شد، همانند سازی هر کروموزوم 33 روز طول می کشید در حالی که این کار به خاطر وجود تعداد زیاد دوراهی های همانند سازی 8 ساعت به طول می انجامد.

نکات فصل 6 .. کروموزوم ها و میتوز

- 1 تولید مثل فرآیندی است که در طی آن جاندار، افراد نسل بعد خود را به وجود می آورد.
- 2 برای یافتن پاسخ پرسش های خود در مورد تولید مثل باید به سراغ سلول برویم چون هر جاندار یا خود یک سلول است (تک سلولی) یا زمانی یک سلول بوده است.
- 3 تقسیم سلول در سراسر طول زندگی یک جاندار، رخ می دهد.
- 4 تقسیم سلول باعث : 1- رشد و نمو بدن 2- ترمیم بخش های آسیب دیده 3- تولید مثل جاندار می شود.
- 5 تقسیم سلول انوع مختلفی دارد که عبارتند از :
- a- تقسیم دوتایی در باکتری ها برای تولید مثل.
 - b- تقسیم میتوز برای رشد و نمو و ترمیم و تولید مثل غیر جنسی .
 - c- تقسیم میوز برای ایجاد گامت به منظور تولید مثل جنسی .
- 6 در همه انواع تقسیم ها ، سلول در حال تقسیم ، سلول مادر و سلول های حاصل از تقسیم را سلول های دختر می نامند.
- 7 سلول های دختر به سلول مادر شباهت های فراوان دارند.
- 8 هنگام تقسیم ، ماده ژنتیک از سلول مادر به سلول های دختر منتقل می شود و خصوصیات سلول مادر را به سلول های دختر منتقل می کند.

تولید مثل باکتری ها

- 9 ساده ترین نوع تقسیم در باکتری ها دیده می شود (تقسیم دوتایی).
- 10 DNA ی باکتری ها ، مولکولی بسته یا حلقوی است که به غشای پلاسمایی متصل است.
- 11 تقسیم دوتایی نوعی تولید مثل غیر جنسی است که به تولید زاده های یکسان منجر می شود.
- 12 تولید مثل غیر جنسی ، تولید مثلی است که در آن فقط یک والد شرکت دارد و زاده ها کاملاً شبیه والد خود هستند.
- 13 تقسیم دوتایی به دنبال همانند سازی DNA صورت می گیرد که در طی آن با اضافه شدن غشای سلولی جدید به نقطه ای از غشا که بین دو مولکول DNA قرار دارد پیش می رود ، غشا از وسط به درون سلول فرو می رود تا سرانجام سلول را به دو نیم می کند. همزمان با فرورفتگی غشا ، دیواره سلول نیز در محل جدایی این دو سلول جدید تشکیل می شود.
- 14 در تقسیم دوتایی هر یک از دو سلول جدید دارای یکی از دو نسخه DNA می باشد که کاملاً یکسان هستند.
- 15 تکثیر سلول با تکثیر صفحه ای از کتاب متفاوت است چون در تکثیر صفحه کتاب نسخه اصلی تغییر نمی کند ولی در تقسیم سلول مادر دو سلول دختر به وجود می آید و سلول مادر دیگر به صورت قبلی وجود ندارد.

تولید مثل در سلول‌های یوکاریوتی

- 16- سلول‌های یوکاریوتی برخلاف سلول‌های پروکاریوتی، هسته‌ای سازمان یافته دارند و مادهٔ ژنتیک آنها توسط پوشش هسته از سیتوپلاسم جدا می‌شود.
- 17- بخش مهمی از DNA ای سلول‌های یوکاریوتی **درون هسته** و در اجزایی به نام **کروموزوم** جای دارد.
- 18- اطلاعات زیاد DNA در واحد هایی به نام **ژن** ذخیره شده است.
- 19- هر ژن؛ قسمتی از DNA است که برای ساختن **پروتئین** و یا RNA مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- 20- یک مولکول DNA هزاران ژن دارد که همانند واگن‌های قطار به دنبال هم قرار گرفته‌اند.
- 21- ژن‌ها نقش مهمی در **رشد** و **نمودن** و **تنظیم کارکرد** بدن بر عهده دارند.
- 22- درون هسته سلول‌های یوکاریوتی، معمولاً چندین **کروموزوم** قرار دارد.
- 23- هر کروموزوم حاوی DNA و **پروتئین** است.
- 24- وقتی سلول در حال **تقسیم نیست**، کروموزوم‌ها به صورت رشته‌های بلند و باریک و در هم تنیده به نام **کروماتین** قرار دارند.
- 25- وقتی سلول برای **تقسیم آمده** می‌شود، هر یک از رشته‌های نامشخص کروماتین، همانند سازی می‌کنند و سرانجام **کروموزوم**‌های مضاعف شده را به وجود می‌آورند.
- 26- هر رشته کروماتین در اصل یک کروموزوم است.
- 27- در هنگام **تقسیم**، هر رشته بلند و باریک کروماتین، **کوتاه و قطور و فشرده** می‌شود که در این حالت به آن **کروماتید گفتہ** می‌شود.
- 28- در کروموزوم مضاعف شده، دو کروماتید در ناحیه‌ای به نام **سانترومر** به هم متصل می‌شوند.
- 29- دو کروماتید متصل به هم در کروموزوم‌های مضاعف شده، **کروماتید های خواهری** نامیده می‌شوند که **کاملاً همانند یکدیگر** هستند.
- 30- **فشرده شدن** DNA به کمک **پروتئین هایی** به نام **هیستون** صورت می‌گیرد.
- 31- DNA در محل‌هایی، حدود دو دور به دور **مجموعه هشت** تایی مولکول‌های **هیستون** می‌پیچد و ساختاری به نام **نوکلئوزوم** به وجود می‌آورد.
- 32- ساختار نوکلئوزوم شبیه گردن بند مروارید است که مهره‌ها معادل نوکلئوزوم و نخ بین مهره‌ها معادل DNA است.
- تعداد و ساختار کروموزوم‌ها، بر رشد و نمو تأثیر می‌گذارد.
- 33- در سلول، کروموزوم‌ها دو به دو از نظر شکل.. اندازه و محتوی به هم شبیه هستند که به آن‌ها **کروموزوم‌های همتا** (جفت) گفته می‌شود.
- 34- از دو کروموزوم همتا در هر سلول یکی از پدر و دیگری از مادر به فرزند رسیده است.
- 35- 46 کروموزوم سلول‌های پیکری انسان دو **مجموعه 23 کروموزومی** تشکیل شده است که یک مجموعه از پدر و مجموعه دیگر از مادر به فرزند رسیده است.

- 36 وقتی یک سلول مثل سلول پیکری انسان ، دو مجموعه کروموزوم دارد ، می گویند آن سلول دیپلوبلید است.
- 37 وقتی یک سلول مثل سلول جنسی (گامت) انسان ، فقط یک مجموعه کروموزوم دارد ، می گویند آن سلول هاپلوبلید است.
- 38 برای نشان دادن یک مجموعه کروموزوم از نماد n استفاده می شود و به آن عدد هاپلوبلید گفته می شود.
- 39 برای نشان دادن دو مجموعه کروموزوم از نماد $2n$ استفاده می شود و به آن عدد دیپلوبلید گفته می شود.
- 40 عدد دیپلوبلید در سلول های پیکری انسان به صورت $46 = 2n$ نشان داده می شود.
- 41 ادغام دو گامت هاپلوبلید (n) ، لقاح نام دارد که در طی آن سلول تخم (زیگوت) که دیپلوبلید ($2n$) است پدید می آید.
- 42 زیگوت اولین سلول جانداری است که به تازگی تشکیل شده است.
- 43 زیگوت با تقسیم های پی در پی ، سلول های بدن یک جاندار پر سلولی را پدید می آورد که انواع مختلفی دارند و از نظر شکل و وظیفه با هم متفاوت اند.

تعداد کروموزوم ها

- 44 تعداد کروموزوم های هر جاندار مشخص است.
- 45 کروموزوم های سلول های جاندارانی که از یک گونه هستند ، عموماً یکسان است.
- 46 مگس سرکه در هر سلول 8 کروموزوم دارد ، بعضی سرخس ها بیش از 500 کروموزوم و قارچ ها پنی سلیوم 1 جفت (دو عدد) کروموزوم دارد.
- 47 تعداد کروموزوم های بعضی گونه ها با یکدیگر یکسان است ، مثل سبب زمینی .. آلو و شامپانزه که هر سه 48 کروموزوم در سلول پیکری خود دارند.
- 48 مساوی بودن تعداد کروموزوم های چند گونه دلیل بر شباهت نیست ، چون چیزی که مهم است ، محتوای کروموزوم ها است.
- 49 شکل .. اندازه و ساختار کروموزوم ها ، حتی در گونه هایی که عدد کروموزومی آنها یکسان است ، با هم تفاوت دارد.

کروموزوم ها و تعیین جنسیت

- 50 از 23 جفت کروموزوم سلول های پیکری انسان ، 22 جفت اتوزوم (غیر جنسی یا بدنی) و یک جفت جنسی هستند.
- 51 کروموزوم های غیر جنسی در تعیین جنسیت مستقیماً نقش ندارند ولی کروموزوم های جنسی ، ژن های مسئول تعیین جنسیت را در بر دارند.
- 52 در انسان و بسیاری از جانداران ، دو کروموزوم جنسی مسئول تعیین جنسیت را X و Y می نامند.
- 53 در انسان ژن هایی که سبب می شوند تخمک لقاح یافته به نوزاد پسر نمو یابد در کروموزوم 7 واقع هستند.
- 54 هر فردی کروموزوم 7 داشته باشد ، پسر و اگر آن را نداشته باشد ، دختر است.
- 55 در مرد ها کروموزوم های جنسی X و در زن ها XX هستند.
- 56 در بعضی حشرات مثل ملخ ها ، کروموزوم 7 وجود ندارد و کروموزوم های جنسی در ماده ها XX و در نر ها XO می باشد.
- 57 در XO ، حرف O نشان دهنده نبودن کروموزوم می باشد (O به معنی تهی یا خالی) .

- 58- در پرنده‌ها و پروانه‌ها؛ نرها دو کروموزوم X و ماده‌ها فقط یک کروموزوم X دارند.
- 59- در پروانه‌ها و پرنده‌ها، کروموزوم‌های X و Y را به ترتیب به صورت Z و W نشان می‌دهند.
- 60- در پرنده‌ها و پروانه‌ها نرها دارای کروموزوم‌های جنسی ZZ (نر پرنده) و ماده‌ها دارای کروموزوم‌های جنسی ZW (Mاده پرنده) هستند.

تغییر در ساختار کروموزوم‌ها

- 61- تغییر در ساختمان کروموزوم‌ها را **جهش** می‌نامند.
- 62- شکسته شدن کروموزوم‌ها منجر به ایجاد 4 نوع جهش می‌شود:
- a. **حذف**: قطعه‌ای از کروموزوم در اثر شکسته شدن کاملاً از آن جدا و **حذف** می‌شود.
 - b. **مضاعف شدن**: قطعه‌ای از کروموزوم در اثر شکسته شدن، از آن جدا و **به کروموزوم همتای آن اضافه** می‌شود.
 - c. **واژگونی**: قطعه‌ای از کروموزوم در اثر شکسته شدن، جدا و **در جهت معکوس** به جای اول خود متصل می‌شود.
 - d. **جابجایی**: قطعه‌ای از کروموزوم در اثر شکسته شدن، جدا و **به کروموزومی غیر همتای** متصل می‌شود.
- 63- در بسیاری از موارد، جهش‌های حذفی باعث مرگ سلول تحمل می‌شوند.

چرخه‌ی سلول

- 64- تقسیم سلول‌های یوکاریوتی نسبت به سلول‌های پروکاریوتی پیچیده‌تر است چون در این تقسیم هم سیتوپلاسم و هم هسته هر دو تقسیم می‌شوند و همچنین قبل از تقسیم لازم است اندامک‌های مختلف به درستی در فضای سلول بازاری شوند تا بتوانند به گونه‌ای مناسب بین سلول‌های دختر توزیع شوند.

- 65- مراحل زندگی یک سلول یوکاریوتی که به صورت یک چرخه نشان داده می‌شود را **چرخه‌ی سلول** می‌نامند.
- 66- چرخه‌ی سلول، از پایان یک تقسیم شروع می‌شود و تا پایان تقسیم بعدی ادامه می‌یابد.
- 67- چرخه‌ی سلول خود شامل 5 مرحله است: [] - 1 - G1 - 2 - S (ستنز) - 3 - G2 - 4 - میتوز - 5 - سیتوکینز
- 68- حدود 90٪ زندگی یک سلول در سه مرحله‌ی اول آن می‌گذرد که به آن اینترفاز گفته می‌شود.
- 69- در مرحله‌ی G1 سلول به سرعت رشد می‌کند و بزرگ می‌شود.
- 70- در مرحله‌ی سنتز(S)، **همانند سازی** می‌کند و هر کروموزوم از دو کروماتید یکسان که در محل سانتروم بر به هم متصل هستند تشکیل شده است؛ ولی کروماتید هنوز فشرده و خمیم نشده‌اند.
- 71- در مرحله‌ی G2، تمہیدات لازم برای تقسیم هسته فراهم می‌شود و **همانند سازی میتوکندری** و **سایر اندامک‌ها** صورت می‌گیرد.

- میتوز ؛ فرآیندی است که طی آن هسته سلول بدون کاهش تعداد کروموزوم ها به دو هسته تقسیم می شود. -72
- بعد از میتوز ، هسته های جدید همان تعداد کروموزوم سلول مادر را دارند ولی در این زمان ، **کروموزوم ها** تک کروماتیدی هستند. -73
- سیتوکینز** فرآیندی است که طی آن **سیتوپلاسم** سلول تقسیم می شود. -74
- کاهی هسته سلول چند بار تقسیم می شود ولی **سیتوکینز انجام نمی شود** ، در این حالت سلول چند هسته ای به وجود می آید. -75
- نمونه ای سلول های چند هسته ای ، **سلول های ماهیچه ای** مخطط می باشند. -76
- میتوز و سیتوکینز به منظور رشد .. ترمیم و تولید مثل غیر جنسی انجام می شوند. -77
- تنظیم چرخه ای سلول**
- نقاط وارسی ، زمان های حساسی در چرخه ای سلولی هستند که در این زمان ها ، عبور سلول از یک مرحله به مرحله دیگر کنترل می شود. -78
- در نقاط وارسی تا هنگامی که مرحله ای قبیل تکمیل نشده باشد ، از ورود سلول به مرحله ای بعد جلوگیری می شود. -79
- نقاط وارسی در سه نقطه ای چرخه ای سلولی قرار دارند : 1- پایان G1 2- پایان G2 3- پایان میتوز -80
- سرطان** ، تقسیم و رشد غیر عادی سلول ها است . -81
- دلیل اصلی سرطان ها ، **تغییر ناگهانی ژنی** در سلول (جهش) می باشد. -82
- جهش های سرطان زا دو دسته اند : -83
- a- دسته ای که سبب تولید بیش از حد مولکول های محرک رشد و تقسیم سلول ها می شوند.
- b- جهش هایی که پروتئین های مسئول کند و یا متوقف کردن چرخه ای سلول را غیر فعال می کنند.
- بسیاری از جهش های سرطان زا نتیجه ای تأثیر عوامل محیطی هستند بنابراین **شیوه زندگی** در ابتلا به سرطان اثر دارد. -84
- صرف مواد مخدر و دخانیات .. اشعه ها و پرتو ها ، مصرف غذا ها و هوای آلوده به ترکیبات شیمیایی ، احتمال سرطان را زیاد می کنند. -85
- تقسیم میتوز و سیتوکینز**
- در هنگام میتوز **کروماتید های هر کروموزوم از هم جدا می شوند** و به سوی دو قطب سلول حرکت می کنند. -86
- دوک** تقسیم ، ساختاری است متشکل از **سانتریول ها** و **گروهی از میکروتوبول ها** که در حرکت دادن کروموزوم ها هنگام تقسیم ، نقش دارند. -87
- هر سلول جانوری و سلول های بدون دیواره ، به طور معمول یک جفت سانتریول در نزدیکی هسته دارد. -88
- هر سانتریول یک جسم کوچک استوانه ای است و دو سانتریول با زاویه ای ۹۰ درجه ای نسبت به یکدیگر قرار می گیرند (عمود بر هم). -89
- سانتریول ها در مرحله ای G2 از چرخه ای سلول همانند سازی می کنند . -90

- هر سلول جانوری در هنگام ورود به میتوز ۲ جفت سانتریول (۴ عدد سانتریول) دارد. -91
- در هنگام میتوز ، جفت سانتریول ها ، شروع به جدا شدن از هم می کنند و به سوی دو قطب سلول حرکت می کنند. -92
- هنگام دور شدن جفت سانتریول ها از هم ، بین آنها رشته هایی پروتئینی شکل می گیرد و ساختار دوک پدید می آید. -93
- سانتریول ها و رشته های دوک هر دو از لوله هایی توالی از جنس پروتئین ساخته شده اند که **میکروتوبول** نامیده می شود. -94
- هر رشته ای دوک از یک **میکروتوبول** ساخته شده است. -95
- هر سانتریول از **۹ دسته سه تایی** (۲۷ رشته) **میکروتوبول** ساخته شده است. -96
- سلول های بسیاری از گیاهان اگر چه **سانتریول ندارند** ، اما دوک می سازند (دوک بدون سانتریول) . -97

مراحل میتوز

- میتوز فرآیندی به هم پیوسته است که برای آسانی مطالعه آن را به **۴ مرحله** تقسیم کرده اند. -98
- چهار مرحله ای میتوز به ترتیب عبارتند از : **۱-پروفاز ۲-متافاز ۳-آنافاز ۴-تلوفاز** -99
- در پروفاز : -100
- a. رشته های دراز و در هم تنیده ای کروماتین به تدریج **کوتاه و ضخیم** می شوند و کروموزوم های مضاعف قابل دیدن می شوند.
- b. پوشش هسته **ناپدید** می شود.
- c. با دور شدن سانتریول ها از همیگر ، دوک تشکیل می شود.
- در متافاز : -101
- a. کروموزوم های مضاعف به سمت وسط سلول حرکت کرده و در **سطح استوایی** سلول ردیف می شوند.
- b. هر رشته های دوک از یک سو به قطب سلول و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم متصل می شود.
- c. در متافاز ، کروماتید ها **بیشترین فشرده گی** را پیدا کرده اند.
- 102 در آنافاز دو کروماتید خواهی هر کروموزوم ، از محل سانترومر از یکدیگر جدا می شوند و بر اثر **کوتاه شدن** رشته های دوک متصل به سانتریول ها ، به سوی قطب ها کشیده می شوند.
- در تلوفاز : -103
- a. در هریک از دو قطب ، **پوشش هسته در اطراف کروماتید ها** (که هم اکنون کروموزوم نام دارند) تشکیل می شوند.
- b. کروموزوم ها از **حالت فشرده گی خارج** می شوند و دوباره حالت باریک و دراز پیدا کرده و رشته ای **کروماتینی** را به وجود می آورند.
- c. در این مرحله دوک **تقسیم از بین می رود.**

-104- سیتوکینز ؛ در بسیاری از موارد بعد از میتوز رخ می دهد و در طی آنها مکانیسم زیر سیتوپلاسم سلول به دو نیم می شود :

a. در سیتوکینز سلول های جانوری ، **کمربندی از رشته های پروتئینی** در میانه ای سلول ایجاد می شود که با تنگ شدن آن سلول به دو نیم می شود.

b. در سلول های گیاهی ، **وزیکول هایی** توسط دستگاه گلزی ساخته می شود که در میانه ای سلول به هم می پیوندد و صفحه ای را پدید می آورند که طرح اولیه ای دیواره ای اسکلتی سلول است.

نکات فصل 7 .. تولید مثل جنسی و میوز

میزان شbahت فرزندان به والدین و دیگر اعضای خانواده ، به **نوع تولید مثل** بستگی دارد. -1-

تولید مثل انواع گوناگون دارد که دو نوع اصلی آن عبارتند از : 1- **تولید مثل غیر جنسی** -2- **تولید مثل جنسی** -3-

در **تولید مثل غیر جنسی** :

a. **فقط یک والد** شرکت دارد که یک نسخه از تمامی زن های خود را به فرزندان خود منتقل می کند.

b. در این نوع تولید مثل ، سلول های هاپلوبیوت(n) مثل گامت ها ، با هم ادغام نمی شوند.

c. در این نوع تولید مثل فردی که به وجود می آید **یک کلون است** (کلون جانداری است که از نظر ژنتیکی درست مانند والد خود است).

d. در این نوع تولید مثل **تقسیم میوز** انجام نمی شود.

در **تولید مثل جنسی** :

a. **دو والد** شرکت دارد .

b. **تقسیم میوز** صورت می گیرد .

c. سلول های جنسی هاپلوبیوت(n) نیر تولید می شود که با هم ادغام و **سلول تخم** را به وجود می آورند.

d. به دلیل به اشتراک گذاشتن زن ها از والدین در فرزند ، فرزند دقیقاً مشابه یکی از دو والد نیست.

e. **تولید مثل جنسی در یوکاریوت ها** مشاهده می شود.

انواع **تولید مثل غیر جنسی** عبارتند از :

a. **تقسیم شدن** که مثلاً در آمیب صورت می گیرد .

b. **قطعه قطعه شدن** که مثلاً در اسپیروزیبر صورت می گیرد.

c. **جوانه زدن** که مثلاً در هیدر صورت می گیرد.

بسیاری از جانداران بنا به شرایط محیطی ، روش های متفاوتی را برای تولید مثل بر می گزینند. مثلاً **اسپیروزیبر** علاوه بر قطعه قطعه شدن ، با تقسیم

سلول ها و نیز در شرایط نامساعد محیطی ، با تولید مثل جنسی نیز تکثیر می یابد. همچنین **هیدر** علاوه بر جوانه زدن ، تولید مثل جنسی نیز دارد.

چرخه های زندگی در یوکاریوت ها

- 7 چرخه زندگی همه جانداران دارای تولید مثل جنسی ، از یک الگوی اساسی پیروی می کند و آن تناوب بین دو مرحله دیپلوفیدی و هاپلوفیدی است .
- 8 تفاوت چرخه های زندگی در جانداران این است که کدام سلول میوز انجام می دهد و در چه زمانی میوز رخ می دهد .
- 9 در کل سه نوع چرخه سلولی وجود دارد : 1- هاپلوفید 2- دیپلوفید 3- تناوب نسل ها

چرخه زندگی هاپلوفیدی

- 10 این نوع چرخه ساده ترین نوع چرخه ها است .
- 11 در این چرخه ، سلول های هاپلوفید بیشترین بخش چرخه را تشکیل می دهند .
- 12 در این چرخه ، سلول تخم (زیگوت) تنها سلول دیپلوفید است .
- 13 در این نوع چرخه ، جاندار پرسلولی و اصلی دارای سلول های هاپلوفید است .
- 14 در این چرخه برای تولید سلول های گامت ، تقسیم میتوز رخ می دهد .
- 15 مسیر چرخه به این صورت است که :
- a. سلول تخم فوراً میوز انجام می دهد و سلول های هاپلوفیدی به نام هاگ یا اسپور به وجود می آید .
 - b. هر اسپور یا هاگ با تقسیمات میتوزی خود جاندار پر سلولی هاپلوفید را می سازند .
 - c. سرانجام بعضی سلول های هاپلوفید جاندار با تقسیمات میتوزی خود ، گامت های هاپلوفید را به وجود می آورند .
 - d. گامت ها در فرآیندی به نام هم جووشی به یکدیگر ملحق شده و دوباره سلول تخم را می سازند .
- 16 این نوع چرخه زندگی در بسیاری از آغازیان .. قارچ ها و جلبک ها مشاهده می شود . نمونه جلبک ها کلامیدوموناس است که نوعی جلبک تک سلولی است .

چرخه زندگی دیپلوفیدی

- 17 بازترین ویژگی این چرخه این است که سلول های افراد بالغ ، دیپلوفید هستند .
- 18 در این چرخه برای تولید گامت ها ، تقسیم میوز انجام می شود .
- 19 در این نوع چرخه تنها سلول های هاپلوفیدی (n) ، گامت ها هستند .
- 20 در این چرخه ، هاگ تولید نمی شود .
- 21 این چرخه در بیشتر جانوران از جمله انسان مشاهده می شود .

-22 مسیر چرخه دیپلوئیدی به این صورت است که :

- a. سلول تخم با تقسیمات میتوزی خود فرد پرسلوی دیپلوئیدی را می سازد.
- b. سرانجام بعضی از سلول های دیپلوئید در فرد بالغ ، تقسیم میوزی انجام داده و سلول های گامت را به وجود می آورند.
- c. سلول های گامت نر و ماده در فرآیندی به نام لقاح با هم ترکیب شده و سلول تخم (زیگوت) را به وجود می آورند.

چرخهء تناوب نسل ها

-23 این نوع چرخه در گیاهان .. جلبک ها و بعضی از آغازیان مشاهده می شود.

-24 این چرخه از تناوبی منظم بین دو مرحلهء هاپلوئیدی و دیپلوئیدی برخوردار است.

-25 در این نوع چرخه هم جاندار پر سلولی هاپلوئیدی و هم جاندار پر سلولی دیپلوئیدی مشاهده می شود.

-26 در این نوع چرخه برای تولید هاگ ها ، تقسیم میوز و برای تولید گامت ها ، تقسیم میتوز صورت می گیرد.

-27 مسیر چرخهء تناوب نسل ها به این صورت است که :

- a. سلول تخم با تقسیمات میتوزی پی در پی خود جاندار پر سلولی دیپلوئیدی را به نام اسپورووفیت (n) می سازد.

b. سرانجام بعضی سلول های دیپلوئید در جاندار اسپورووفیت ، وارد تقسیم میوز شده و هاگ ها یا همان اسپور ها را می سازند.

c. هر هاگ با تقسیمات میتوزی خود جاندار پر سلولی هاپلوئیدی دیگری را به نام گامتوفیت (n) به وجود می آورد.

d. سرانجام بعضی سلول های جاندار گامتوفیت ، با تقسیمات میتوزی خود ، سلول های گامت را به وجود می آورند.

e. گامت های نر و ماده در طی لقاح با هم ترکیب شده و سلول تخم یا زیگوت را به وجود می آورند.

-28 در هر سه نوع چرخه ، تناوب بین مراحل دیپلوئید و هاپلوئید وجود دارد اما تفاوت در این است که کدام مرحله به جاندار پر سلولی تبدیل میشود.

بکرزایی

-29 بکرزایی ؛ نوعی تولید مثل است که در آن فرد از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می یابد.

-30 در بکرزایی ؛ هیچ جاندار نری شرکت ندارد.

-31 در بکرزایی فرزندان حاصل کاملاً شبیه مادرند و در واقع شکل ویژه ای از کلون کردن است که به تولید مثل جنسی تعلق دارد.

-32 بکرزایی در مارها ، در مارهای مسنی رخ می دهد که سال ها دور از نرها زندگی کرده اند .

-33 در مورد مارها فرضیه اول (خود باروری) این است که :

مار ماده به جای کروموزوم های پدری ، از روی کروموزوم های خود ، یک نسخه می سازد و به این ترتیب تخمک های خود را بارور می کند

- 34 فرضیه دوم این است که در غیبت طولانی نرها، بعضی پیام‌های ناشناخته مثل انواعی از هورمون‌ها سبب میشوند تا تخمک تقسیم شود.
- 35 بکرزایی در بعضی از جانوران مثل قاچانک‌ها .. سوسمارها و قورباغه‌ها و زنبور عسل ماده رخ می‌دهد.
- 36 در زنبور عسل ماده از طریق بکرزایی زنبور‌های عسل نر تولید می‌شوند.

تقسیم میوز

-37 ایجاد گوناگونی در دنیای زنده ، مدیون تقسیم سلولی میوز است.

-38 میوز : نوعی تقسیم هسته سلول است که در طی آن تعداد کروموزوم ها نصف می شود.

-39 میوز خود از دو تقسیم پی در پی هسته تشکیل شده است که به نام های میوز ۱ و میوز ۲ نامیده می شود.

-40 هر یک از مراحل تقسیم میوز خود از مراحل پروفاز .. متافاز .. آنافاز و تلوفاز تشکیل شده است.

-41 شرح مراحل میتوze:

a. میوز ۱:

a - پروفاز ۱: در این مرحله :

الف. کروموزوم های مضاعف شده ، فشرده و قابل مشاهده می شوند .

ب. غشای هسته تجزیه می شود.

ج. کروموزوم های همتا که هر کدام دو کروماتید دارند ، از طول در کنار هم قرار می گیرند و ساختار

چهارکروماتیدی تتراد را پدید می آورند.

-ii - متافاز ۱: در این مرحله تترادها به وسیله رشته های دوک در سطح استوایی سلول ردیف می شوند.

-iii - آنافاز ۱: در این مرحله کروموزوم های همتا از یکدیگر جدا می شوند ، اما دو کروماتید خواهی همچنان در

محل

سانترومر به هم متصل اند.(کروموزوم هنوز دو کروماتیدی است).

-iv - تلوفاز ۱: در این مرحله :

الف. کروموزوم ها در دو قطب سلول تجمع می یابند.

ب. در بیشتر جانداران در این مرحله سیتوپلاسم هم تقسیم می شود و دو سلول جدیدی بوجود می آید.

ج. غشاء هسته پدیدار می شود.

د. هر یک سلول های حاصل وارد میوز ۱ می شوند.

b. میوز ۲:

a - پروفاز ۲: در این مرحله در اطراف هر هسته هاپلوبیت ، رشته های دوک تشکیل می شوند.

ii - متافاز ۲: در این مرحله کروموزوم های دو کروماتیدی در سطح استوایی سلول ردیف می شوند و از طریق

سانترومرهای خود به رشته های دوک متصل می شوند.

iii- آنافاز ||: در این مرحله دو کروماتید هر کروموزوم (کروماتید های خواهری) از هم جدا می‌شوند و به سوی دو

قطب سلول می‌روند (مشابه آنافاز میتوز).

iv- تلوفارز ||: در این مرحله:

الف. پوشش هسته در اطراف کروماتید ها تشکیل می‌شود.

ب. دوک از بین می‌رود.

ج. سیتوکینز رخ می‌دهد.

نتیجه تقسیم میوز سلول های تخصص یافته ای که مسئول تولید مثل هستند می‌باشد (گامت یا هاگ). -42

گامت ها سلول هایی هاپلوبید(n) هستند یعنی در آنها یک مجموعه کروموزوم وجود دارد و کروموزوم ها تنها هستند و به صورت جفت نیستند. -43

اگر گامت ها دیپلوبید می‌بودند، تعداد کروموزوم ها از نسلی به نسل دیگر پیوسته رو به افزایش می‌گذاشت. -44

در نتیجه میوز از یک سلول دیپلوبید، چهار سلول هاپلوبید پدید می‌آید.. -45

ایترفارز در مورد میوز دقیقاً همانند ایترفارز در میتوز است. -46

تشکیل گامت در جانوران نر و ماده

تولید گامت یکی از وظایف اندام جنسی است. -47

فرآیند تولید گامت را، گامت زایی می‌نامند. -48

تشکیل گامت در جانوران نر

فرآیندی که طی آن در جانوران نر، اسپرم تولید می‌شود، اسپرم زایی می‌نامند. -49

اسپرم زایی در اندام جنسی نر یعنی بیضه ها رخ میدهد. -50

در فرآیند اسپرم زایی: -51

a. یک سلول دیپلوبید بزرگ می‌شود و به سلولی نابالغ به نام سلول زاینده تبدیل می‌شود.

b. سلول زاینده، تقسیم میوز ارا انجام می‌دهد و دو سلول به وجود می‌آورد که اسپرم نابالغ نامیده می‌شوند و هاپلوبید هستند.

c. هر یک از این دو سلول میوز || انجام می‌دهند و هر کدام دو سلول (در مجموع چهار سلول) به وجود می‌آورند که اسپرم تمایز

نیافته نامیده می‌شود.

d. اسپرم تمایز نیافته دچار تغییر هایی شده و دارای سر و تنہ و دم شده و سرانجام اسپرم تمایز یافته و کامل را به وجود می‌آورد.

سلول زاینده ← اسپرم نابالغ ← اسپرم تمایز نیافته ← اسپرم

-52 در این فرایند فقط سلول زاینده است که دیپلوبیود ($2n$) است و سایر سلول‌ها، هاپلوبیود (n) هستند.

-53 اعتیاد به مواد مخدر و الکل، تماس با پرتو‌ها و اشعه‌هایی مثل فرابینفش و \times ممکن است در فرایند اسپرم زایی اختلال ایجاد کرده و یا باعث تشکیل اسپرم‌ها غیر طبیعی و در نتیجه عقیمی شوند.

تشکیل گامت در جانور ماده

-54 فرآیندی که در جانوران منجر به تولید تخمک می‌شود، **تخمک زایی** نام دارد.

-55 تخمک زایی در اندام جنسی ماده یعنی **تخمدان‌ها** رخ می‌دهد.

-56 در تخمک زایی، بعد از میوز ۱، سیتوکینز، سیتوپلاسم را به طور نامساوی تقسیم می‌کند، سلولی که بسیار کوچک است **جسم(سلول) قطبی** نامیده می‌شود. سلول بزرگتر میوز ۱۱ انجام می‌دهد و دوباره سیتوکینز به طور نامساوی سیتوپلاسم را تقسیم می‌کند و در نتیجه سلول کوچکتر در اینجا دومین **جسم قطبی** نامیده می‌شود و سلول بزرگتر که تقریباً همه سیتوپلاسم را دریافت کرده است **تخمک** را به وجود می‌آورد.

-57 نخستین جسم قطبی نیز ممکن است دوباره تقسیم شود و دو سلول کوچک که آنها نیز **دومین اجسام قطبی** نامیده می‌شوند به وجود می‌آیند.

-58 مراحل تقسیم میوز در جنس ماده نیز مانند جنس ماده است و به صورت زیر است:

سلول زاینده → تخمک نابالغ → تخمک تمایز نیافته → تخمک

-59 البته در این مسیر اجسام قطبی نیز وجود دارند که نشان داده نشده‌اند. همچنین در این مسیر فقط سلول زاینده دیپلوبیود ($2n$) است.

-60 اعتیاد به مواد مخدر و الکل، تماس با پرتو‌ها و اشعه‌هایی مثل فرابینفش و \times ممکن است در فرایند تخمک زایی اختلال ایجاد کرده و یا باعث تشکیل تخمک‌های غیر عادی شود.

تغییر در تعداد کروموزوم‌ها

-61 هر یک از کروموزوم‌های بدن ما هزاران ژن دارند.

-62 از آنجا که ژن‌ها در رشد و نمو و کارکرد درست بدن، نقش حیاتی دارند، حضور همه آنها بی کم و کاست برای تندrstی و سلامتی لازم است.

-63 بیشتر افرادی که حتی یکی از ۴۶ کروموزوم را ندارند، **زنده نمی‌مانند**.

-64 ناهنجاری‌های موجود در تعداد کروموزوم‌ها از روی تجزیه و تحلیل **کاربیوتیپ** مشخص می‌شود.

-65 **کاربیوتیپ**: تصویری از کروموزوم‌های سلول در حال تقسیم است که در آن کروموزوم‌ها بر اساس اندازه و شکل ردیف شده‌اند.

-66 در **تریزوومی ۲۱** (نشانگان داون) در کاربیوتیپ مشخص است که **یک کروموزوم ۲۱ اضافی** وجود دارد.

-67 افراد مبتلا به نشانگان داون، درجات مختلفی از عقب ماندگی ذهنی را نشان می‌دهند.

-68 نشانگان به مجموعه نشانه‌های یک بیماری یا یک حالت گفته می‌شود.(نکته غیر امتحانی).

-69

نشانگان داون با سن بارداری مادران ارتباط مستقیم دارد به صورتی که :

- a. در مادران جوان تر از 30 سال ، این حالت یک در 1500 تولد است .
- b. در مادران 30 تا 35 سال ، این حالت یک در 750 مورد تولد رخ می دهد و
- c. در مادران بالای 45 سال به یک در 16 تولد می رسد.

-70

به دلیل بالا ، مادران بارداری که سن آنها بالای 35 سال است باید به انجام آزمایش های قبل از تولد که یکی از آنها تعیین گاریوتیپ جنین است ،

آگاه شوند.

-71

دلیل چنین رویدادی این است که هنگام میوز ، هر کروموزوم باید از کروموزوم همتای خود در مرحله آنفاز ۱ جدا شود که به این حالت جدا شدن کروموزوم ها گفته می شود. اگر به هر دلیلی یک کروموزوم یا بیشتر نتواند به درستی از همتای خود جدا شود ، آنگاه یکی از دو گامت ، هر دو کروموزوم را با هم دریافت می کند و گامت دیگر ، هیچ کروموزومی را از آن نوع دریافت نمی کند ، این رویداد را جدا نشدن یا با هم ماندن کروموزوم ها مینامند. اگر گامتی که دو کروموزوم همتا را دریافت کرده است با یک گامت عادی لقاح یابد ، سلول زیگوت به جای دو کروموزوم ، سه نسخه از آن کروموزوم را خواهد داشت .

-72

جدا نشدن کروموزوم های شماره 21 منجر به نشانگان داون می شود.

-36 در زن ها بر خلاف مردها که همیشه اسپرم تازه تولید می کنند ، همه تخمک ها از هنگام تولد در تخمدان موجود است . بنابراین هر چه سن مادر افزایش یابد ، مجموع آسیب هایی که ممکن است به DNA ی تخمک های آنها وارد شود بیشتر می شود. از جمله احتمال با هم ماندن کروموزوم ها.

نکات فصل ۸ .. ژنتیک و خاستگاه آن

پژوهش‌های مندل

- 1 انتقال صفات از والدین به فرزندان، وراثت نام دارد.
- 2 در حدود بیش از یک قرن پیش کشیش اتریشی به نام **مندل**، پژوهش‌های خود را درباره وراثت با پرورش انواع مختلف گیاهان نخود فرنگی آغاز کرد.
- 3 از حدود دویست سال پیش از مندل، کشاورزان انگلیسی به پرورش و پژوهش درباره گیاه نخود می‌پرداختند.
- 4 مندل توانست با کارهای خود قواعد و قوانینی برای پیش‌بینی الگوهای وراثت کشف کند.
- 5 قوانین مندلی، پایه علم ژنتیک را تشکیل داد.
- 6 ژنتیک؛ شاخه‌ای از علم زیست‌شناسی است که محققان آن پژوهش درباره وراثت را بر عهده دارند.
- 7 دو عامل به مندل کمک فراوان کردند:
- a. اینکه پدر مندل کشاورز بود و او در کار کشاورزی به پدرش کمک می‌کرد
 - b. همچنین او در دانشگاه وین به تحصیل علوم و ریاضی پرداخت و مهارت تبیین پدیده‌های طبیعی را با کمک ریاضیات فراگرفت.
- 8 نخستین پژوهش مندل، تکرار آزمایش‌های نایت بود.
- 9 نایت کشاورز انگلیسی بود که گیاهان نخود فرنگی را که گلبرگ سفید داشتند با گیاهان نخود فرنگی که گلبرگ ارغوانی داشتند، آمیزش داد و دانه‌های حاصل را به دست می‌آورد و دوباره می‌کاشت.
- 10 نایت مشاهده کرد که همه گیاهان حاصل گلبرگ ارغوانی دارند. اما هنگامی که دو تا از این گیاهان گل ارغوانی را با هم آمیزش می‌داد، گلبرگ تعدادی از آن‌ها ارغوانی و تعدادی دیگر سفید می‌شود.
- 11 آزمایش‌های مندل یک تفاوت اساسی با کارهای نایت داشت و آن اینکه: مندل تعداد گیاهان گلبرگ سفید و گلبرگ ارغوانی هر یک از نسل‌ها را می‌شمرد و اعداد به دست آمده را از نظر آماری **تجزیه** و **تحلیل** می‌کرد.
- 12 مندل به دلایل زیر گیاه نخود فرنگی را برای پژوهش‌های خود انتخاب کرد:
- a. گیاه نخود فرنگی چند صفت دارد که هر کدام فقط دو حالت را نشان می‌دهند. این صفات به آسانی **قابل تشخیص** هستند و حد وسط ندارند.
 - b. آمیزش دادن گیاه نخود فرنگی با یکدیگر آسان است. در این مسیر می‌توان گیاه نخود را به حال خود رها کرد تا **خودلگاهی** کند و یا اینکه به صورت مصنوعی آن را وادر به **دگر لقاحی** کرد.
 - c. گیاه نخود فرنگی نسبتاً **کوچک** است.. به آسانی پرورش داده می‌شود.. زود گل می‌دهد و دانه‌های بسیار تولید می‌کند

-13- خود لقاحی؛ یعنی اینکه گامت‌های نر و ماده هر گل با هم لقاح یابند برای این کار کافی است که دانه گرده هر گل بر روی کلاله مادگی همان گل قرار بگیرد و دگر لقاحی یعنی دانه گرده گلی دیگر، بر روی کلاله مادگی گل مورد نظر قرار بگیرد.

-14- مندل برای انجام دگر لقاحی، دانه‌های گرده گل دیگری را که در نظر داشت بر روی کلاله مادگی گلی قرار می‌داد که قبل از رسیدن و تولید دانه گرده، پرچم‌های آن را قطع کرده بود.

مندل مشاهده کرد که صفات به نسبت‌های قابل پیش‌بینی به ارث می‌رسند.

-15- نخستین آزمایش مندل، آمیزش مونو‌هیبریدی نامیده می‌شد.

-16- آمیزش مونو‌هیبریدی آزمایشی است که طی آن فقط یک صفت را که دو حالت دارد، مورد پژوهش قرار می‌گیرد.

-17- مندل این آزمایش را در سه مرحله انجام داد:

a. خالص سازی: در این مرحله مندل به چند گیاه نخود فرنگی گلبرگ ارغوانی و گلبرگ سفید اجازه داد تا چند نسل به طور طبیعی و از

طریق خود لقاحی آمیزش کنند و در این میان گیاهان غیر دلخواه را حذف می‌کرد تا زمانی که مطمئن شود که در

صورت ادامه خود لقاحی، فقط گیاهانی با همان رنگ گلبرگ به وجود می‌آیند. او این گیاهان به دست آمده خالص از

نظر صفت مورد نظر را والدین (P) نامید.

b. دگر لقاحی: مندل دو گیاه والد را که از نظر رنگ گلبرگ متفاوت بودند، وادر به دگر لقاحی کرد، او زاده‌های حاصل را نسل اول (F_1) نامید و به مشاهده صفات آنها پرداخت.

c. خود لقاحی: مندل سرانجام گیاهان نسل اول را به حال خود می‌گذاشت تا خود لقاحی کنند و گیاهان حاصل از نسل اول را نسل دوم (F_2) نامید و صفات آنها را به دقت بررسی کرد.

-18- مندل مشاهده کرد که در نسل اول همه گیاهان فقط یکی از صفات والدین را بروز می‌دهند و صفت دیگر را ظاهر نمی‌کنند. مثلاً در مورد رنگ گلبرگ در نسل اول همه گیاهان دارای گلبرگ ارغوانی بودند و صفت گلبرگ سفید در آنها مشاهده نمی‌شد.

-19- همچنین مندل مشاهده کرد که در نسل دوم صفتی که در نسل اول ظاهر نشده بود، دوباره ظاهر می‌شود البته به نسبت خاص 1 در مقابل 3 یعنی در نسل دوم به ازای سه گیاه دارای گلبرگ ارغوانی، فقط یک گیاه دارای گلبرگ سفید به وجود می‌آمد.

-20- مندل این نسبت‌ها را از راه شمارش افراد دارای هر حالت صفت مورد نظر در نسل دوم به دست آورد.

نظریه مندل

-21- نخستین تجربه انسان در ژنتیک از هزاران سال پیش با کشتن حیوانات اهلی ضعیف و کم توان برای برآورده کردن نیاز‌های فوری و حمایت از تولید مثل افراد پرتوان و مرغوب و نگهداری از آنها می‌باشد.

- 22 در طول زمان به این نتیجه دست یافت که صفات هر فرد، برآیند یا میانگینی از صفات والدین است که به **نظریه آمیختگی** صفات معروف است.
- 23 **نظریه آمیختگی** صفات با کارهای مندل اعتبار خود را از دست داد.
- 24 مندل پی برد که هر صفت را در گیاه نخود فرنگی دو عامل تعیین می‌کند که یکی از پدر و دیگری از **مادر** به ارث می‌رسند.
- 25 ما امروزه این عامل‌های تعیین کننده صفات را **ژن** می‌نامیم.
- 26 هر یک از گامت‌های نر و ماده، یک عامل مربوط به صفت را حمل و به فرزند می‌دهند.

فرضیه‌های مندل

- 27 مندل نتایج پژوهش‌های خود را در چهار فرضیه خلاصه کرد:
- هر جاندار برای هر صفت خود، **دو آلل** دارد که یکی را از پدر و دیگری را از مادر دریافت کرده است.
 - ژن‌های مربوط** به هر صفت ممکن است مشابه هم باشند یا اینکه **متفاوت** باشند (امروزه به حالت‌های مربوط به یک صفت **آل** می‌گویند).
 - پس از لقاح **دو آلل متفاوت**، ممکن است یکی از آنها به طور کامل خود را ظاهر کند و دیگری هیچ اثر قابل مشاهده‌ای از خود بروز ندهد.
 - دو آلل مربوط** به یک صفت، هنگام تشکیل گامت از یکدیگر **جدا** می‌شوند و هر گامت فقط یکی از آنها را دریافت می‌کند.
- 28 فرضیه‌های مندل، مبنای نظریه مندل را که پایه و اساس علم **ژنتیک کلاسیک** است، تشکیل می‌دهند.
- 29 مندل عاملی (آلی) را که در نسل اول خود را نشان می‌دهد، **غالب** و عاملی را که در نسل اول ظاهر نمی‌شود، **مغلوب** نامید.

یافته‌های مندل به زبان امروزی

- 30 امروزه در **ژنتیک**، برای نشان دادن **آل**‌ها از **حروف استفاده** می‌شود.
- 31 برای نشان دادن **آل** **غالب** از حروف بزرگ لاتینی و برای نشان دادن **آل** **مغلوب** از حروف کوچک استفاده می‌شود.
- 32 اگر فردی **هر دو نوع آلل غالب و مغلوب را همراه با هم** باشد، می‌گویند که این فرد از نظر آن صفت **ناخالص** یا **هتروزیگوس** است.
- 33 اگر فردی **دو آلل مربوط** به صفت مورد نظرش مثل **هم باشند** گفته می‌شود که فرد از نظر آن صفت **حالص** یا **هوموزیگوس** است.
- 34 افراد **ناخالص** فقط **حالت صفت غالب را** نشان می‌دهند.
- 35 نوع **آل**‌هایی که هر فرد دارد **ژنوتیپ** نامیده می‌شود.

-36 شکل ظاهری مربوط به هر صفت را فنوتیپ می‌نامند.

قوانين مندل

-37 قانون اول مندل یعنی قانون تفکیک ژن‌ها: دو آلل مربوط به هر صفت، هنگام تشکیل گامت از یکدیگر جدا می‌شوند که توصیف کننده رفتار

کروموزوم‌ها در طی تقسیم می‌وز است.

-38 قانون دوم مندل یعنی قانون جور شدن مستقل ژن‌ها: هنگام تشکیل گامت‌ها، آلل‌های مربوط به هر صفت، بدون تأثیر بر صفات دیگر، از هم تفکیک و جدا می‌شوند که از طریق آزمایش دی‌هیبریدی به دست آمده است.

-39 میدانیم که در میوز، کروموزوم‌های همتا از یکدیگر جدا می‌شوند؛ پس می‌توان گفت که عامل‌های مندلی یا همان ژن‌ها بر روی کروموزوم‌های همتا قرار دارند و به همین خاطر برای هر صفت دو آلل داریم.

-40 آمیزش دی‌هیبریدی، آمیزشی است که در آن به چگونگی وراثت دو جفت صفت که هر کدام دو حالت متقابل دارند توجه می‌شود.

-41 در آمیزش دی‌هیبریدی مندل به این نتیجه رسید که؛ در آمیزش‌ها و وراثت آنها صفت‌های مختلف هیچ اثری بر روی همدیگر ندارند.

-42 قانون دوم، فقط درباره ژن‌هایی درست است که روی کروموزوم‌های مختلف قرارداشته باشند (یعنی روی کروموزوم‌های همتا نباشند).

-43 امروزه معلوم شده است که ژن‌ها، بخش‌هایی از مولکول DNA هستند و DNA بخش اصلی کروموزوم‌ها را تشکیل می‌دهد و کروموزوم‌های هر فرد از والدین او به ارث می‌رسند.

احتمال و وراثت

-44 مربع پانت یکی از مناسب ترین روش‌ها برای پیش‌بینی نسبت زاده‌های حاصل از آمیزش‌ها است.

-45 مربع پانت، جدولی است که در آن نتایج حاصل از آمیزشی دلخواه را با در نظر گرفتن همهٔ حالت‌های ممکن نشان می‌دهد.

-46 ساده‌ترین حالت جدول پانت **دارای چهار خانه** است که انواع گامت‌های یکی ازوالدین را در بالای جدول به صورت افقی و انواع گامت‌های والد دیگر را درسمت راست یا چپ جدول به صورت عمودی می‌نویسند و در هر خانهٔ جدول دو حرف را می‌نویسند که مجموع آلل‌های گامت‌های نر و ماده را نشان سمیدهد (شبیه به جدول ضرب).

-47 مربع پانت برای پیش‌بینی نتایج حاصل از آمیزش‌های دلخواه در کشاورزی و دامپروری کاربرد وسیع دارد. اما فقط احتمال را نشان می‌دهد.

کشف و تعیین ژنتیک افراد

-48 - گاهی پیش می آید که ما می خواهیم بدانیم جانداری که صفت غالب را نشان می دهد ، خالص است یا ناخالص؟ ، برای این مورد از آمیزش آزمون استفاده می شود.

-49 - در آمیزش آزمون ؛ جاندار دارای فنوتیپ غالب را با جانداری که فنوتیپ مغلوب دارد آمیزش می دهیم ، اگر نیمی از زاده ها فنوتیپ غالب و نیمی دیگر فنوتیپ مغلوب را نشان دادند ، جاندار مورد نظر ناخالص است و اگر همه زاده ها فنوتیپ غالب را نشان دادند ، جاندار مورد نظر خالص است.

پیش بینی نتایج آمیزش ها با کمک حساب احتمال

-50 - حساب احتمال به ما کمک می کند تا احتمال وقوع پیش آمدی خاص را با اطمینان بیشتری محاسبه کنیم.

-51 - پیش آمدهایی در احتمال مورد بررسی قرار می گیرند که تصادفی باشند یعنی گاهی رخداد نه همیشه و نیز عامل رخدادن یا رخدادن آن بر ما معلوم نباشد و یا اینکه ما در رخدادن و یا رخدادن آن دخالت نکنیم.

-52 - مثلاً در پرتاب سکه ، احتمال رو یا پشت آمدن یک رخداد تصادفی است.

-53 - احتمال وقوع یک پیش آمد A برابر است با :

$$P(A) = \frac{\text{تعداد اعضای } A}{\text{تعداد اعضای } S} = \frac{n(A)}{n(S)}$$

-54 - این فرمول به زبان عادی به صورت زیر است.

$$= \frac{\text{تعداد حالت های مساعد}}{\text{تعداد حالت های ممکن}}$$

-55 - از فرمول بالا می توان برای محاسبه احتمال وجود یک آلل خاص در گامت مورد نظر استفاده کرد.

-56 - چون برای هر صفت در نخود فرنگی دو آلل داریم و هر گامت فقط یکی از آنها را دریافت می کند ، بنابراین احتمال وجود هر کدام از آلل ها در یک گامت برابر با 1/2 است.

احتمال وقوع دو پیش آمد تصادفی به طور همزمان

-57 پیش آمدهایی که وقوع یکی در وقوع دیگری تأثیر نداشته باشد ، پیش آمدهای مستقل نامیده می شوند.

-58 احتمال وقوع دو پیش آمد مستقل به طور همزمان برابر است با حاصل ضرب احتمال وقوع هر یک از آنها به تنها یی.

-59 مثلاً دو سکه را همزمان با هم بالا می اندازیم ، احتمال آمدن همزمان دو پشت می شود : $1/2 \times 1/2 = 1/4$

-60 اکنون با استفاده از این اصول احتمالات می توانیم ، حاصل آمیزش ها را و احتمال هر حالت را محاسبه کنیم.

-61 مثال : از آمیزش یک فرد ناخالص با یک فرد خالص مغلوب ، احتمال به وجود آمدن یک فرد ناخالص چقدر است؟

جواب : فرد ناخالص را می توانیم به صورت Aa نشان دهیم ، همچنین فرد خالص مغلوب را به صورت aa ، فرد ناخالص دو نوع گامت تولید می کند که احتمال هر نوع گامت 50% یا است ، فرد خالص مغلوب 100% گامت هایش دارای آلل a خواهد شد . حال ما به دنبال حالت خالص غالباً یعنی Aa هستیم . بنابراین احتمال هر کدام از این گامت ها را در هم ضرب می کنیم. یعنی احتمال گامت دارای آلل A × احتمال گامت دارای آلل a که میشود 50% ، یعنی 50% احتمال دارد که فرد حاصله ناخالص باشد. یعنی از هر دو فرد جدید احتمالاً یکی از آنها ناخالص است.

استفاده از دودمانه (شجره نامه) برای بررسی وراثت صفات

-62 دودمانه یک طرح است که نحوه توارث یک صفت را در طی چند نسل از یک خانواده بررسی می کند.

-63 از دودمانه برای بررسی توارث صفات غیر عادی و ناهنجاری های ژنی استفاده می شود.

-64 در دودمانه قراردادهایی استفاده می شود که بعضی از آنها عبارتند از :

a. برای نشان دادن مرد از مربع و برای نشان دادن زن از دایره استفاده می شود.

b. برای نشان دادن بیماری فرد از مربع یا دایره رنگی استفاده می شود.

c. برای نشان دادن ازدواج از خط افقی استفاده می شود.

d. برای نشان دادن نسب بعد (فرزندان) از خطوط عمودی استفاده می شود.

e. فرزندان به ترتیب سن از چپ به راست مرتب می شوند (سمت چپی مسن تر است).

f. در دودمانه به فردی ناقل گفته می شود که دارای آلل های مولد ناهنجاری ژنی هستند ، اما فتوتیپ آن ناهنجاری یا غیر عادی بودن را نشان نمی دهند.

-65 پژوهشگران ژنتیک از دودمانه اطلاعاتی مربوط به صفات :

1- وابسته به جنس و اتوزومی

2- غالب و مغلوبی آلل ها

3- خالص یا ناخالص بودن افراد به دست می آروند.

آتوزومی یا وابسته به جنس

- 66 صفاتی آتوزومی هستند که؛ ژن های آنها روی کروموزوم های آتوزوم (غیر جنسی) (قرار داشته باشند.
- 67 صفاتی وابسته به جنس هستند که؛ ژن های آنها روی کروموزوم های جنسی (در انسان Y, X) (قرار داشته باشند.
- 68 صفات وابسته به جنس در زن و مرد به شیوه های مختلف ظاهر می شوند.
- 69 بسیاری از صفات وابسته به جنس مغلوب هستند.

غالب یا مغلوب

- 70 اگر صفتی آتوزومی و غالبه باشد، همه افرادی که آن صفت را نشان می دهند باید پدر یا مادری دارای آن صفت داشته باشند.
- 71 اگر صفتی آتوزومی و مغلوب باشد، ممکن است پدر و مادرش هر دو در ظاهر آن صفت را نداشته باشند.

خالص یا ناخالص

- 72 اگر فردی در یک صفت آتوزومی خالص غالبه یا ناخالص باشد، فتوتیپ او غالبه است و اگر فردی خالص مغلوب باشد، او فتوتیپ مغلوب را نشان خواهد داد.

رابطه غالبه و مغلوبی مربوط به همه آلل ها نیست

- 73 بعضی الگوهای تولید مثلی از الگوی مندلی تبعیت نمی کنند که مهمترین آنها عبارتند از :
- صفاتی که تحت اثر چند ژن هستند.
 - صفاتی که حالت غالبه ناقص دارند.
 - آللهایی که همزمان با هم اثر خود را نشان می دهند (حالت هم توانی).
 - آللهای چند گانه.
 - صفات تحت اثر محیط.

- 74 صفاتی که تحت اثر چند ژن قرار دارند، صفات چند ژنی نامیده می شوند.
- 75 در حالت صفات چند ژنی، این چند ژن ممکن است روی یک کروموزوم باشند یا اینکه روی کروموزوم های مختلف پراکنده باشند.
- 76 صفاتی مثل رنگ چشم .. طول قد .. وزن بدن .. رنگ مو و رنگ پوست از نوع چند ژنی هستند.
- 77 حالتی که در آن رابطه غالبه و مغلوبی نیست و فرد ناخالص (هتروزیگوس) حالت حد واسط را نشان می دهد، غالبه ناقص نامیده می شود.

- 78 مثال حالت غالب ناقص در رنگ گلبرگ گل میمونی و نیز حالت موی انسان مشاهده می‌شود.
- 79 در مورد گل میمونی از آمیزش گل میمونی گل قرمز با گل میمونی گل سفید، همه نتایج دارای گل صورتی (غالب ناقص) خواهند شد و در مورد گل میمونی آلل رنگ قرمز با R و آلل رنگ سفید با W نشان داد می‌شود.
- 80 در مورد موی انسان از آمیزش فردی با موی مجعد با فرد دارای موی صاف، فرزندان دارای موی موج دار خواهند شد.
- 81 در هم توانی که نوعی رابطه میان دو آلل است؛ طی آن اثر هر دو آلل همراه با هم ظاهر می‌شوند.
- 82 تفاوت هم توانی با غالب ناقص؛ این است که در غالب ناقص حالت حد واسط ظاهر می‌شود ولی در هم توانی هر دو فنوتیپ با هم ظاهر می‌شود.
- 83 مثال برای حالت هم توانی، آمیزش اسب با موی قرمز با اسب دارای موی سفید است که کره اسب حاصل هم موهای قرمز و هم موهای سفید دارد.
- 84 بعضی زن‌ها دارای بیش از دو آلل هستند که به این گونه صفات حالت چند آللی گفته می‌شود.
- 85 مثال حالت چند آللی، زن گروه خونی انسان است که سیستم ABO نامیده می‌شود و دارای سه آلل $A^A .. A^B .. A^O$ است.
- 86 A^A و A^O هر دو نسبت به A ، غالب هستند، اما نسبت به یکدیگر ربطه هم توانی دارند.
- 87 با توجه به این آلل‌ها و رابطه‌های آنها با هم، در کل 6 ژنوتیپ و 4 فنوتیپ از نظر گروه خونی به وجود می‌آید (جدول پانت صفحه 181).
- 88 فنوتیپ بعضی صفات تحت اثر محیط قرار می‌گیرد.
- 89 مثلاً رنگ گل‌های گیاه ادریسی، تحت اثر PH خاک قرار می‌گیرد. گیاه ادریسی در خاک‌های اسیدی گل‌های آبی و در خاک‌های خنثی گل‌های صورتی تولید می‌کند.
- 90 همچنین رنگ موهای روباه قطبی نیز تحت اثر دمای محیط قرار دارد. گرمای تابستان سبب ساخته شدن آنزیم تولید کننده رنگیزه و تغییر رنگ موها از سفید در زمستان به قهوه‌ای در تابستان می‌شود.
- 91 در انسان نیز صفاتی مثل قد و رنگ پوست تحت اثر محیط هستند.

بیماری های وراثتی انسان

- 92- بیماری های وراثتی بیماری هایی هستند که فرد زن آنها را از یکی از والدین یا هر دوی آنها دریافت می کند.
- 93- عامل اکثر بیماری های وراثتی **آلل های مغلوب** هستند.
- 94- افراد ناخالص که دارای فقط یک ال مغلوب هستند در ظاهر سالم اند اما در واقع ناقل هستند و ممکن است آل مولد بیماری را به فرزند خود منتقل کنند.

تالاسمی

- 95- تالاسمی نوعی کم خونی ارثی است که در اثر اختلال در تولید **هموگلوبین** افراد ایجاد می شود.
- 96- دو نوع تالاسمی وجود دارد : **۱-تالاسمی مینور (خفیف) ۲- تالاسمی ماژور (شدید)**
- 97- افراد دارای **تالاسمی مینور (cc)** معمولاً سالم هستند. اگر چه بعضی از آنها ممکن است کم خونی خفیف داشته باشند. بیشتر این افراد از بیماری خود اطلاع ندارند .
- 98- برای تشخیص تالاسمی مینور از **آزمایش خون** استفاده می شود.
- 99- گلبول های قرمز این افراد معمولاً کوچکتر از گلبول قرمز در افراد عادی است.
- 100- فرزندان مبتلا به **تالاسمی ماژور (cc)** ، از پدران و مادرانی متولد می شوند که هر دو مبتلا به تالاسمی مینور هستند (احتمال ۲۵٪) .
- 101- در مغز قرمز استخوان افراد مبتلا به تالاسمی ماژور ، **هموگلوبین** به اندازه کافی ساخته نمی شود.
- 102- افراد دارای تالاسمی ماژور در هنگام تولد عادی هستند اما در سه تا هجده ماهگی دچار کم خونی می شوند و به این خاطر رنگ پریده اند و خوب نمی خوابند و خوب غذا نمی خورند و اگر درمان نشوند و تحت مراقبت نباشند در خطرند.
- 103- برای جلوگیری از تولد افراد مبتلا به تالاسمی ماژور در هنگام ازدواج **مشاوره ژنتیک و آزمایش خون زن و مرد** انجام می گیرد و به افراد دارای تالاسمی مینور توصیه می شود از ازدواج با هم پرهیز کنند.

کم خونی وابسته به گلبول های قرمز داسی شکل

- 104- عامل این بیماری وراثتی **آلل مغلوبی** است که موجب **کمبود هموگلوبین** می شود.
- 105- بعضی گلبول های قرمز این افراد به خاطر داشتن نوع ناقصی از **هموگلوبین** ، داسی شکل می شوند.
- 106- این گلبول ها نمی توانند به خوبی **اکسیژن** را جابجا کنند و همچنین به علت چسبیدن به دیواره رگ ها ، جریان خون را دچار مشکل می کنند.

هموفیلی

- 107- آلل مغلوب هموفیلی روی کروموزوم جنسی X قرار دارد.
- 108- هموفیلی نوعی بیماری وابسته به جنس است.
- 109- کروموزوم ۲ آللی برای این صفت ندارد.
- 110- خون افراد مبتلا به هموفیلی ، در موقع لزوم منعقد نمی شود بنابراین این افراد در خطر خون ریزی بیش از حد و مرگ هستند.

بیماری هانتینگتون

- 111- عامل این بیماری آللی غالب و اتوزومی است (روی کروموزوم ها غیر جنسی) .
- 112- نخستین نشانه های این بیماری در سنین 30 تا 50 سالگی بروز می کند که عبارتند از کاهش توان کنترل ماهیچه ها .. گرفتگی ماهیچه ای .. فراموشی و سرانجام مرگ .
- 113- چون این بیماری در سنین بالای 30 سال خود را نشان می دهد احتمال انتقال آلل به فرزندان زیاد است.

شناسایی و درمان بیماری های وراثتی

- 114- فردی که در خانواده خود بیماری وراثتی دارد باید قبیل از ازدواج و پدر و مادر شدن مشاوره ژنتیک انجام دهد.
- 115- مشاوره ژنتیک نوعی راهنمایی پزشکی است که در مورد وجود بیماری وراثتی در افراد و فرزندان آنها داده می شود.
- 116- بعضی از بیماری های وراثتی در صورت اقدام به موقع ، قابل درمان هستند.
- 117- مثلاً اگر کمی بعد از تولد بیماری به نام فنیل کتونوریا در کودک تشخیص داده شود ، به کودک غذایی داده می شود که مقدار بسیار کمی فنیل آلانین دارد و در این صورت عوارض بیماری به وجود نمی آید.
- 118- آزمون بیماری فنیل کتونوریا بسیار آسان و کم هزینه است در بیمارستان ها و زایشگاه های بسیاری کشورهای پیشرفته ، همه نوزادان را از نظر دارا بودن عامل این بیماری مورد آزمون قرار می دهند.
- 119- در بیماری فنیل کتونوریا ، آنزیمی که اسید آمینه فنیل آلانین را به اسید آمینه تیروزین تبدیل می کند وجود ندارد ، بنابراین در اثر تجمع محصولات حاصل از متابولیسم غیر عادی فنیل آلانین در بدن ، در فرد عقب افتادگی ذهنی به وجود می آید.

نکات فصل 9 .. تولید مثل گیاهان

- 1 بسیاری از گیاهان به هر دو روش جنسی و غیر جنسی تولید مثل می کنند.
- 2 گیاهان از تغییر و تکامل جلبک های سبز پر سلولی به وجود آمده اند.
- 3 گیاهان می توانند آب را جذب کرده و در خود ذخیره کنند ، این ویژگی امکان زندگی در خشکی را برای آنها فراهم کرده است.
- 4 بزرگترین جاندار کره زمین درختی به نام سکویا با بیش از 100 متر ارتفاع و 7 متر قطر است.
- 5 گیاهان از نظر آوند دو دسته اند : 1- آوند داران (سرخسها یا نهانزادان آوندی .. بازدانگان .. نهان دانگان) 2- بدون آوند (خره گیان).
- 6 گیاهان از نظر دانه نیز دو دسته اند : 1- دانه دار (بازدانگان و نهاندانگان)
- 7 تولید دانه یکی از سازگاری های مهم گیاهان برای زندگی در خشکی است.
- 8 گیاهان دانه دار خود دو دسته اند : 1- بازدانگان (مخروط داران) 2- نهاندانگان (تک لپه ای ها و دولپه ای ها).
- 9 در میان گیاهان فقط نهاندانگان گل دار محسوب می شوند.
- 10 خزه گیان جزء گیاهان بدون آوند هستند ، کوچکند، پیکر ساده ای دارند، ریشه و ساقه و برگ ندارند و مواد غذایی و آب را از راه انتشار و اسمز منتقل میکنند و چون ریشه ندارند باید در محیط های آبکی و مرطوب رشد کنند و دارای چرخه تناوب نسل است..
- 11 خزه گیان به دو دلیل باید در محیط مرطوب باشند : 1- نداشت آوند و ریشه 2- برای تولید مثل و جابجایی گامت نر.

تولید مثل جنسی در گیاهان بدون دانه (خره گیان) و تولید مثل خزه

- 12 خزه مثل همه گیاهان دارای چرخه تناوب نسل است که شامل مراحل اسپورووفیتی و گامتوفتی طبق چرخه زیر است :
- (a) گیاه اصلی در خزه گامتوفت است و دو نوع گامتوفت نر و ماده به صورت جدا وجود دارند ، گامتوفت نر تولید آنتریدی و گامتوفتی ماده تولید آرکگن می کند) آنتریدی و آرکگن ساختارهایی چند سلولی هستند که گامت تولید می کنند .
- (b) آنتریدی سرانجام آنژروزوئید دو تاژکی (گامت نر) را می سازد و آرکگن سرانجام تخمز (گامت ماده) را به وجود می آورد.
- (c) بعد از رسیدن آنتریدی ، دهانه آن باز شده و آنژروزوئید های دوتاژکی آزاد شده و با شنا خود را به آرکگن و تخمز می رسانند و عمل لقاح انجام شده و بر روی گامتوفت ماده سلول تخم به وجود می آید(با تشکیل سلول تخم مرحله اسپورووفیتی آغاز می شود).
- (d) بر روی گامتوفت ماده سلول تخم با تقسیمات میتوزی پی در پی خود اسپورووفیت را به وجود می آورد.
- (e) اسپورووفیت خود شامل دو بخش تار و هاگدان است که درون هاگدان با تقسیمات میوزی هاگها یا همان اسپورها به وجود می آیند.
- (f) بعد از رسیدن هاگها ، هاگدان باز شده و هاگ ها توسط آب و باد پراکنده می شوند.
- (g) با قرار گرفتن هر هاگ در محیط مناسب ، شروع به رویش و تقسیم کرده و گامتوفت ها را به وجود می آورند.
- 13 در خزه ؛ گامتوفت گیاه اصلی است ، سبز رنگ است و فتوستنتز می کند و درشت تر از اسپورووفیت است.

- 14- در خزه، اسپوروفیت کاملاً وابسته به گامتوفیت است، زرد رنگ است، فتوستنتر نمی‌کند و بر روی گامتوفیت ماده قرار دارد.
- 15- در خزه (و کلاً در گیاهان) برای تولید گامت، تقسیم میتوز و برای تولید هاگ یا اسپور تقسیم میوز صورت می‌گیرد.
- 16- در خزه، گامت نر با داشتن دو تاژک برای شنا و جابجایی نیاز به آب و رطوبت دارد.

تولید مثل در نهانزادان آوندی (سرخس)

- 17- این گیاهان دارای آوند هستند و در مکان‌های مرطوب و سایه دار گشترش دارند زیرا تولید مثل آنها وابسته به آب سطحی است.
- 18- مراحل تولید مثل سرخس (نهانزادان آوندی):
- (a) در زیر گامتوفیت سبز رنگ قلی شکل که پروتال نام دارد، اندام آرکگن و آنتریدی به وجود می‌آیند.
 - (b) آنتریدی تولید آنتروزووئید دو تاژکی و آرکگن تولید تخمزا می‌کند.
 - (c) آنتروزووئید آزاد شده و با شنا خود را به تخمزا رسانده و عمل لقاح صورت گرفته و سلول تخم به وجود می‌آید.
 - (d) از رشد و تقسیم سلول تخم بر روی پروتال، اسپوروفیت به وجود می‌آید که سبز رنگ است و بعد از تکمیل شبیه یک برگ بزرگ است و به آن برگ شاخه گفته می‌شود.
 - (e) دسته‌های هاگدانی به نام هاگینه در سطح پشتی برگ شاخه به وجود می‌آید که بعد از رسیدن تولید تعداد زیادی هاگ می‌کنند.
 - (f) هاگ‌ها بعد از رسیدن و آزاد شدن و قرار گرفتن در محیط مناسب، رویش و تقسیم انجام داده و گامتوفیت‌ها (پروتال‌ها) را به وجود می‌آورند.
- 19- در سرخس‌ها هم اسپوروفیت و هم گامتوفیت سبز رنگ اند و توانایی فتوستنتر دارند.
- 20- در سرخس‌ها، اسپوروفیت گیاه اصلی است و درشت‌تر از گامتوفیت است.
- 21- در سرخس‌ها، اسپوروفیت فقط در اوایل رشد خود به گامتوفیت وابسته است ولی بعد از مدتی پروتال از بین رفته و اسپوروفیت مستقل خواهد شد.

تولید مثل گیاهان دانه دار (بازدانگان .. نهان دانگان)

- 22- تولید مثل این گیاهان ویژگی‌هایی به شرح زیر دارد:
- (a) گامتوفیت این گیاهان میکروسکوپی است.
 - (b) هاگ‌ها در اسپوروفیت باقی می‌مانند و گامتوفیت‌ها را درون اسپوروفیت به وجود می‌آورند.
 - (c) گامتوفیت نر در این گیاهان به دانه گرده تمایز می‌یابد و گامتوفیت ماده در تخمک که بخشی از اسپوروفیت است به وجود می‌آید.
 - (d) بعد از لقاح، تخمک و محتويات آن تبدیل به دانه می‌شود.
 - (e) این گیاهان برای لقاح نیازی به آب سطحی ندارند.
 - (f) در این گیاهان دانه گرده (گامتوفیت نر) در طی گرده افشاری جابجا می‌شود و با قرار گرفتن بر روی بخش تولید مثلی ماده لوله گرده را به وجود می‌آورد که گامت نر را به تخمزا می‌رساند.

تولید مثل در بازدانگان و تولید مثل کاج

- 23 این گیاهان موفق ترین گیاهان برای زندگی در خشکی هستند.
- 24 سهمی از این موقعيت مربوط به بخش‌های تخصص یافته‌ای است که به منظور نمو دانه به وجود آمده اند و مخروط نام دارند.
- 25 مخروط‌ها اجتماعی از برگ‌های تغییر شکل یافته هستند که پولک نامیده می‌شوند.
- 26 بازدانگان دو نوع مخروط دارند : ۱- مخروط‌های نر ۲- مخروط‌های ماده
- 27 مراحل تولید مثل بازدانگان (کاج) :

الف) در بخش ماده

(a) هر تخمک شامل پارانشیم خورش ، یک پوسته و منفذی به نام سفت است که در دومین سال تشکیل تخمک

یکی از سلول‌های پارانشیم خورش با تقسیم میوز 4 سلول به وجود می‌آورد که فقط یکی از آنها باقی مانده و با تقسیمات میتوزی پی در پی خود ، بافتی را به نام آندوسپرم (همان گامتوفیت ماده) را به وجود می‌آورد .

(b) در هر آندوسپرم ، چند آرکگن به وجود می‌آید و هر آرکگن یک سلول تخمزا به وجود می‌آورد.

ب) در بخش نر

(c) در مخروط نر کیسه‌های گرده به وجود می‌آیند که درون این کیسه‌ها سلول‌هایی وجود دارند که با تقسیم میوز خود ، دانه‌ء گردهء نارس را به وجود می‌آورند.

(d) هر سلول دانهء گردهء نارس با دو بار تقسیم میتوزی پی در پی چهار سلول ایجاد می‌کند که بعداً اطراف آنها را پوستهء سختی فرا می‌گیرد که در این حالت دانهء گردهء رسیده است.

(e) دانهء گردهء رسیده دارای دو بال است (از فاصله گرفتن پوستهء داخلی و خارجی دانهء گرده) و توسط باد جابجا شده به مخروط ماده و تخمک می‌رسد.

ج) لفاح

(f) بعد از قرار گرفتن دانهء گرده بر روی تخمک یکی از سلول‌های آن به نام سلول رویشی ایجاد لولهء گرده می‌کند

سلول دیگری به نام زایشی در لوله گرده تقسیم میتوز انجام داده و دو آنتروزوئید(گامت نر) به وجود می‌آورد که فقط بکی از آنها با سلول تخمزا ادغام و لفاح انجام می‌شود و سلول تخم به وجود می‌آید.

(g) سلول تخم به همراه تخمک ، دانه را به وجود می‌آورد به این صورت که :

ا- پوستهء تخمک بعداً پوستهء دانه را به وجود می‌آورد.

ii- آندوسپرم ، بخش ذخیره ای دانه (آلبومن) را به وجود خواهد آورد.

iii) و سلول تخم با تقسیمات میتوزی خود رویان دانه را تشکیل خواهد داد.

(h) به مخروط‌های ماده بعد از لقاح و تشکیل دانه، **مخروط‌های دانه** گفته می‌شود.

(i) مخروط‌های دانه سرانجام بعد از رسیدن کامل باز شده و دانه را به اطراف پراکنده خواهند کرد.

(j) دانه رسیده کاج دارای بالی است که مانند تیغه‌های هلیکوپتر در هنگام افتادن دانه را می‌چرخاند و باعث دور

شدن دانه از گیاه اصلی می‌شود.

-28 در بیشتر بازدانگان مخروط‌های نر و ماده بر روی یک گیاه به وجود می‌آیند.

-29 در زیر پولک‌های **مخروط‌های نر**، **کیسه‌های گرد** تشکیل می‌شود که دانه‌های گرده را به وجود می‌آورند و تخمرک‌ها در سطح بالایی پولک‌های مخروط

ماده ظاهر می‌شوند.

تولید مثل نهان‌دانگان (گیاهان گل‌دار)

-30 مراحل تولید مثل گیاهان نهان دانه (گلدار):

الف) بخش ماده

(a) مادگی از یک یا چند برقه تشکیل شده است که هر برقه شامل: 1- کلاله 2- خامه 3- تخدمان است.

(b) تخدمان بخش متورم انتهایی برقه است که درون آن تخمرک تشکیل می‌شود و پایه ای به نام خامه دارد که به کلاله ختم

می‌شود. کلاله متورم و چسبناک است.

(c) تخمرک دارای **پارانشیم خورش**، **منفذ سفت** و **دو پوسته** است، یکی از سلول‌های خورش رشد کرده و تقسیم می‌وز

اجام

میدهد و 4 سلول هاپلوبیوت به وجود می‌آورد (معادل هاگ) که یکی از آنها سه بار متوالی تقسیم میتوز انجام میدهد و یک

بخش 8 سلولی به نام **کیسه‌های رویانی** (گامتوفیت ماده) را به وجود می‌آورد.

(d) 8 سلول درون کیسه‌های رویانی به این صورت آرایش می‌یابند که سلول تخمزا به همراه دو سلول دیگر در نزدیکی سفت قرار

می‌گیرد، دو سلول در وسط که **سلول دو هسته‌ای** نامیده می‌شود، و سه سلول در بخش انتهایی کیسه‌های رویانی قرار می‌گیرند.

ب) بخش نر

(e) پرچم دارای دو بخش میله و بساک است که بساک در بخش بالایی میله قرار می‌گیرد.

(f) کیسه‌های گرده درون بساک به وجود می‌آیند، درون کیسه‌های گرده سلول‌هایی تقسیم می‌وز انجام می‌دهند و هر کدام 4

سلول هاپلوبیوت (هاگ) به وجود می‌آورند که با رویش هر کدام دانه گرده رسیده به وجود می‌آید (دو بار میتوز).

(g) دانه گرده رسیده دارای دیواره خارجی و داخلی است و دارای سلول‌های زایشی و رویشی.

(h) با قرار گرفتن دانه گرده رسیده بر روی کلاله مادگی، **سلول رویشی ایجاد لوله گرده** و سلول زایشی در داخل لوله

گرده یک بار دیگر میتوز انجام داده و دو آنتروزوئید (گامت نر) به وجود می‌آورد.

ج) لقاح و تشکیل دانه

(a) در گیاهان گل دار لقاح مضاعف است (دو لقاح صورت می‌گیرد) به این صورت که یکی از گامت‌های نر با سلول تخما

ترکیب شده و تخم اصلی دیپلولئید (2n) را به وجود می‌آورد و گامت نر دیگر با سلول دو هسته‌ای ترکیب و تخم ترپلولئید

(3n) را می‌سازد.

(b) تخم اصلی با تقسیمات خود رویان را به وجود خواهد آورد و تخم ترپلولئید با تقسیمات خود بخش ذخیره ای دانه

(آلومن) تشکیل خواهد داد.

(c) آلومن سرشار از مواد غذایی است که رویان از آن تغذیه خواهد کرد.

(d) برای تشکیل رویان تخم اصلی تقسیم نامساوی انجام میدهد که سلول بزرگتر بخشی را می‌سازد که رویان را به گیاه مادر

متصل نگه می‌دارد و سلول کوچکتر رویان قلبی شکلی را به وجود خواهد آورد.

(e) دانه از نمو تخم و بافت‌های تخمک بعد از لقاح به وجود می‌آید به این صورت که :

(i) پوستهٔ تخمک تبدیل به پوستهٔ دانه خواهد شد.

(ii) آلومن بخش ذخیره ای دانه را تشکیل خواهد داد.(در مواردی لپه)

(iii) تخم اصلی هم رویان را به وجود خواهد آورد.

گامتوفیت نهاندانگان در گل‌ها تمايز می‌يابند.

-31

گل‌ها دارای 4 بخش هستند: 1- کاسبرگ 2- گلبرگ 3- پرچم 4- مادگی

-32

گلی که دارای هر 4 حلقه باشد گل کامل و گلی که فاقد یک یا چند تا از این حلقه‌ها باشد گل ناکامل نامیده می‌شود.

-33

گلی که حلقه‌های پرچم و مادگی را دارد گل دو جنسی و گلی که فاقد یکی از این حلقه‌ها باشد گل تک جنسی نامیده می‌شود.

-34

روشن است که گل تک جنسی یک نوع گل ناکامل است.

-35

اکثر گل‌ها، گلبرگ‌هایی با رنگ درخشان و دارای شهد و بوی قوی و شکل‌هایی جذاب برای جانوران گرده افسانه هستند و آنها را به سمت خود می‌کشند.

-36

نمونهٔ جانوران گرده افسانه حشره‌ها، پرنده‌گان و خفاش‌ها می‌باشند.

-37

گل‌ها منبع غذایی جانوران گرده افسانه هستند.

-38

دانه گرده منبع غنی پروتئین برای زنبورها است.

-39

زنبورها گل را در ابتدا با استفاده از بو و سپس از طریق رنگ و شکل شناسایی می‌کنند و معمولاً گرده افسانه گل‌های آبی یا زرد را

انجام می‌دهند.

-40

حشره‌هایی که در شب تغذیه می‌کنند به سمت گل‌های سفید رنگ دارای رایحه قوی می‌روند.

-41

- انواع مگس‌ها ای گرده افshan ، گرده گل هایی را که بویی شبیه به گوشت گندیده دارند ، می افشنند. -42
- مرغ شهدخوار نمونه پرنده‌گان گرده افshan است. -43
- خفاش‌ها ، گل‌های سفیدی را که در شب باز می شوند ، گرده افshan می کنند. -44
- گرده افshan بسیاری از گل‌ها مانند چمن‌ها و بلوط‌ها توسط باد انجام می گیرد. -45
- گل‌هایی که گرده افshan آنها توسط باد انجام می شود ، معمولاً کوچک ، فاقد رنگ‌ها درخشنan ، بوهای قوی و شیره هستند و معمولاً کاسبرگ و گلبرگ ندارند و مقادیر فراوانی نیز دانه گرده تولید می کنند. -46
- رویان گیاه در واقع اسپوروفیت جدید است. -47
- در بعضی نهاندانگان (دو لپه ای ها) ، مواد غذایی آلبومن به طور کامل جذب رویان می شود و این دانه‌ها فاقد آلبومن هستند. -48
- لپه‌ها برگ‌های تغییر شکل یافته ای هستند که بخشی از رویان را تشکیل می دهند و کار آنها ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان است. -49
- در بازدانگان بافت حاوی مواد غذایی (آندوسپرم) بخشی از گامتوفیت ماده است و پیش از لقاح تشکیل شده است هایپلولئید است. -50
- در نهاندانگان بخش ذخیره ای بعد از لقاح و توسط تخم تریپلولئید به وجود می آید و $3n$ است. -51
- تعداد لپه‌های رویان بازدانگان دو یا بیشتر است مثلاً رویان کاج دارای 8 لپه است. -52
- رویان بعضی از نهاندانگان یک لپه دارد و تک لپه ای نام دارند و آنها بیکه دارند دو لپه ای نامیده می شوند. -53

تولید مثل غیر جنسی (رویشی) در گیاهان

- بیشتر گیاهان می توانند به روش غیر جنسی تولید مثل کنند که افراد حاصل از نظر ژنتیکی کاملاً همانند گیاه والد خواهند شد. -54
- در تولید مثل غیر جنسی ، بخش‌های رویشی گیاه مانند ساقه‌ها ، ریشه‌ها و برگ‌ها نقش دارند. -55
- تولید مثل گیاه از طریق بخش‌های رویشی گیاه ، تولید مثل رویشی نام دارد. -56
- ساقه‌های رونده .. پیازها .. بنه‌ها .. غده‌ها و ریزوم ها همه انواعی از ساقه‌های تغییر شکل یافته اند که گیاه با استفاده از آنها تولید مثل رویشی انجام می دهد. -57
- ساقه رونده ، در سطح خاک به صورت افقی رویش می کند . مثلاً در توت فرنگی. -58
- پیاز ساقه ای بسیار کوتاه با برگ‌های ضخیم و گوشتی است و مخصوص تک لپه ای ها است مانند : پیاز خوراکی ، نرگس و لاله. -59
- ریزوم ، ساقه ای زیر زمینی و افقی است مانند : زنبق و سرخس. -60
- غده ، ساقه ای زیر زمینی و گوشتی است مانند : سیب زمینی. -61
- در بیشتر گیاهان تولید مثل رویشی سریعتر از تولید مثل جنسی است و به سرعت باعث پراکندگی گیاه در محیط می شود مثلاً در خره‌ها و چمن‌ها با این روش به سرعت پراکنده می شوند. -62

-63

انسان به روش‌های زیر باعث تکثیر گیاهان می‌شود:

a. **تکثیر گیاهان با استفاده از بخش‌هایی که برای تولید مثل رویشی اختصاص نیافته‌اند.** مثلاً قطعات ساقه‌های برگ

بیدی یا استفاده از برگ گیاه بنفسه‌های آفریقایی.

b. **پیوند زدن** که در این روش جوانه‌ای از درخت مطلوب به درخت دیگری پیوند زده می‌شود. به این جوانه پیوندک و درختی که پیوند

روی آن انجام می‌شود، پایه پیوند نامیده می‌شود.

c. **فن کشت بافت** که در این فن، قطعاتی از گیاه روی محیط کشت سترون (بی میکروب) کشت داده می‌شود که در نهایت گیاهچه‌های

جدیدی حاصل خواهد شد که در محیط مناسب برد و کاشته می‌شوند.

-64

پیوند زدن در بسیاری از درختان میوه .. بادام و یا گل سرخ های دورگه انجام می‌شود.

-65

نمونه قطعه قطعه کردن در درختان زینتی .. درختچه‌ها .. انجیر و سیب زمینی و ... صورت می‌گیرد.

-66

کشت بافت در ارکیده ، سیب زمینی و بسیاری از گیاهان آپارتمانی صورت می‌گیرد.

نکات فصل ۱۰ .. رشد و نمو در گیاهان

- ۱ رویان دارای **زندگی نهفته** است و در بعضی مواقع می‌تواند هزاران سال زندگی نهفته خود را حفظ کند.
- ۲ **تغییرات محیطی** مثل افزایش دما و رطوبت محیط و ... می‌توانند باعث رویش دانه شوند.
- ۳ بسیاری از دانه‌ها باید قبل از جوانه زنی :
- .a. در معرض سرما و یا نور قرار بگیرند.
 - .b. پوسته آنها بشکند.
 - .c. در معرض آتش قرار بگیرند.
 - .d. از دستگاه گوارش جانوران عبور کنند.
 - .e. روی تخته سنگی بیافتنند و ... ، تا نفوذ پذیر شده و بتوانند جوانه بزنند.
- ۴ **نفوذ آب و اکسیژن** به درون دانه برای جوانه زنی لازم است.
- ۵ با نفوذ آب به درون دانه ، بافت‌های آن متورم می‌شود و پوسته آن می‌شکافد و رویش دانه آغاز می‌شود.

جوانه زنی

- ۶ جوانه زنی آغاز رشد دانه گیاه است و اولین علامت آن ظهرور ریشه رویان (ریشه چه) است.
- ۷ ساقه جوان بعضی از گیاهان مانند لوبيا بعد از جوانه زنی ، قلاب تشکیل می‌هند و به اینصورت از خاک خارج می‌شوند.
- ۸ قلاب از رأس ساقه محافظت می‌کند و از صدمه دیدن آن هنگام رشد در میان خاک جلوگیری می‌کند.
- ۹ در اطراف ساقه جوان بعضی از گیاهان مانند ذرت ، یک غلاف محافظت کننده به وجود می‌آید که از رأس ساقه محافظت می‌کند و بعد از خارج شدن از خاک پاره می‌شود و برگ‌های گیاه از آن خارج می‌شوند.
- ۱۰ در برخی گیاهان مانند لوبيا ، لپه‌ها پس از خروج از خاک باز می‌شوند و بعضی دیگر مانند ذرت و نخود ، لپه دانه درون خاک باقی می‌ماند.

عمردانه‌ها

- ۱۱ عمر دانه‌ها بسیار متنوع است و از چند روز تا چند هزار سال عمر وجود دارد.

طول عمر گیاهان

- ۱۲ مسن ترین درخت شناخته شده نوعی کاج است که حدود ۵۰۰۰ سال عمر داشته است.
- ۱۳ عمر بعضی از گیاهان فقط چند هفته است.

گیاهان از نظر طول عمر سه دسته‌اند:

-14

گیاهان یک ساله (a)

گیاهان دو ساله (b)

گیاهان چند ساله (c)

گیاه یک ساله؛ گیاهی است که در یک فصل رشد، چرخه زندگی خود را تکمیل کرده و سپس از بین میرود. -15

دراویح همه گیاهان یک ساله، علفی هستند مثل لوبیا، آفتابگردان و ... -16

گیاه دوساله؛ گیاهانی هستند که برای تکمیل چرخه زندگی خود دو دوره رویشی را طی می‌کنند. -17

گیاهان دو ساله در اولین دوره رویشی، ریشه و ساقه ایجاد می‌کنند و در پایان این دوره یک ساقه کوتاه و یک طوقه برگ دارند و ریشه عمل ذخیره مواد غذایی را بر عهده دارد. -18

گیاه در دومین دوره رویشی از مواد ذخیره ای برای تولید محور گل استفاده می‌کند و تولید میوه و دانه کرده و سپس از بین می‌رود. -19
نمونه گیاهان دوساله هویج، جعفری و بیازها هستند. -20

گیاهان چند ساله؛ گیاهانی هستند که چند سال به زندگی خود ادامه می‌دهد. -21

بسیاری از گیاهان علفی و همه گیاهان چوبی چند ساله‌اند. -22

غلب گیاهان چند ساله در طول عمر خود چندین مرتبه به بار می‌نشینند. -23

برخی از گیاهان چند ساله علفی قبل از مرگ تنها یک بار تولید مثل می‌کنند مانند گیاه آگاو. -24

داودی، نرگس و زنبق زرد از گیاهان چند ساله علفی هستند. -25

این گیاهان مواد غذایی مورد نیاز برای دوره بعدی رشد خود را در ریشه‌های گوشتی و ساقه‌های زیرزمینی ذخیره می‌کنند. -26
ساقه‌های هوایی گیاهان علفی غالباً پس از هر دوره رشد از بین می‌روند. -27

بعضی از گیاهان چند ساله چوبی هر سال برگ‌های خود را می‌ریزانند و به گیاهان برگ ریز معروفند مثل نارون، افرا، مو و ... -28

بعضی از گیاهان چند ساله، در طول سال تنها تعدادی از برگ‌های خود را از دست می‌دهند و به گیاهان همیشه سبز معروفند مثل کاج و سرو و مركبات. -29

رشد و نمو

-30 رشد یعنی بزرگ شدن بخش‌های تشکیل دهنده یک جاندار یا تشکیل بخش‌هایی در بدن جاندار، که مشابه بخش‌های قبلي باشد. مثلاً پیدايش انشعابات ریشه، ساقه و برگ جدید.

-31 تمایز به معنی کسب یک ویژگی جدید در یک یا تعدادی سلول است و با تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی همراه است.

- 32 تمایز اغلب به همراه رشد صورت می‌گیرد.
- 33 رشد و تمایز در طول زمان منجر به تشکیل موجود زنده پیچیده از نظر ساختاری و متابولیسمی می‌شوند.
- 34 نمو یعنی عبور از یک مرحله زندگی به مرحله ای دیگر که همراه با تشکیل بخش‌های جدیدی است که قبلاً وجود نداشته اند مثلاً تشکیل گل روی گیاهی که قبلاً فاقد گل بوده است.
- 35 رشد و نمو اغلب به همراه بدکدیگر و هماهنگ با یکدیگر رخ می‌دهند.
- 36 به طور کلی رشد در جانداران به دو روش انجام می‌شود **۱- افزایش تعداد سلول‌ها** از طریق تقسیم **۲- افزایش غیر قابل بازگشت ابعاد سلول‌ها**
- 37 مثلاً آماس سلول‌ها پس از جذب آب، رشد به حساب نمی‌آید، چون این افزایش حجم با دفع آب، بازگشت پذیر است.

رشد نخستین و رشد پسین

- 38 بخش‌هایی از گیاه که در اثر تقسیم و رشد مریستم‌های نخستین به وجود می‌آیند، ساختار نخستین گیاه را تشکیل می‌دهند.
- 39 مریستم‌های نخستین در مناطقی مانند نوک ساقه و نردیک به نوک ریشه (بالای کلاهک) وجود دارند.
- 40 مریستم‌های نخستین در همه گیاهان وجود دارند.
- 41 بخش‌هایی از گیاه که در پی تقسیم مریستم‌های پسین به وجود می‌آیند، ساختار پسین گیاه را به وجود می‌آورند.
- 42 مریستم‌های پسین به صورت استوانه‌هایی در ریشه و ساقه بعضی گیاهان که عمدتاً گیاهان چوبی چند ساله هستند به وجود می‌آیند و به رشد قطری گیاه .. نیز استحکام و ضخامت ساقه کمک می‌کنند.
- 43 تقسیم سلولی در مریستم‌ها باعث رشد گیاه می‌شود.
- 44 مریستم‌های رأسی که در نوک ساقه‌ها و ریشه‌ها قرار دارند، با تقسیم سلولی خود باعث رشد نخستین می‌شوند.

رشد نخستین

- 45 رشد نخستین، ساقه‌ها و ریشه‌های یک گیاه را طویل تر می‌کند.
- 46 رشد قطری ساقه‌ها و ریشه‌های جوانی که فقط مریستم نخستین دارند، در پی افزایش حجم سلول‌های حاصل از مریستم نخستین به وجود می‌آیند.
- 47 بافت‌های حاصل از رشد نخستین، بافت‌های نخستین نامیده می‌شوند. که شامل بافت‌های نخستین روبوستی .. زمینه‌ای و آوندی می‌باشند.

- 48- برخی از سلول‌های حاصل از مریستم‌های نزدیک به نوک ریشه، بخشی از کلاهک ریشه را نیز تشکیل می‌دهند. که کلاهک از مریستم‌های نوک ریشه محافظت می‌کنند.

رشد پسین

- 49- رشد پسین از ویژگی‌های باز گیاهان چوبی است. اما در بعضی از بخش‌های گیاهان علفی، مانند ریشه‌های هویج دیده می‌شود.
- 50- رشد پسین در اثر فعالیت و تقسیم سلولی دو نوع مریستم انجام می‌شود که در ساقه‌ها و ریشه‌های چوبی به صورت استوانه‌ای باریک قرار دارند.
- این مریستم‌ها عبارتند از : ۱- کامبیوم چوب پنبه ساز ۲- کامبیوم آوند ساز
- 51- محل کامبیوم چوب پنبه ساز درون پوست است و سلول‌های چوب پنبه‌ای ایجاد می‌کند.
- 52- کامبیوم آوند ساز در زیر پوست مستقر است و بافت‌های آوندی را ایجاد می‌کند.
- 53- بافت‌های حاصل از رشد پسین، بافت‌های پسین نامیده می‌شوند.
- 54- کامبیوم آوند ساز به سمت خارج آوند آبکشی پسین و به سمت داخل آوند چوبی پسین می‌سازد.
- 55- چوب پنبه .. کامبیوم چوب پنبه ساز و آبکش پسین مجموعاً پوست درخت را تشکیل می‌دهند.
- 56- کامبیوم آوند ساز و چوب پسین در زیر پوست قرار می‌گیرند.
- 57- چوب پسین هر سال یک حلقه جدید تشکیل می‌دهد که به آنها حلقه‌های سالیانه می‌گویند.
- 58- حلقه‌های سالیانه تنها در درخت‌هایی تشکیل می‌شود که به طور متناوب سرد و گرم می‌شوند، رشد می‌کنند.
- 59- تفاوت در قطر عناصر آوندی چوبی که در فصل‌های مختلف سال به وجود می‌آیند، باعث تشکیل حلقه‌های سالیانه می‌شوند.
- 60- قطر عناصر آوندی چوبی در فصل بهار بیشتر است و عناصر کوچکتر در تابستان تشکیل می‌شوند.
- 61-

نحو گیاهان پیوسته، اما برگشت پذیر است.

- 62- ژن‌ها نمو گیاهان و جانوران را هدایت می‌کنند. اما الگوی نمو در آنها متفاوت است.
- 63- در جانوران همگام با نمو، دسته‌ای از ژن‌ها که کنترل کننده تمایز هستند، غیر فعال می‌شوند و بیشتر آنها مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.
- 64- بیشتر تمایز جانوران بعد از بلوغ متوقف می‌شود.
- 65- بر عکس، گیاهان به طور مداوم یا مریستم‌های خود سلول‌های جدید به وجود می‌آورند که این سلول‌ها می‌توانند متمایز شوند یا به این بافت‌ها اضافه شوند.
- 66- گیاهان معمولاً در طول زندگی به نمو خود ادامه می‌دهند.

- 67- بسیاری از سلول‌های گیاه بالغ می‌توانند همهٔ ژن‌های خود را فعال کنند. چنین سلول‌هایی می‌توانند با تقسیم خود توده‌هایی از سلول‌ها به نام **کالوس** را تولید کنند. به این حالت **تمایز زدایی** گفته می‌شود.
- 68- در تمایز زدایی سلول بار دیگر می‌تواند تمایز یابد و به صورت یک گیاه بالغ نمو کند.
- 69- برای رویاندن گیاه جدید از بافتی که تمایز زدایی کرده است، از **فن کشت بافت استفاده** می‌شود.
- 70- توده‌های تمایز نیافته در محیط کشت سترون، پس از رشد و تمایز، سرانجام به گیاهانی تبدیل می‌شوند که از نظر ژنتیکی هم ارز گیاه مادر هستند.

روش‌های جدید بهسازی گیاهان

-71- روش‌های جدید بهسازی گیاهان عبارتند از:

(a) کشت بافت سلول یا اندام گیاهی:

الف. از کشت بافت برای تکثیر گیاهان از جمله گیاهان زیستی ارزشمند مانند ارکیده‌ها، گیاهان گلداری و درختان میوه

استفاده می‌شود.

ب. در این روش هزاران کشت از یک گیاه منفرد حاصل می‌شود.

ج. برای ایجاد گیاهان دارای ویژگی‌های جدید ازفن کشت بافت استفاده می‌شود.

(b) هم جوشی (الحاق) پروتوبلاست‌ها:

الف. از هم جوشی پروتوبلاست‌ها برای ایجاد گیاهان دورگه (هیبرید) اطلسی، سبب زمینی و هویج استفاده شده است.

ب. پروتوبلاست، سلول گیاهی است که دیواره سلولی آن را با کمک آنزیم‌ها یا روش‌های مکانیکی جدا کرده‌اند.

ج. برخی مواد شیمیایی، یا شوک الکتریکی باعث هم جوشی دو پروتوبلاست با یکدیگر می‌شود.

د. اگر پروتوبلاست‌ها متعلق به گونه‌های مختلف باشند، حاصل هم جوشی یک سلول دورگ خواهد بود که اگر در محیط

مناسب کشت بافت قرار گیرد، به یک گیاه بالغ دورگ تبدیل خواهد شد.

(c) مهندسی ژنتیک

الف. به منظور ایجاد گیاهان مطلوب کشت بافت مرحله‌ای ضروری در مهندسی ژنتیک است.

ب. در مهندسی ژنتیک، ابتدا ژن دلخواه را وارد سلول‌های یک گیاه می‌کنند، سپس سلول‌هایی را که از نظر ژنتیکی

تغییر یافته‌اند، با کمک فن کشت بافت به گیاهان بالغ جدید تبدیل می‌کنند.

تنظیم رشد و نمو گیاهان

- 72 گیاهان برای تشکیل همه کربوهیدرات های خود فقط به دو ماده خام ، یعنی دی اکسید کربن و آب نیاز دارند.
- 73 در گیاهان بیشترین قسمت اکسیژن مورد استفاده برگ ها و ساقه ها به منظور تنفس از هوا تأمین می شود.
- 74 ریشه ها اکسیژن مورد نیاز خود را از هوای موجود در فضاهای بین ذرات خاک به دست می آورند.
- 75 اگر خاک اطراف ریشه ها فشرده و یا از آب اشباع گردد ، دیگر اکسیژن کافی برای ریشه ها تأمین نمی شود و ریشه ها می میرند.
- 76 گیاهان همچنین نیازمند مقادیر اندکی از عناصر معدنی هستند که بیشتر به صورت یون های معدنی جذب می شود.
- 77 عنصر نیتروژن در ساختمان پروتئین ها ، نوکلئیک اسید ها ، گلروفیل ، ATP و کوآنزیم ها شرکت دارد و رشد گیاهان سبز را افزایش می دهد.
- 78 فسفر بخشی از ADP ، نوکلئیک اسیدها ، فسفولیپید ها ، غشای سلولی و برخی کوآنزیم ها است.
- 79 پتاسیم برای انتقال فعال ، فعالیت آنزیم ها ، تعادل اسمزی و باز شدن روزنه ها مورد نیاز است.

هormون های گیاهی

- 80 در گیاهان ممکن است محل تولید و محل اثر هormون یکی باشد.
- 81 چون برخی از هormون های گیاهی باعث تحریک رشد و برخی دیگر باعث بازدارندگی رشد می شوند ، بسیاری از دانشمندان ترجیح می دهند به جای اصطلاح هormون های گیاهی از اصطلاح **تنظیم کننده های رشد** استفاده کنند.
- 82 هormون های گیاهی دو دسته اند :

a. محرك های رشد که شامل اکسین ها ، سیتوکینین ها و ژیبرلین ها هستند و در فرآیند هایی مثل تقسیم سلولی ، طویل شدن سلول ، پیدایش اندام ها و تمایز آنها دخالت دارند.

b. بازدارنده های رشد که عمل آنها در مقابل محرك های رشد است و شامل اتیلن و آبسزیک اسید هستند.

هormون ها الگو های رشد گیاهان را کنترل می کنند.

- 83 رشد گیاه به سمت نور ، **نورگرایی** (فتوتروپیسم) نام دارد.
- 84 یک زیست شناس هلندی به نام فریتزونت به این نتیجه رسید که در رأس ساقه ها تولید می شود ، باعث این خمیدگی می شود. او این ماده را **اکسین** نامید.
- 85 چارلز داروین و پسر او فرانسیس داروین پی برندند که پاسخ خمیدگی رأس گیاهچه های گیاهان گندمی ، در قسمت هایی پائین تر و دور از رأس قابل مشاهده است و باعث خمیدگی گیاهچه به سمت نور می شود.

-86- شکل صفحه 230 آزمایش های ونت را نشان می دهد که در آنها :

- a. ونت راس ساقه جوان جو دو سر را بریده و آن را روی یک قطعه آگار قرار داد در نتیجه اکسین وارد قطعه آگار شد.
- b. ونت قطعه آگار را روی انتهای بریده شده ساقه جوان یولاف منتقل کرد که باعث رشد ساقه شد.
- c. ونت قطعه آگار را روی یک قسمت از لبه بریدگی ساقه جوان منتقل کرد که ساقه در جهت مخالف به رشد خود ادامه داد.
- d. ونت به عنوان شاهد، یک قطعه آگار فاقد اکسین را بر روی انتهای بریده شده ساقه جوان قرار داد که این ساقه رشد نکرد.

-87- بازدارندگی رشد جوانه های جانبی موجود روی ساقه توسط اکسین راس ساقه ، **چیرگی رأسی** نامیده می شود.

-88- جدول هormون های گیاهی و نقش و کاربرد آنها :

نام هormون	محل ساخته شدن	نوع اثر	کاربرد در کشاورزی
اکسین	انتهای ساقه	افزایش انعطاف پذیری دیواره سلول ها طولیل شدن سلول ها چیرگی رأسی (جلوگیری از رشد جوانه های جانبی)	ریشه زایی در قلمه ها ریشه زایی در محیط کشت بافت پر شاخه و برگ کردن گیاه در اثر هرش کردن
سیتوکینین	انتهای ریشه	تحریک تقسیمات سلولی کاهش سرعت پیر شدگی برخی از اندام های گیاهی	به عنوان اسپری و افشاره برای شادابی و طراوت گل ها و سایر بخش های گیاهی نگهداری بیشترمیوه ها و سبزیجات در محیط کشت بافت برای تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته
ژیبرلین	ساقه و دانه های در حال نمو	افزایش طول ساقه بیداری جوانه ها و دانه های در حال خواب نموا میوه جانه زنی دانه ها جلوگیری از ریشه زایی تسربیغ گل دهی	تولید میوه های درشت بدون دانه درشت کردن دانه های انگور بدون دانه
اتیلن	غلب بافت های گیاه خصوص میوه ها	افزایش مقاومت گیاه در شرایط سخت کنترل رشد و سنتز پروتئین و انتقال بون ها در شرایط نامساعد (تنش آب ، زخم مکانیکی ، آلوگی هوا ، عوامل بیماری زا، شرایط غرقابی و بی هوایی) هormون پیری که باعث ریزش برگ و رسیدن میوه ها و پژمردگی و ریزش گل ها می شود	تسربیغ و افزایش رسیدگی میوه ها بی مثل گوجه فرنگی و انگور و غیره سسست شدن میوه هایی مانند گیلاس و سهولت برداشت مکانیکی و چیدن آنها
آبسزیک اسید	جونه ها و دانه های خفتة غلب بافت های گیاهی در شرایط نامساعد	خفتگی جوانه ها و دانه ها افزایش مقاومت گیاه در شرایط سخت کنترل رشد و سنتز پروتئین و انتقال بون ها در شرایط نامساعد هormون پیری که باعث ریزش برگ و رسیدن میوه ها و پژمردگی گل ها تعادل آب گیاه تحت تنش خشکی به وسیله بستن روزنه ها	شرایط محیطی رشد گیاهان را تنظیم می کند.

-89- گیاهان قادر به حرکت نیستند و با تنظیم سرعت و الگوی رشد خود به محیط پاسخ می دهند.

- ۹۰- بسیاری از پاسخ‌های یک گیاه را به محرک‌های محیطی، هورمون‌های تنظیم کننده رشد شروع می‌کنند.
- ۹۱- پاسخ یک گیاه به طول روز و شب، نور دورگی نامیده می‌شود.
- ۹۲- گیاهان از نظر نور دورگی سه دسته اند: ۱- گیاهان روزکوتاه ۲- گیاهان روز بلند ۳- گیاهان بی تفاوت
- ۹۳- گیاه روزکوتاه گیاهی است که گلدهی آن زمانی انجام می‌شود که طول روز کمتر از مدت زمان معینی باشد.
- ۹۴- گیاه روز بلند گیاهی است که گلدهی آن نگامی صورت می‌گیرد که طول روز بلندتر مدت زمان معینی باشد.
- ۹۵- گیاه بی تفاوت، گیاهی است که گلدهی آن تحت اثر طول روز قرار نمی‌گیرد.
- ۹۶- در واقع به جای طول روز، طول شب است که نور دورگی را کنترل می‌کند به همین دلیل به گیاهان روزکوتاه، گیاهان شب بلند و به گیاهان روز بلند، گیاهان شب کوته نیز می‌گویند.
- ۹۷- نور دورگی در صنعت کشت و پرورش گل و گیاه بسیار حائز اهمیت است به این صورت که در گلخانه‌ها طول روز و شب به طور مصنوعی کنترل می‌شود.
- ۹۸- بنت قنسول در دی ماه و داودی در تمام طول سال پرورش داده می‌شوند.
- ۹۹- داودی و بنت قنسول، هر دو روزکوتاه هستند و در فصلی که معمولاً گل نمی‌دهند وادر به گل دهی می‌شوند.
- ۱۰۰- گیاه زنبق یک گیاه روز بلند است که یک فلاش نوری باعث شکستن شب بلند می‌شوند و گیاه را مثلاً در اواخر پائیز که شب بسیار بلند است، مجبور به گل دادن می‌کنند.

پاسخ به دما

- ۱۰۱- در صورتی که دما در طول شب بسیار بالا باشد، بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی گل نمی‌دهند.
- ۱۰۲- بسیاری از گیاهان در صورتی که به مدت چند ساعت در معرض دماهای پائین، سرما قرار نگیرند، در اوایل بهار موفق به تشکیل گل نخواهند شد.
- ۱۰۳- دمای پائین باعث ورود گیاهان به مرحله موقتی عدم فعالیت در پائیز می‌شود و در زمستان گیاهان غیر فعال هستند که این کار باعث بقای آن‌ها می‌شود.
- ۱۰۴- خفتگی وضعیتی است که که در طی آن، حتی در صورت مناسب بودن شرایط برای رشد گیاه، گیاه یا دانه غیر فعال باقی می‌ماند و نمی‌رویند.
- ۱۰۵- مواد شیمیایی عامل خفتگی، در پاسخ به دماهای پائین، تجهیزه می‌شوند، همچنین شسته شدن بعضی از این مواد راه دیگر برطرف شدن خفتگی دانه‌ها است.
- ۱۰۶- بسیاری از دانه‌ها تا زمانی که به مدت چند هفته در معرض سرما قرار نگیرند از خفتگی بیدار نمی‌شوند و رویش خود را آغاز نمی‌کنند.
- ۱۰۷- دوره‌های خفتگی در بسیاری از گیاهان که زمستان محل زندگی آنها سرد است، مشاهده می‌شود.
- ۱۰۸- خفتگی به گیاهان کمک می‌کند تا با جلوگیری از رشد جوانه‌ها و جوانه زنی دانه‌ها در طول گرمایی موقتی قبل از شروع و خاتمه زمستان به بقای خود ادامه دهنده و از بین نرونده.

نکات فصل 11 .. تولید مثل جانوران

-1 تولید مثل جنسی پدیده ای است که طی آن فرزندان از لقاح دو گامت نر و ماده و سپس تقسیم و رشد و نمو سلول حاصل به وجود می آیند.

-2 اسپرم سلول جنسی نر است که ریز و متحرک است و دارای تازک است.

-3 تخمک سلول جنسی ماده است که درشت و بی تحرک است و ذخایر غذایی فراوانی دارد.

-4 انواع لقاح عبارتند از : 1- لقاح خارجی 2- لقاح داخلی

-5 لقاح خارجی ؛ در این نوع لقاح سلول های جنسی در خارج از بدن جانور با هم ادغام می شوند.

-6 این لقاح در بسیاری از بی مهرگان آبزی .. ماهی ها و دوزیستان وجود دارد.

-7 در لقاح خارجی :

a. تعداد سلول های جنسی که آزاد می شود باید بسیار زیاد باشد تا احتمال برخورد و لقاح زیادتر شود.

b. آزاد سازی سلول های جنسی باید همزمان صورت گیرد تا هم احتمال لقاح افزایش یابد هم سن تخمک که خیلی مهم است زیاد نشود.

برای آزاد سازی همزمان ، معمولاً طول شبانه روز مؤثر است.

d. تخمک ها در این جانوران دیواره چسبناک ژله ای و محکمی دراد تا هم اسپرم ها به آن بچسبند و هم تخمک و سپس جنین محافظت شوند.

-8 در لقاح داخلی :

a. در این نوع لقاح گامت نر وارد دستگاه تولید مثلی جانور ماده شده و در آنجا با گامت ماده لقاح می یابد.

b. در این جانوران ، تقدیه و حفاظت جنین بر عهده جنس ماده است.

c. این نوع لقاح در جانوران خشکی زی و برخی جانوران آبزی مثل سخت پوستان دریایی و یک نوع کوسه انجام می شود.

d. این نوع لقاح نیازمند اندام های تخصص یافته است مثل آلت های تناسلی ، محل هایی جهت ذخیره و نگهداری اسپرم و مکانی مناسب و مساعد برای نگهداری جنین.

پس از لقاح (تخم و جنین)

-9 تعذیبه جنینی تا چند روز پس از تشکیل سلول تخم بر عهده اندوخته غذایی تخمک است.

-10 این اندوخته غذایی ، مخلوطی از چربی و پروتئین است و مقدار آن بسته به اندازه تخمک است.

-11 این اندوخته غذایی در پرندگان بسیار زیاد و در پستانداران بسیار کم است.

-12 خزندگان و پرندگان پس از لقاح تخم گذاری می کنند.

-13 تخم خزندگان پوسته حفاظتی ضخیمی دارد.

-14 تخم پرندگان دارای پوسته آهکی ضخیم است و پرندگان پس از تخم گذاری بر روی تخم ها می نشینند .

- تئیه و تنظیم : محمد همدانی (دیبر برتر کنکور ، تقویتی و المپیاد زیست‌شناسی ۰۹۱۲ ۱۳۴ ۷۰۱۶)
- ۱۵- پلاتی پوس پستاندار تخم گذاری است که مدت کوتاهی روی تخم‌ها می‌نشیند و پس از تولد جنین از غده‌های شیری ابتدایی که درسینه دارد به نوزاد خود شیر می‌دهد.
- ۱۶- پستانداران کیسه‌دار مانند کانگورو و اپاسوم ، به خاطر داشتن رحم ناقص ، نوزاد را نارس به دنیا می‌آورند ، سپس نوزاد درون کیسه‌های روحی شکم مادر قرار می‌گیرد و از غدد شیری موجود در آن تغذیه می‌کند تا کامل شود.
- ۱۷- تولید مثل جنسی پستانداران جفت دار ، کامل ترین نوع تولید مثل جنسی است.
- ۱۸- این گروه رحم کاملی دارند و جنبه‌ی از طریق جفت در رحم تغذیه می‌شود و نوزاد رسیده پس از تولد از شیر مادر تغذیه می‌کند.

دستگاه تولید مثلی مرد

- ۱۹- تولید مثل جنسی شامل تولید سلول تخم دیپلوفید از لقادو سلول جنسی هاپلوفید است.
- ۲۰- وظایف دستگاه تولید مثلی مرد عبارتند از :
- .a. تولید سلول‌های جنسی نر (اسپرم).
 - .b. ایجاد محیط مناسب برای نگهداری اسپرم‌ها.
 - .c. انتقال اسپرم‌ها به خارج از بدن .
 - .d. تولید هورمون جنسی مردانه (تستستورون).
- ۲۱- تولید اسپرم و هورمون جنسی نر بر عهده بیضه‌ها است.
- ۲۲- بیضه‌ها در دوره‌ی جنینی درون حفره‌ی شکمی تشکیل می‌شوند و کمی قبل از تولد وارد کیسه‌های بیضه می‌شوند.
- ۲۳- دمای داخل کیسه‌های بیضه ۳ درجه سانتی گراد پائینتر از دمای بدن است که برای اسپرم سازی مناسب است.
- ۲۴- بیضه‌ها از بلوغ تا پایان عمر ، اسپرم تولید می‌کنند که این کار توسط لوله‌های اسپرم ساز در بیضه‌ها صورت می‌گیرد.
- ۲۵- دو هورمون LH ، FSH که از هیپوفیز پیشین ترشح می‌شوند ، اعمال بیضه‌ها را تنظیم می‌کنند.
- ۲۶- هورمون LH ترشح هورمون جنسی تستستورون را تحریک می‌کند.
- ۲۷- هورمون FSH همراه با تستستورون ، تولید اسپرم را در لوله‌های اسپرم ساز تحریک می‌کند.
- ۲۸- تستستورون ، از سلول‌هایی که بینایین لوله‌های اسپرم ساز قرار دارند تولید می‌شود.

بلوغ و ذخیره اسپرم

- ۲۹- اسپرم‌ها پس از تولید ، به لوله‌پر پیچ و خم اپیدیدیم وارد می‌شوند و در آنجا توانایی حرکت کردن را پیدا می‌کنند.
- ۳۰- اپیدیدیم دو نقش دارد : ۱- بلوغ اسپرم‌ها ۲- ذخیره و نگهداری اسپرم‌ها
- ۳۱- اسپرم‌ها پس از خروج از اپیدیدیم وارد مجرای اسپرم بر شده و سپس وارد میزراه شده و از بدن خارج می‌شوند.

- 32 اسپرم بالغ دارای ۳ قسمت است: ۱- سر ۲- قطعه میانی ۳- دم
- 33 درون سر یک هسته و مقدار کمی سیتوپلاسم قرار دارد. همچنین آنزیم‌هایی در سر اسپرم به نفوذ اسپرم به گامت ماده کمک می‌کنند.
- 34 قسمت میانی دارای میتوکندری‌های فراوانی است که انرژی لازم برای حرکت اسپرم را فراهم می‌کنند.
- 35 دم اسپرم تازک نیرومندی است که با حرکت خود (با صرف ATP) اسپرم را به جلو می‌راند.
- 36 ساختار کلی بیضه‌ها شامل: ۱- بیضه‌ها ۲- مجرای اپیدیدیم ۳- میانی اسپرم بر است.

انتقال اسپرم

- 37 سر راه خروج اسپرم ۳ غده برون ریز وجود دارند که عبارتند از: ۱- غده وزیکول سمینال ۲- پروستات ۳- پیازی .. میزراهی
- 38 ترشحات این غدد به: ۱- تغذیه اسپرم‌ها ۲- حرکت اسپرم‌ها کمک می‌کنند.
- 39 غده وزیکول سمینال بین مثانه و راست روده، مایعی سرشار از مواد قندی تولید می‌کند که انرژی لازم برای اسپرم‌ها را فراهم می‌کند.
- 40 غده بروستات در زیر مثانه، مایعی قلیایی دارد که باعث خشی شدن مواد اسیدی موجود در مسیر رسیدن اسپرم به گامت ماده می‌شود.
- 41 غدد پیازی .. میزراهی نیز ترشحات قلیایی دارند که مقدیر کم ادرار اسیدی میزراه را خشی می‌کند.
- 42 در هنگام خروج اسپرم، ماهیچه‌های صاف اطراف میزراه منقبض شده و اسپرم را به جلو می‌رانند.
- 43 اگر تعداد اسپرم‌ها از بیست میلیون در هر میلی لیتر کمتر باشد، فرد مورد نظر عقیم خواهد بود.

دستگاه تولید مثلی زن

- 44 وظایف دستگاه تولید مثلی زن عبارتند از:
- .a. تولید گامت ماده.
 - .b. حفاظت و تغذیه جنین.
- 45 تخدمان‌ها اندام‌های تولید کننده گامت ماده هستند.
- 46 دو تخدمان تخم مرغی شکل، در حفره شکمی پس از بلوغ هر ۲۸ روز یک گامت ماده تولید می‌کنند.
- 47 تخدمان‌ها هنگام تولد مجموعاً حدود ۲ میلیون گامت نابالغ دارند که در مرحله پروفاز میوز ۱ متوقف هستند. پس از بلوغ هر ۲۸ روز یکی از آن‌ها تقسیم را کامل کرده و تبدیل به گامت ماده می‌شود.
- 48 در طول زندگی یک زن تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ گامت بالغ تولید می‌شود.
- 49 گامت ماده بالغ، اووم یا **تخمک** نامیده می‌شود.
- 50 ساختار دستگاه تولید مثلی زن شامل سه بخش است: ۱- تخدمان‌ها ۲- لوله‌های فالوب ۳- رحم

-51 تخمک پس از آزاد شدن ، توسط ماهیچه های صاف دیواره لوله فالوب به سمت رحم حرکت داده می شود.

-52 عبور تخمک از لوله فالوب معمولاً **3 تا 4 روز** طول می کشد.

-53 اگر تخمک پس از 24 تا 48 ساعت بعد از آزاد شدن لقاح نیابد ، توانایی لقاح خود را از دست می دهد و از بین می ورد.

-54 رحم اندامی ماهیچه ای و توخالی و در حالت غیر بارداری به اندازه یک مشت بسته است .

-55 تخدمان ها ، تخمک را طی یک سری وقایع که در کل چرخه تخدمان نامیده می شود ، آماده و رها می کند.

-56 رها شدن یک تخمک از تخدمان ، تخمک گذاری نامیده می شود.

-57 میانگین مدت چرخه تخدمان 28 روز است.

-58 مراحل چرخه تخدمان :

- a. **مرحله فولیکولی** : (فولیکول عبارت از تعدادی سلول سوماتیک (پیکری) است که یک گامت نابالغ را احاطه کرده و تقدیه می کنند)

i. هورمون FSH (هورمون محرک فولیکولی) و هورمون LH (لوتئینی کننده) وارد جریان خون می شوند.

ii. FSH و LH هر دو سبب تولید هورمون استروژن از یکی از فولیکول ها می شوند.

iii. فولیکول در حال رشد به تدریج استروژن بیشتری تولید می کند که باعث رشد بیشتر فولیکول می شود.

iv. افزایش استروژن باعث افزایش ترشح LH از **هیپوفیز پیشین** میشود.

v. حداقل LH سبب تکمیل اولین تقسیم میوزی شده و در نهایت فولیکول و تخدمان پاره شده و تخمک آزاد می شود.

b. **مرحله لوتئال** :

i. بعد از تخمک گذاری ، LH سبب رشد سلول های فولیکول پاره شده و تبدیل آن به توده ای به نام **جسم زرد** می شود.

ii. جسم زرد تولید هورمون استروژن و هورمون دیگری به نام پروژسترون می کند که طی **تنظیمی منفی**

ترشح LH و FSH را مهار می کندا چرخه بعدی تخدمان شروع شود.

iii. اگر لقاح صورت گیرد ، جسم زرد تا چند هفتگه دیگر نیز **پروژسترون** تولید خواهد کرد در غیر اینصورت جسم زرد از بین رفته و پروژسترون کاهش یافته و سرانجام تولید آن متوقف میشود که به معنی پایان چرخه جنسی است.

-59 داروهایی که مقادیر زیادی از هورمون استروژن و شبه پروژسترون دارند ، چرخه جنسی را به هم زده و جلو تخمک گذاری را می گیرند.

چرخهء قاعدگی

- 60- تغییرات مداومی که در هر 28 روز ، رحم را برای یک حاملگی احتمالی آماده می کند ، **چرخهء قاعدگی** نامیده می شود که :

.a. در دورهء فولیکولی افزایش ترشح استروژن باعث ضخیم شده دیوارهء رحم و پر خون شدن آن می شود.

.b. بعد از تخمک گذاری (در دورهء لوتال) مقادیر بالای استروژن و پروژسترون سبب ضخیم شدن بیشتر و حفظ دیوارهء رحم می شود.

.c. اگر حاملگی رخ ندهد ، مقادیر استروژن و پروژسترون کاهش یافته و سبب تخریب و ریزش دیوارهء رحم می شود.

- 61- انتهای چرخهء قاعدگی با انتهای مرحلهء لوتال همزمان است.

- 62- تخریب و ریزش دیوارهء رحم که به همراه دفع خون از بدن است ، **قاععدگی** نامیده می شود.

- 63- در انتهای چرخهء جنسی و قاعدگی هیچ یک از هورمون های استروژن و پروژسترون تولید نمی شوند و در نتیجه غده هیپوفیز مجدداً شروع به تولید FSH و LH می کند.

نمود

- 64- برای لقاح یک تخمک ، سلول اسپرم باید به سمت یکی از لوله های فالوپ حرکت کند و نخست با آزاد کردن آنزیم های نوک خود ، به درون تخمک نفوذ کند.

- 65- سلول تخم در حین حرکت در لولهء فالوپ تقسیم هایی انجام می دهد و هنگامی که این تودهء سلولی به لولهء فالوپ می رسد ، به شکل یک توب توخالی درآمده است که **بلاستوسیست** نامیده می شود.

- 66- حدود 6 روز بعد از لقاح ، بلاستوسیست به جدارهء رحم متصل می شود که به این عمل **جایگزینی** می گویند.

- 67- رحم در طول دورهء نمو ، وظیفهء حفاظت و تغذیهء رویان و جنبی را بر عهده دارد.

- 68- نمو نوزاد انسان در داخل رحم 9 ماه طول می کشد که به این دوران ، دوران بارداری یا **حاملگی** گفته می شود.

- 69- نه ماه حاملگی را معمولاً به سه دورهء سه ماهه تقسیم می کنند.

- 70- در هشت هفتهء اول حاملگی ، تودهء در حال رشد و نمو ، رویان نامیده می شود.

سه ماههء اول

- 71- مهمترین واقعی نمو ، در سه ماههء اول زندگی رخ می دهند.

- 72- در هفتهء دوم بعد از لقاح ، پرده هایی که حفاظت و تقدیمهء رویان را بر عهده دارند ، نمو می کنند.

- 73- یکی از این پرده ها **آمنیون** است که دور رویان کشیده می شود و از آن حفاظت می کند.

- 74- پردهء دیگر **کوریون** است که با تعامل با رحم تشکیل جفت را می دهند.

- 75 جفت ساختاری است که از طریق آن مادر به رویان غذا می‌رساند.
- 76 خون مادر با خون رویان مخلوط نمی‌شود، بلکه مواد غذایی خون مادر، از جفت انتشار پیدا می‌کنند و از طریق رگ‌های خونی بند ناف به رویان میرسند.
- 77 بند ناف دارای دو سرخرگ است که خون تیره را به جفت می‌آورند و دارای یک سیاه‌رگ است که خون روشن را به سمت بدن رویان می‌برد.
- 78 مواد دفعی رویان نیز از جفت عبور کرده و به خون مادر می‌رسند.
- 79 اکثر داروهای مواد آسیب رسان نیز از جفت عبور می‌کنند؛ بنابراین اگر مادر مواد زیان آور مصرف کند، رویان نیز آسیب خواهد دید. زنان باردار باید از مصرف هر گونه دارو در طول دوره بارداری خود داری کنند، مگر با تجویز پزشک.

نمود رویان

- 80 همچنان که جفت تشکیل می‌شود، سلول‌های بلاستوسیست تشکیل سه لایه مقدماتی یعنی آندودرم .. مزودرم و اکتودرم را می‌دهند.
- 81 در انتهای هفته سوم، بعد از تشکیل لایه‌های مقدماتی، رگ‌های خونی و رودها نیز شروع به نمو می‌کنند و طول رویان به ۲ میلی‌متر می‌رسد.
- 82 در هفته چهارم بازوی‌ها و پاها تشکیل می‌شوند و طول رویان به ۵ میلی‌متر می‌رسد.
- 83 در انتهای هفته چهارم همه اندام‌های اصلی شروع به تشکیل شدن می‌کنند و **خریبان قلب آغاز می‌شود**.
- 84 در طی ماه دوم، مرحلهٔ نهایی نمو رویان، بازوی‌ها و پاها شکل می‌گیرند، اندام‌های اصلی مانند کبد و پانکراس مشخص می‌شوند و در انتهای ماه دوم، رویان ۲۲ میلی‌متر طول و ۱ گرم وزن دارد.

نموجنین

- 85 از هفته هشتم حاملگی تا تولد نوزاد، دوران **جنینی** نامیده می‌شود.
- 86 در انتهای ماه سوم، **جنسیت جنین** تعیین شده است.
- 87 در سه ماهه دوم و سوم بارداری جنین به سرعت رشد می‌کند و اندام‌های او شروع به عمل می‌کنند.
- 88 هنگام زایمان دیواره‌های رحم منقبض می‌شوند و جنین را از رحم خارج می‌کنند.
- 89 جفت و بند ناف بعد از تولد نوزاد دفع می‌شوند.
- 90 بعد از تولد، نمو هنوز کامل نیست و رشد و نمو جسمی و عصبی ادامه دارد.

تصویر برداری سونوگرافی

-91 برای ایجاد تصویر سونوگرافی ، متخصص یک میلهء مخصوص را در برابر پوست بیمار می گیرد . این میلهء امواج صوتی که فرکانس بالا دارد ، صادر میکند ، این امواج پس از برخورد به ساختارهای بدن نوزاد بازتاب پیدا می کنند ، این میلهء مخصوص پژواک ها را جدا می کند و آنها را به یک تصویر ویدیویی تبدیل می کند.

-92 استفاده های سونوگرافی عبارتند از :

- i تشخیص حاملگی در هفتهء چهارم پس از لقاح.
 - ii تشخیص سن رویان یا جنین از روی اندازه و ابعاد بدنی.
 - iii تشخیص سلامتی جنین.
 - iv تشخیص حرکات قلب در هفتهء هفتم و پس از آن.
 - v تشخیص جنسیت جنین.
 - vi تشخیص بسیاری از ناهنجاری های جنین.
- 93 بهترین فایده سونوگرافی بی خرر بودن آن است.
- 94 بیماری های مقارتی به بیماری هایی گفته می شود که از راه تماس جنسی انتقال می یابند.