

$$a=5, d=8-5=3, s_n > 500$$

$$s_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d) \Rightarrow \frac{n}{2}(10 + (n-1)3) > 500 \Rightarrow \frac{n}{2}(3n+7) > 500 \quad -1$$

$$\Rightarrow 3n^2 + 7n - 1000 > 0 \Rightarrow \left(n > \frac{-7 + \sqrt{12049}}{6} \text{ or } n < \frac{-7 - \sqrt{12049}}{6} \right) \Rightarrow n \geq 18$$

۲- سمت چپ تساوی مجموع تعداد دوایر قرمز به شکل \square است و سمت راست تساوی مساحت مربع به طول n ، که طبق شکل این دو با هم برابرند.

۳- چون یک میلیارد تن برابر است با 10^{15} گرم بنابراین

$$a=1, q=2, n=64, S_n = a \left(\frac{1-q^n}{1-q} \right) \Rightarrow \left(\frac{1-2^{64}}{1-2} \right) = S_{64}$$

$$\Rightarrow S_{64} = 2^{64} - 1 = 1/84 \times 10^{19} \div 10^{15} = 1/84 \times 10^4 = 18400$$

$$a=1000, q=0.9, n=50 \Rightarrow S_{50} = 1000 \left(\frac{1-0.9^{50}}{1-0.9} \right) \Rightarrow \quad -4$$

$$S_{50} = 10^4 (1-0.9^{50}) = 10^4 (1-0.005) = 10^4 (0.995) = 9950 \Rightarrow$$

$$1-q^n < 1 \Rightarrow S_n < \frac{1000}{1-0.9} = \frac{1000}{0.1} = 10000$$

$$q = \frac{1}{2}, a_n \leq \frac{1}{100} a, a_n = aq^{n-1} = a \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \leq \frac{1}{100} a \Rightarrow 2^{n-1} \geq 100 \geq 2^6 \quad -5$$

$$\Rightarrow n-1 > 6 \Rightarrow n > 7 \Rightarrow n_1 = 8$$

$$p, \frac{1}{2}p, \frac{1}{4}p, \dots \Rightarrow S_n = \frac{p}{1-\frac{1}{2}} = 2p, S, \frac{1}{4}S, \frac{1}{16}S, \dots \Rightarrow S'_n = \frac{S}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}S \quad -6$$

$$p(x) = x^2 + ax + b, \begin{cases} p(1) = 0 \Rightarrow 1^2 + a(1) + b = 0 \Rightarrow a + b = -1 \\ p(2) = 0 \Rightarrow 2^2 + a(2) + b = 0 \Rightarrow 2a + b = -4 \quad (\text{الف}) \end{cases} \quad -1$$

$$\Rightarrow a = -3, b = 2, \Rightarrow p(x) = x^2 - 3x + 2$$

$$\begin{cases} p(0) = 0 \Rightarrow 0^2 + a(0) + b = 0 \Rightarrow b = 0 \\ p(1) = 1 \Rightarrow 1^2 + a(1) + b = 1 \Rightarrow a = 0 \end{cases} \Rightarrow p(x) = x^2 \quad (\text{ب})$$

$$\begin{cases} p(-1) = 2 \Rightarrow (-1)^2 + a(-1) + b = 2 \Rightarrow -a + b = 1 \\ p(2) = -1 \Rightarrow (2)^2 + a(2) + b = -1 \Rightarrow 2a + b = -5 \end{cases} \Rightarrow 2a = -6 \Rightarrow a = -3$$

$$\Rightarrow 2 + b = 1 \Rightarrow b = -1 \Rightarrow p(x) = x^2 - 2x - 1 \quad (\text{ج})$$

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2} \Rightarrow p\left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - m\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4} - \frac{m}{4} + \frac{1}{2} + 4 = 0 \Rightarrow -\frac{m}{4} = -\frac{25}{4} \Rightarrow m = \frac{25}{2} \quad -2$$

$$\begin{cases} x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow p(1) = 4 \Rightarrow 1^2 + a(1)^2 + 1 + b = 4 \Rightarrow a + b = 2 \\ x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow p(-2) = 0 \Rightarrow (-2)^2 + a(-2)^2 + (-2) + b = 0 \Rightarrow 4a + b = 1 \end{cases} \quad -3$$

$$3a = 1 \Rightarrow a = \frac{1}{3}, \frac{1}{3} + b = 2 \Rightarrow b = \frac{5}{3}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \vee x = 3 \Rightarrow p(2) = 0, p(3) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2^2 - 2(2)^2 + m(2) + n = 0 \Rightarrow 2m + n = 8 \\ 3^2 - 2(3)^2 + m(3) + n = 0 \Rightarrow 3m + n = 0 \end{cases} \Rightarrow m = -8, n = 24 \quad -3$$

$$\begin{array}{r}
 x^3 + 2x^2 - 5x - 6 \quad | \quad x - 2 \\
 \underline{\pm x^3 + 2x^2} \\
 3x^2 - 5x \\
 \underline{\pm 4x^2 + 8x} \\
 3x - 6 \\
 \underline{\pm 3x + 6} \\
 0
 \end{array}$$

-۵

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2, \quad f(2) = 2^3 + 2(2)^2 - 5(2) - 6 = 8 + 8 - 10 - 6 = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = (x - 2)(x^2 + 4x + 3) = (x - 2)(x + 1)(x + 3) = 0$$

$$\Rightarrow x = 2 \text{ or } x = -1 \text{ or } x = -3$$

$$x = 2, \quad p(2) = 0 \Rightarrow 2^3 - 2(2)^2 + a(2) + 2 = 0 \Rightarrow 2a = -2 \Rightarrow a = -1$$

$$\Rightarrow p(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = x^2(x - 2) - (x - 2) = (x^2 - 1)(x - 2)$$

$$\Rightarrow p(x) = (x - 1)(x + 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ or } x = -1 \text{ or } x = 2$$

-۶

الف) $(1 - x)^5 = (1)^5 - 5(1)^4(x) + 10(1)^3(x)^2 - 10(1)^2(x)^3 + 5(1)(x)^4 - (x)^5 = 1 - 5x + 10x^2 - 10x^3 + 5x^4 - x^5$

ب) $(1 + \frac{2}{x})^6 = (1)^6 + 6(1)^5(\frac{2}{x}) + 15(1)^4(\frac{2}{x})^2 + 20(1)^3(\frac{2}{x})^3 + 15(1)^2(\frac{2}{x})^4 + 6(1)(\frac{2}{x})^5 + (\frac{2}{x})^6 = 1 + \frac{12}{x} + \frac{60}{x^2} + \frac{160}{x^3} + \frac{240}{x^4} + \frac{192}{x^5} + \frac{64}{x^6}$

ج) $(2x - 3y)^4 = (2x)^4 - 4(2x)^3(3y) + 6(2x)^2(3y)^2 - 4(2x)(3y)^3 + (3y)^4 = 16x^4 - 96x^3y + 216x^2y^2 - 216xy^3 + 81y^4$

-۷

$$A = x^9 - x^3 y^3 = x^3 (x^6 - y^3) = x^3 (x^2 - y)(x^4 + x^2 y + y^2)$$

$$B = (a^6 + 1)^2 - (a^6 - 1)^2 = (a^6 + 1 - a^6 + 1)(a^6 + 1 + a^6 - 1) = 2a^6 (2) = 4a^6 \quad - ۸$$

۹ - استقرا بر روی توان دو جمله ای .

$$k=1 \Rightarrow 1-x^2 = (1+x)(1-x) \quad \checkmark$$

$$\text{فرض } P(k) : 1-x^{2k} = (1+x)(1-x+\dots-x^{2k-1})$$

$$\text{مکمل } P(k+1) : 1-x^{2k+2} = (1+x)(1-x+\dots-x^{2k+1})$$

$$(1+x)(1-x+\dots-x^{2k-1} + x^{2k} - x^{2k+1}) =$$

$$\text{(اثبات)} \quad (1+x)(1-x+\dots-x^{2k-1}) + (1+x)(x^{2k} - x^{2k+1}) =$$

$$(1-x^{2k}) + (x^{2k} - x^{2k+1} + x^{2k+1} - x^{2k+2}) = 1-x^{2k+2}$$

۱- ک م م سه عدد ۱۸ و ۲۴ و ۳۲ برابر است

$$\begin{cases} 18 = 2 \times 3^2 \\ 24 = 2^3 \times 3 \\ 32 = 2^5 \end{cases} \quad 288 = 2^5 \times 3^2$$

۲-

$$\begin{cases} 1, 5, 9, \dots \Rightarrow a_n = 1 + (n-1)4 = 4n - 3 \\ 4, 7, 10, \dots \Rightarrow a_m = 4 + (m-1)3 = 3m + 1 \end{cases} \Rightarrow 3m + 1 = 4n - 3$$

$$\Rightarrow 3m = 4n - 4 = 4(n-1) \Rightarrow \begin{cases} m = 4k \\ n-1 = 3k \Rightarrow n = 3k + 1 \end{cases} \Rightarrow a_n = a_m = 12k + 1$$

$$100 < 12k + 1 < 999 \Rightarrow 99 < 12k < 998 \Rightarrow \frac{99}{12} < k < \frac{998}{12}$$

$$8 \frac{1}{4} < k < 83 \frac{1}{3} \Rightarrow 9 \leq k \leq 83 \Rightarrow \text{تعداد} = 83 - 9 + 1 = 75$$

۷۵ جمله وجود دارد.

۳- ب م م سه عدد ۷۲، ۴۰، ۴۸ برابر است با ۸ که حداکثر حجم شیشه است و پس تعداد ۲۰ بطری ۸ لیتری لازم است.

$$\begin{cases} 72 = 2^3 \times 3^2 \\ 40 = 2^3 \times 5 \\ 48 = 2^4 \times 3 \end{cases} \quad \frac{(48 + 40 + 72)}{8} = 20$$

۴-

$$\text{الف) } \frac{(x-1)(x-4)}{x(x-4)} \times \frac{x^2(x+2)}{(x+2)(x-1)} = x$$

ب) $\frac{(x-3)(x+1)}{(x-3)(x+3)} \times \frac{(x-3)(x-7)}{(x-7)(x+1)} = \frac{x-3}{x+3}$

ج) $\frac{1}{(a-1)(a+1)} + \frac{2a}{(a+1)^2} - \frac{2}{a+1} = \frac{1(a+1) + 2a(a-1) - 2(a-1)(a+1)}{(a-1)(a+1)^2}$

$$= \frac{a+1 + 2a^2 - 2a - 2a^2 + 2}{(a-1)(a+1)^2} = \frac{-a+3}{(a-1)(a+1)^2}$$

د) $\frac{x+1}{x-1} + \frac{1}{x+3} - \frac{8}{(x+3)(x-1)} = \frac{(x+1)(x+3) + 1(x-1) - 8}{(x+3)(x-1)} =$

$$\frac{x^2 + 4x + 3 + x - 1 - 8}{(x+3)(x-1)} = \frac{x^2 + 5x - 6}{(x+3)(x-1)} = \frac{(x+6)(x-1)}{(x+3)(x-1)} = \frac{x+6}{x+3}$$

$$\alpha = \beta + 2, \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = 4, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{m}{2} \quad -1$$

$$\Rightarrow \beta + 2 + \beta = 4 \Rightarrow 2\beta = 2 \Rightarrow \beta = 1, \quad \alpha = 1 + 2 = 3 \Rightarrow 2 \times 1 = \frac{m}{2} \Rightarrow m = 6$$

$$2x^2 - 8x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-3) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ or } x = 3$$

$$\text{الف) } f(x) = 0 \Rightarrow x(x^2 - 4) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ یا } x = \pm 2 \quad -2$$

$$\text{ب) } q(x) = 0 \Rightarrow \left(x + \frac{1}{x} \right) \left(x + \frac{1}{x} + 1 \right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x + \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x^2 + 1 = 0 \\ x + \frac{1}{x} = -1 \Rightarrow x^2 + x + 1 = 0 \end{cases}$$

که در هر دو معادله جواب وجود ندارد. (چون $\Delta < 0$)

$$\text{الف) } x(2x^2 + x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ یا } 2x^2 + x + 3 = 0 \quad -3$$

معادله دوم جواب ندارد چون $\Delta = -23 < 0$ پس تنها جواب $x = 0$ است.

$$\text{ب) } 9x^2 - 22 + 148 - 4x^2 = 24 \Rightarrow 5x^2 = 125 \Rightarrow x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$$

$$\begin{cases} \text{الف) } \alpha + \beta = \frac{1}{5} + \frac{4}{5} = 1 \\ \alpha\beta = \frac{1}{5} \times \frac{4}{5} = \frac{4}{25} \end{cases} \Rightarrow x^2 - 1x + \frac{4}{25} = 0 \Rightarrow 25x^2 - 25x + 4 = 0 \quad -4$$

$$\text{ب) } \begin{cases} \alpha + \beta = 1 + \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3} = 2 \\ \alpha\beta = (1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = 1 - 3 = -2 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 2x - 2 = 0$$

$$f(x) = 9x^2 + 6x + 3, \quad a = 9 > 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{2a} = -\frac{6}{18} = -\frac{1}{3} \quad -5$$

$$\Rightarrow y_{\min} = 9\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 6\left(-\frac{1}{3}\right) + 3 = 1 - 2 + 3 = 2$$

$$f(x) = 4 + 8x - x^2, \quad a = -1 < 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{2a} = \frac{-8}{-2} = 4$$

$$\Rightarrow y_{\max} = 4 + 8(4) - 4^2 = 20$$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = \frac{\Delta}{4} \\ \alpha\beta = \frac{c}{a} = -\frac{\Delta}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\beta + \alpha}{\alpha\beta} = \frac{\frac{\Delta}{4}}{-\frac{\Delta}{4}} = -1 \\ \frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{-\frac{\Delta}{4}} = -\frac{4}{\Delta} \end{cases} \quad -6$$

$$\Rightarrow x^2 + x - \frac{4}{\Delta} = 0 \Rightarrow \Delta x^2 + \Delta x - 4 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 49 + 100 = 149 > 0 \quad -7$$

$$S = -\frac{b}{a} = \frac{7}{5} > 0, \quad P = \frac{c}{a} = \frac{-5}{5} = -1 < 0$$

معادله دارای دو ریشه مختلف علامه است که عدد مثبت از نظر قدر مطلق از دیگری بزرگتر است.

$$\begin{aligned} \text{سن فعلی} = x, \quad (x+21) &= (x-21)^2 \Rightarrow x^2 - 42x + 441 = x + 21 \quad -8 \\ \Rightarrow x^2 - 43x + 420 &= 0 \Rightarrow x = 15 \quad \text{یا} \quad x = 28 \leftarrow \text{سن معلم} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{x}{3} + 1\right)\left(\frac{x}{4} + 1\right) = 20 \Rightarrow (x+3)(x+4) = 240 \Rightarrow x+3 = 15 \Rightarrow x = 12 \quad -9$$

$$\begin{cases} x = y + 1 \\ xy - 40 = 39y + 22 \end{cases} \Rightarrow (y+1)y - 40 = 39y + 22 \Rightarrow y^2 + 1 \cdot y - 40 = 39y + 22 \quad -1$$

$$\Rightarrow y^2 - 39y - 62 = 0 \Rightarrow (y-41)(y+2) = 0 \Rightarrow y = 41, x = 41 + 1 = 42$$

$$\text{الف) } (x^2 - 2)(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \\ x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1 \end{cases} \quad -11$$

$$\text{ب) } \left(\frac{x^2}{3} - 2 - 6\right)\left(\frac{x^2}{3} - 2 - 1\right) = 0 \Rightarrow x^2 = 24 \quad x^2 = 9 \Rightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{24} = \pm 2\sqrt{6} \\ x = \pm\sqrt{9} = \pm 3 \end{cases}$$

$$\text{ج) } (4 - x^2 - 5)(4 - x^2 + 2) = 0 \Rightarrow (-x^2 - 1)(7 - x^2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x^2 = -1 \quad \times \\ x^2 = 7 \Rightarrow x = \pm\sqrt{7} \end{cases}$$

$$f(x) = x + \frac{2}{x} = \frac{x^2 + 2}{x} = \frac{x^2 - 2\sqrt{2}x + 2 + 2\sqrt{2}}{x} = \frac{(x - \sqrt{2})^2}{x} + \frac{2\sqrt{2}}{x} \quad -12$$

به ازای مقادیر مثبت x کمترین مقدار $\frac{(x - \sqrt{2})^2}{x}$ برابر صفر است که از $x = \sqrt{2}$ حاصل می شود.

$$y_{\min} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 2 \quad \text{در این صورت}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} P(-2) = -2 \Rightarrow a(-2)^2 + b(-2) + c = -2 \Rightarrow 4a - 2b + c = -2 \\ P(0) = 0 \Rightarrow a(0)^2 + b(0) + c = 0 \Rightarrow c = 0 \\ P(4) = 0 \Rightarrow a(4)^2 + b(4) + c = 0 \Rightarrow 4a + b = 0 \end{array} \right. \quad -۱۳$$

$$\begin{array}{c|ccc} x & & 0 & 4 \\ \hline P(x) & - & 0 & + & 0 & - \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2a - b = -1 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = -\frac{1}{6}, b = \frac{2}{3} \Rightarrow$$

$$\text{ب) } \left\{ \begin{array}{l} P(0) = 2 \Rightarrow a(0)^2 + b(0) + c = 2 \Rightarrow c = 2 \\ x_{min} = -\frac{b}{2a} = -4 \Rightarrow b = 8a \\ P(-4) = -2 \Rightarrow a(-4)^2 + b(-4) + 2 = -2 \Rightarrow 16a - 4b = -5 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \begin{cases} b = 8a \\ 16a - 4b = -5 \end{cases} \Rightarrow 16a - 32a = -5 \Rightarrow a = \frac{5}{16}, b = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow P(x) = \frac{5}{16}x^2 + \frac{5}{2}x + 2 = 0 \Rightarrow 5x^2 + 40x + 48 = 0 \Rightarrow x = \frac{-20 \pm 4\sqrt{10}}{5}$$

مقدار $P(x)$ منفی و در فارج این بازه مثبت است $\frac{-20 - 4\sqrt{10}}{5} < x < \frac{-20 + 4\sqrt{10}}{5}$ اگر

در $x = \frac{-20 \pm 4\sqrt{10}}{5}$ برابر صفر است.

$$\text{ج) } \left\{ \begin{array}{l} P(0) = 0 \Rightarrow a(0)^2 + b(0) + c = 0 \Rightarrow c = 0 \\ x = -\frac{b}{2a} = 0 \Rightarrow b = 0 \\ P(1) = 1 \Rightarrow a(1)^2 + b(1) + c = 1 \Rightarrow a + b = 1 \Rightarrow a = 1 \end{array} \right.$$

پس $P(x) = x^2$ که در $x = 0$ برابر صفر و در $x \neq 0$ مثبت است.

۱۴ - طول x و عرض y

$$\begin{cases} 2(x+y)=18 \Rightarrow x+y=9 \Rightarrow y=9-x \end{cases}$$

$$\begin{cases} xy=14 \Rightarrow x(9-x)=14 \Rightarrow x^2-9x+14=0 \Rightarrow (x-2)(x-7)=0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=2 \Rightarrow y=9-2=7 \\ x=7 \Rightarrow y=9-7=2 \end{cases}$$

۱- ک.م.م $p(p+1) =$

$$\frac{6}{p} = 2 + \frac{p}{p+1} \Rightarrow 6(p+1) = 2p(p+1) + p(p) \Rightarrow 2p^2 - 4p - 6 = 0$$

چون فقط $p = -1$ ، $p = 0$ مخرج را صفر می کنند پس q ق $p = \frac{2 \pm \sqrt{4+18}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{22}}{2}$

۲- ک.م.م $k(2-k) =$

$$k(k) + 2(2-k) = 5k(2-k) \Rightarrow k^2 + 4 - 2k = 10k - 5k^2 \Rightarrow$$

$$6k^2 - 12k + 4 = 0 \Rightarrow 3k^2 - 6k + 2 = 0 \Rightarrow k = \frac{2 \pm \sqrt{9-6}}{3} = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{3}$$

چون فقط $k = 2$ ، $k = 0$ مخرج را صفر میکنند دو جواب قابل قبولند.

۳- ک.م.م $(2k-1)^2 =$

$$2(2k-1)^2 + 5(2k-1) = -2 \Rightarrow 18k^2 - 12k + 2 + 10k - 5 = -2 \Rightarrow$$

$$18k^2 + 2k - 1 = 0 \Rightarrow k = \frac{-2 \pm \sqrt{41}}{36} \Rightarrow \begin{cases} k = \frac{1}{6} \\ k = -\frac{1}{3} \end{cases}$$

چون فقط $k = \frac{1}{6}$ مخرج کسر را صفر می کند، دو جواب قابل قبولند.

۴- ک.م.م $y^2 + 5y = y(y+5) =$

$$2y + 5 + y(y+4) = (y+1)(y+5) \Rightarrow 2y + 5 + y^2 + 4y = y^2 + 6y + 5 \Rightarrow y = 0$$

چون $y = -5$ ، $y = 0$ مخرج کسر را صفر می کنند پس جواب به دست آمده قابل قبول نیست

و معادله جواب ندارد.

$$5 - \text{ک.م.م} \quad m(m+2)(m-2) = m(m^2-4) = \text{ک.م.م}$$

$$3m(m-2) + 2(m^2-4) = (4m-4)m \Rightarrow 3m^2 - 6m + 2m^2 - 8 = 4m^2 - 4m$$

$$m^2 - 2m - 8 = 0 \Rightarrow (m-4)(m+2) = 0 \Rightarrow m = 4 \text{ or } m = -2$$

چون $m = \pm 2$ ، $m = 0$ ، مفرج را صفر می کنند تنها جواب $m = 4$ قابل قبول است.

$$6 - \text{ک.م.م} \quad x^2 - 9 = (x+3)(x-3) = \text{ک.م.م}$$

$$2(x+3) - 2(x-3) = 12(1) \Rightarrow -x + 15 = 12 \Rightarrow x = 3$$

چون $x = \pm 3$ جوابهای مفرزند بنابراین تنها جواب به دست آمده قابل قبول نیست.

7 - چون $x = -3$ جواب مفرج است بنابراین مجموعه جواب برابر $R - \{-3\}$ است.

8 - تعداد اسباب بازی و x قیمت قبل از تخفیف

$$\begin{cases} nx = 12000 \\ (n+4)(x-100) = 12000 \end{cases} \Rightarrow nx + 4x - 100n - 400 = 12000 \Rightarrow$$

$$12000 + 4x - 100n - 400 = 12000 \Rightarrow 4x - 100n = 400 \Rightarrow x = 25n + 100, \quad nx = 12000$$

$$\Rightarrow n(25n + 100) = 12000 \Rightarrow n(n+4) = 480 \Rightarrow n^2 + 4n - 480 = 0 \Rightarrow n = \frac{-2 \pm \sqrt{484}}{1}$$

$$\Rightarrow n = -2 \pm 22 \Rightarrow n = 20 \text{ or } n = -24$$

چون n تعداد اسباب بازی است پس $n = -24$ قابل قبول نیست پس $x = \frac{12000}{20} = 600$.

$$\sqrt{1-x^2} = x \Rightarrow 1-x^2 = x^2 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

۱- الف)

$$\sqrt{1-\left(\pm \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{1-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} = 1-x \Rightarrow \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} = (1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x}) \Rightarrow \begin{cases} 1-\sqrt{x} = 0 \Rightarrow x=1 \\ \text{or} \\ (1+\sqrt{x})^2 = 1 \Rightarrow x=0 \end{cases}$$

ب)

$$\begin{cases} x=1 \Rightarrow \frac{1-\sqrt{1}}{1+\sqrt{1}} = 0 = 1-1 \\ x=0 \Rightarrow \frac{1-\sqrt{0}}{1+\sqrt{0}} = 1 = 1-0 \end{cases}$$

ج) راه حل اول: $(2+\sqrt{1+x})^2 = (\sqrt{x})^2 \Rightarrow 5+x+4\sqrt{1+x} = x \Rightarrow \sqrt{1+x} = -\frac{5}{4}$

راه حل دوم: چون باید $x > 0$ باید $\sqrt{1+x} > \sqrt{x}$ بنابراین $2+\sqrt{1+x} > \sqrt{x}$ پس معادله دارای جواب نیست.

۲- عبارت صفر نمی شود $\sqrt{1-x} \geq 0, \sqrt{2-x} \geq 0, 3 > 0 \Rightarrow f(x) = \sqrt{1-x} + \sqrt{2-x} + 3 > 0$

الف) $V = \sqrt{\frac{2k}{m}} \Rightarrow V^2 = \frac{2k}{m} \Rightarrow k = \frac{mV^2}{2}$


۳-

ب) $F = \frac{1}{2\pi} \sqrt{LC} \Rightarrow F^2 = \frac{1}{4\pi^2} (LC) \Rightarrow L = \frac{4\pi^2 F^2}{C}$

ج) $I = \frac{nE}{R+nr} \Rightarrow IR = nE - nlr = n(E - lr) \Rightarrow n = \frac{IR}{E - lr}$

د) $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow T_1 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 V_2}$

ه) $A = p(1+i)^2 \Rightarrow (1+i)^2 = \frac{A}{p} \Rightarrow 1+i = \pm \sqrt{\frac{A}{p}} \Rightarrow i = \pm \sqrt{\frac{A}{p}} - 1$



الف) هندسی :

$$y = \sqrt{x-1} \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & 1 & 2 & 5 \\ \hline y & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

$$y = x-3 \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & 2 & 3 & 5 \\ \hline y & -1 & 0 & 2 \end{array}$$


تنها جواب $x=5$ است.

$$x-1 = (x-3)^2 \Rightarrow x^2 - 7x + 10 = 0 \Rightarrow x=2 \text{ or } x=5$$

جبری :

$$x=2 \Rightarrow \sqrt{2-1} \stackrel{?}{=} 2-3 \quad x=5 \Rightarrow \sqrt{5-1} \stackrel{?}{=} 5-3$$

فقط تساوی دوم درست است پس تنها $x=5$ قابل قبول است.



ب) هندسی : نمودار $y = \frac{2x-1}{x}$ در دو سمت خط $x=0$ دارای دو شاخه است.

$$y = \frac{2x-1}{x} \Rightarrow \begin{array}{c|ccccccc} x & -2 & -1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \hline y & \frac{5}{2} & 3 & 4 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{array}$$


$$y = 5-x \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & 5 & 0 & 2 \\ \hline y & 0 & 5 & 3 \end{array}$$

با توجه به نمودار $x = \frac{2}{5}$, $x = -\frac{1}{25}$ دو جواب تقریبی اند.

$$\frac{2x-1}{x} = 5-x \Rightarrow x^2 - 3x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$$

جبری :

$x=0$ مخرج کسر را صفر میکند پس هر دو جواب به دست آمده قابل قبولند.




$$y = 2^x \Rightarrow \begin{array}{c|cccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \hline y & 1 & 2 & 4 & 8 \end{array}$$

$$y = x^2 \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 1 & 0 & 1 & 4 \end{array}$$

ج) هندسی :

با توجه به نمودار $x = -\frac{1}{25}$, $x = 2$ دو جواب تقریبی اند.

جبری :



$$\sqrt{x} + 2x = x^2 + 2 \Rightarrow \sqrt{x} - 1 = (x-1)^2$$


$$y = \sqrt{x} - 1 \Rightarrow \begin{array}{r|l} x & 0 \quad 1 \quad 4 \quad 9 \\ y & -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \end{array}$$

(د) هندسی :

$$y = (x-1)^2 \Rightarrow \begin{array}{r|l} x & 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\ y & 1 \quad 0 \quad 1 \quad 4 \end{array}$$

با توجه به شکل دو جواب $x = 1$, $x = 1/4$ وجود دارد.

چیزی x :



$$y = x^3 \Rightarrow \begin{array}{r|l} x & -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \\ y & -1 \quad 0 \quad 1 \quad 8 \end{array}$$

-۲

$$y = -3x + 5 \Rightarrow \begin{array}{r|l} x & 0 \quad 1 \quad 1/5 \quad 2 \\ y & 5 \quad 2 \quad 0/5 \quad -1 \end{array}$$

طول محل برخورد نمودار آبی و سیاه تقریباً $x = 0/5$ است.

$$(-a)^2 = (a)^2 = a^2 \Rightarrow \sqrt{(-a)^2} = \sqrt{(a)^2} \Rightarrow |-a| = |a|$$

$$|a|^2 = |a| \times |a| = a \times a = a^2 = a^2 \quad (a^2 \geq 0)$$

-۱

-۲

$$\left. \begin{array}{l} -|a| \leq a \leq |a| \\ -|b| \leq b \leq |b| \end{array} \right\} \Rightarrow -(|a| + |b|) = -|a| - |b| \leq a + b \leq |a| + |b| \Rightarrow |a + b| \leq |a| + |b|$$

$$|y| \leq |x + y - x| \leq |x| + |y - x| \Rightarrow |y| \leq |x| + |y - x| \Rightarrow |y| - |x| \leq |y - x|$$

-۳

$$|a| > |c| \Rightarrow a^2 > c^2 \Rightarrow a^2 - c^2 = (a - c)(a + c) > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - c > 0, a + c > 0 \Rightarrow a > c, a > -c \Rightarrow a > c \\ \text{or} \\ a - c < 0, a + c < 0 \Rightarrow a < c, a < -c \Rightarrow a < -c \end{cases}$$

-۴

توضیح: برای برقراری شرط $a > -c$ ، $a > c$ با توجه به آنکه c مثبت است کافیست $a > c$.

$$\text{الف) } f(x) = x|x| = \begin{cases} x(x) = x^2 & x \geq 0 \\ x(-x) = -x^2 & x < 0 \end{cases}$$

-۵

$$\text{ب) } f(x) = \begin{cases} x + 1 - 2 = x - 1 & x \geq 0 \\ -x - 1 - 2 = -x - 3 & x < 0 \end{cases}$$

$$\text{ج) } x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1, \quad x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$\begin{cases} x < -2 \Rightarrow y = -(x - 1 + x + 2) = -2x - 1 \\ -2 \leq x \leq 1 \Rightarrow y = -x + 1 + x + 2 = 3 \\ x > 1 \Rightarrow y = x - 1 + x + 2 = 2x + 1 \end{cases} \Rightarrow y = \begin{cases} -2x - 1 & x < -2 \\ 3 & -2 \leq x \leq 1 \\ 2x + 1 & x > 1 \end{cases}$$


x	-2	1	
$x - 1$	$-$	$-$	$+$
$x + 2$	$-$	$+$	$+$

الف) $|2t-1|=3 \Rightarrow 2t-1=\pm 3 \Rightarrow t=2 \text{ or } t=-1$ -۱


ب) $|y^2-2|=7 \Rightarrow y^2-2=\pm 7 \Rightarrow \begin{cases} y^2=9 \Rightarrow y=\pm 3 \\ y^2=-5 \quad \times \end{cases}$

ج) $|2x-2|=-(2x-2) \Rightarrow 2x-2 \leq 0 \Rightarrow x \leq \frac{2}{2}$


الف) $2x-4=0 \Rightarrow x=2 \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & 1 & 2 & 3 \\ \hline y & 2 & 0 & 2 \end{array} \Rightarrow$



ببری $|2x-4|=3 \Rightarrow 2x-4=\pm 3 \Rightarrow x=\frac{7}{2} \text{ or } x=\frac{1}{2}$




ب) $y=|x|+|1-x| = \begin{cases} -x+1-x=1-2x & x < 0 \\ x+1-x=1 & 0 \leq x \leq 1 \\ x-1+x=2x-1 & x > 1 \end{cases}$




ببری $|x|+|1-x|=3 \Rightarrow \begin{cases} 1-2x=3 \text{ (if } x < 0) \Rightarrow x=-1 \\ 1=3 \text{ (if } 0 \leq x \leq 1) \\ 2x-1=3 \text{ (if } x > 1) \Rightarrow x=2 \end{cases}$

پس جوابهای معادله $x=-1, x=2$ است




ج) $y = x + \frac{x}{|x|} = \begin{cases} x+1 & x > 0 \\ x-1 & x < 0 \end{cases}$



پس $y = 3 \Rightarrow \begin{cases} x+1=3 \Rightarrow x=2 \text{ (if } x > 0) \\ x-1=3 \Rightarrow x=4 \text{ (if } x < 0) \end{cases}$

پس تنها جواب قابل قبول $x = 2$ است.



$$1) x(x^2 - 2x + 1) \geq 0 \Rightarrow x(x-1)^2 \geq 0.$$

ولی $(x-1)^2 \geq 0$ همواره برقرار است پس باید $x \geq 0$.

$$2) \frac{2x-1}{x} - 1 > 0 \Rightarrow \frac{x-1}{x} > 0.$$

ریشه های صورت و مخرج $x=1$ و $x=0$ هستند پس باید $x < 0$ یا $x > 1$.

$$3) \frac{x+1}{x} - \frac{x}{x-1} - \frac{2}{1} \leq 0 \Rightarrow \frac{(x+1)(x-1) - x(x) - 2x(x-1)}{x(x-1)} \leq 0 \Rightarrow$$


$$\frac{x^2 - 1 - x^2 - 2x^2 + 2x}{x(x-1)} \leq 0 \Rightarrow \frac{-2x^2 + 2x - 1}{x(x-1)} \leq 0.$$

برای صورت کسر افیبر $\Delta = 2^2 - 4(-2 \times (-1)) = 4 - 8 = -4 < 0$.
هم علامت a یعنی منفی است. پس مخرج باید مثبت باشد یعنی $x > 1$ or $x < 0$.

$$4) |x-2| \leq x \Rightarrow x \geq 0, (x-2)^2 \leq x^2 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 \leq x^2 \Rightarrow x \geq 1$$


اشتراک دو شرط $(x \geq 1, x \geq 0)$ برابر $x \geq 1$ است.

5) آن قسمت از نمودار $y = x^2$ که زیر نمودار $y = 2^x$ است را می یابیم. $-0.75 \leq x \leq 2$ or $x \geq 4$.



$$۶) \quad y = \sqrt{x-1} \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & ۱ & ۲ & ۵ \\ \hline y & ۰ & ۱ & ۲ \end{array} \quad \text{و} \quad y = |x-1| \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & ۰ & ۱ & ۲ \\ \hline y & ۱ & ۰ & ۱ \end{array}$$


مجموعه جواب برابر $x \geq 2$ است.



$$۷) \quad y = \frac{1}{x} \Rightarrow \begin{array}{c|cccc} x & -۱ & -۰/۵ & ۰/۵ & ۱ \\ \hline y & -۱ & -۲ & ۲ & ۱ \end{array} \quad \text{و} \quad y = \sqrt{x} \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & ۰ & ۱ & ۴ \\ \hline y & ۰ & ۱ & ۲ \end{array}$$

با توجه به شکل برای $x > 1$ نمودار $y = \frac{1}{x}$ زیر نمودار

$y = \sqrt{x}$ قرار دارد.




$$x+1 < |x| \Rightarrow (x+1)^2 < x^2 \Rightarrow$$

۱)

$$x^2 + 2x + 1 < x^2 \Rightarrow x < -\frac{1}{2}$$

$$y = x+1 \Rightarrow \begin{array}{c|cc} x & ۰ & ۱ \\ \hline y & ۱ & ۲ \end{array}$$

$$, y = |x| \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & -۱ & ۰ & ۱ \\ \hline y & ۱ & ۰ & ۱ \end{array}$$



روش جبری :

روش هندسی :




$$9) |x^2 - 1| \leq |x+1| \Rightarrow |x+1| \times |x-1| \leq |x+1| \Rightarrow \begin{cases} |x+1| = 0 \Rightarrow x = -1 \\ \text{or} \\ |x-1| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x-1 \leq 1 \Rightarrow 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

پس مجموعه جواب برابر $[-1] \cup [0, 2]$ است.

$$y = |x^2 - 1| \Rightarrow \begin{array}{c|cccc} x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 3 & 0 & 1 & 0 & 3 \end{array}$$

هندسی :



$$y = |x+1| \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & -2 & -1 & 0 \\ \hline y & 1 & 0 & 1 \end{array}$$


در بازه $[0, 2]$ نمودار $y = |x^2 - 1|$ زیر نمودار $y = |x+1|$ است.

البته برای علامت تساوی نقاط تقاطع دیگر یعنی $x = -1$ نیز جواب است.

$$10) |x| + |x-1| = \begin{cases} -x-x+1 & x < 0 \\ x-x+1 & 0 \leq x \leq 1 \\ x+x-1 & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} -2x+1 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x-1 & x > 1 \end{cases}$$

جبری :

$$\begin{cases} x < 0, -2x+1 \leq 5 \Rightarrow x \geq -2 \Rightarrow -2 \leq x < 0 \\ 0 \leq x \leq 1, 1 \leq 5 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1 \\ x > 1, 2x-1 \leq 5 \Rightarrow x \leq 3 \Rightarrow 1 < x \leq 3 \end{cases} \Rightarrow x \in [-2, 3]$$




$$\text{هندسی : نمودار } y = \begin{cases} -2x+1 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 2x-1 & x > 1 \end{cases} \text{ و } y = 5 \text{ رسم کنید.}$$

۱- برای هر یک از چهار عضو A دو انتخاب وجود دارد (p یا q) پس تعداد حالات برابر $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$ است.


۲- برای هر یک از m عضو A می توان n انتخاب داشت پس تعداد حالات $n \times n \times \dots \times n = n^m$ است.

۳- $x \geq -2 \Rightarrow x+2 \geq 0 \Rightarrow f(x) = \sqrt{x+2}$



۴- $f(x) = \frac{4}{3}(x-2), 2 \leq x \leq 5$
 $g(x) = \begin{cases} 2x-6 & 2 \leq x \leq 3 \\ 2x-6 & 3 < x \leq 5 \end{cases}$

تابع f یک به یک است ولی g نیست مثلا اگر $y=1$ در اینصورت $x_1 = \frac{y}{2}, x_2 = \frac{y}{2}$.





۵- مساحت لوزی نصف حاصلضرب قطرهای آن است.

$2(L+W) = 40 \Rightarrow L+W = 20 \Rightarrow L = 20 - W$
 مساحت لوزی $= f(W) = \frac{1}{2}L \times W = \frac{(20-W)W}{2}, 0 < W < 20$

۶- $x - y = 12 \Rightarrow x = y + 12 \Rightarrow xy = (y + 12)y = y^2 + 12y = f(y)$

۷- $2x + 3y = 150 \Rightarrow x = \frac{-3y + 150}{2}, S = xy = \frac{-3y^2 + 150y}{2}$



۱- الف

x	۱	۲
y	۲	۵

ب

x	-۵	۰	۵
y	۵	۰	۵

$$\frac{xy}{2} = 25 \Rightarrow xy = 50 \Rightarrow y = \frac{50}{x}$$

$$a^2 = x^2 + y^2 = x^2 + \left(\frac{50}{x}\right)^2 = f(x)$$



-۹

الف) $f(2x) = (2x)^2 = 4x^2$, $2f(x) = 2x^2 \Rightarrow f(2x) \neq 2f(x)$ نادرست

-۱۰

ب) $g(2x) = |2x| = 2|x| = 2g(x)$ درست

ج) $f(x+2) = (x+2)^2 = x^2 + 2x + 4$, $f(x) + 2 = x^2 + 2 \Rightarrow f(x+2) \neq f(x) + 2$ نادرست


د) $g(x+2) = |x+2| = |x| + 2 = g(x) + 2$ نادرست طبق نامساوی مثلثی

تذکر مهم برای رسم: برای رسم، نقاط مرزی را هر چند متعلق به دامنه نباشند را در نظر گرفته و برای

رسم نقطه را توفالی رسم می‌کنیم مثلا برای $1 < x < 2$ ، هر چند $y = x + 1$ ، در دامنه

نیست آنها را در نظر گرفته و هنگام رسم توفالی می‌کشیم. $y = x + 1 \Rightarrow \begin{array}{l|ll} x & 1 & 2 \\ y & 2 & 3 \end{array}$

$$\begin{cases} x+1=0 \Rightarrow x=-1 \\ x-1=0 \Rightarrow x=+1 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{c|cc} x & -1 & 1 \\ \hline x+1 & - & + \\ x-1 & - & - \end{array}$$



$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} -x-1-x+1 & x < -1 \\ x+1-x+1 & -1 \leq x \leq 1 \\ x+1+x-1 & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} -2x & x < -1 \\ 2 & -1 \leq x \leq 1 \\ 2x & x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l|ll} x & -1 & -2 \\ y & 2 & 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l|ll} x & -1 & 1 \\ y & 2 & 2 \end{array}$$


$$\Rightarrow \begin{array}{l|ll} x & 1 & 2 \\ y & 2 & 4 \end{array}$$

$$\Rightarrow R_f = [2, +\infty)$$

$$\begin{aligned} \text{الف)} \quad y = ax + b, \begin{cases} (-4, +1) \in f \Rightarrow 1 = -4a + b \\ (-2, 2) \in f \Rightarrow 2 = -2a + b \end{cases} &\Rightarrow -2a = -2 \Rightarrow a = 1, b = 5 \\ y = ax + b, \begin{cases} (1, -1) \in f \Rightarrow -1 = a + b \\ (6, -2) \in f \Rightarrow -2 = 6a + b \end{cases} &\Rightarrow 5a = -2 \Rightarrow a = \frac{-2}{5}, b = \frac{-2}{5} \\ \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x + 5 & -4 \leq x \leq -2 \\ +1 & -2 < x < 1 \\ \frac{-2}{5}x + \frac{2}{5} & 1 \leq x \end{cases} &\begin{cases} D_f = [-4, +\infty) \\ R_f = (-\infty, -1] \cup [1, 2] \end{cases} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{ب)} \quad y = ax + b, \begin{cases} (-2, 4) \in f \Rightarrow 4 = -2a + b \\ (-1, -1) \in f \Rightarrow -1 = -a + b \end{cases} &\Rightarrow -2a = 5 \Rightarrow a = \frac{-5}{2}, b = \frac{-7}{2} \\ y = ax + b, \begin{cases} (-1, -1) \in f \Rightarrow -1 = -a + b \\ (2, 2) \in f \Rightarrow 2 = 2a + b \end{cases} &\Rightarrow 2a = 2 \Rightarrow a = 1, b = 0 \\ \Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{-5}{2}x - \frac{7}{2} & x \leq -1 \\ x & -1 < x < 2 \\ -2 & x \geq 2 \end{cases} &\begin{cases} D_f = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R} \\ R_f = \{-2\} \cup [-1, +\infty) \end{cases} \end{aligned}$$

$$f(x) = \begin{cases} -5x - 8 & x < -2 \Rightarrow \begin{array}{r|rr} x & -2 & -4 \\ y & 2 & 12 \end{array} \\ \frac{1}{2}x + 5 & -2 \leq x \leq 4 \Rightarrow \begin{array}{r|rr} x & 0 & 4 & -1 \\ y & 5 & 7 & 4 \end{array} \\ 1 - 2x & x > 4 \Rightarrow \begin{array}{r|rr} x & 4 & 6 \\ y & 2 & -2 \end{array} \end{cases}$$



$$f(6) = 1 - 2(6) = -2, \quad f(4) = \frac{1}{2}(4) + 5 = 7$$

$$f(-4) = -5(-4) - 8 = 12, \quad f(0) = \frac{1}{2}(0) + 5 = 5$$



$$y = ax + b, \begin{cases} (0, 3) = (x, y) \Rightarrow 3 = a(0) + b \Rightarrow b = 3 \\ (5, 5) = (x, y) \Rightarrow 5 = 5a + b \Rightarrow a = \frac{2}{5} \end{cases}$$

$$y = ax + b, \begin{cases} (0, 5) = (x, y) \Rightarrow 5 = a(0) + b \Rightarrow b = 5 \\ (-2, -2) = (x, y) \Rightarrow -2 = a(-2) + b \Rightarrow a = \frac{7}{2} \end{cases} \quad -\varepsilon$$

$$\Rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}x + 3 & 0 \leq x \leq 5 \\ \frac{7}{2}x + 5 & -2 \leq x < 0 \end{cases}$$

الف) $x^2 + y^2 = 25, x = 0 \Rightarrow 0^2 + y^2 = 25 \Rightarrow y = \pm 5 \Rightarrow$ تابع نیست -۵

ب) $y = \begin{cases} x+2 & x \leq 0 \\ x+1 & x > 0 \end{cases}$ تابع هست، به ازای هر x در دامنه دقیقاً یک y وجود دارد.

ج) $y = |x| + 1$ تابع هست، به ازای هر x در دامنه دقیقاً یک y وجود دارد.


د) $x = |y| + 1, x = 2 \Rightarrow |y| = 1 \Rightarrow y = \pm 1$ تابع نیست

ه) $y^2 = x^2, x = 1 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$ تابع نیست

و) $3x + 2y = 12 \Rightarrow y = \frac{12 - 3x}{2}$ تابع هست

الف+ه) $x < 0 \Rightarrow f(x) = ax + b, \begin{cases} f(-5) = -2 \Rightarrow -5a + b = -2 \\ f(-2) = 0 \Rightarrow -2a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = 3$ -۶

ج+الف) $0 \leq x \leq 2 \Rightarrow f(x) = f(2) = 3$ $x > 2 \Rightarrow f(x) = x^2$




$$f(x) = \begin{cases} x+2 & x < 0 \Rightarrow \begin{array}{l|ll} x & -5 & -2 \\ y & -2 & 0 \end{array} \\ 2 & 0 \leq x \leq 2 \Rightarrow \begin{array}{l|ll} x & 0 & 2 \\ y & 2 & 2 \end{array} \\ x^2 & x > 2 \Rightarrow \begin{array}{l|ll} x & 2 & 2 \\ y & 4 & 4 \end{array} \end{cases} \quad \text{ادامه ۶-}$$

الف) $g(x) = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{\sin^2 x} = |\sin x| \neq \sin x = f(x) \Rightarrow f \neq g$ -۷

ب) $f(2) = 5, g(2) = 2 + 2 = 4, f(2) \neq g(2) \Rightarrow f \neq g$

ج) $D_f = D_g = R, \begin{cases} x \neq 2 \Rightarrow g(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 2} = \frac{x(x - 2)}{x - 2} = x = f(x) \Rightarrow f = g \\ x = 2 \Rightarrow g(2) = 2 = f(2) \end{cases}$

د) $D_f = D_g = R, f(x) = \frac{x^2}{1 + \sqrt{1 + x^2}} \times \frac{1 - \sqrt{1 + x^2}}{1 - \sqrt{1 + x^2}} = \frac{x^2(1 - \sqrt{1 + x^2})}{1 - 1 - x^2}$
 $= -1(1 - \sqrt{1 + x^2}) = \sqrt{1 + x^2} - 1 = g(x) \Rightarrow f = g$



۱- روش اول) $y = |x|$ را رسم، انتقال یک واحد به راست،

قرینه نمودار نسبت به محور x ها، انبساط عمودی

در امتداد محور y ها با ضریب ۳، دو واحد انتقال به بالا،

روش دوم) ابتدا نمودار $y = -3|x|$ را رسم کرده و سپس نمودار را

۱ واحد به راست و ۲ واحد به بالا انتقال می دهیم.


$$y = -3|x| \Rightarrow \begin{array}{c|cccccc} x & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & -6 & -3 & 0 & -3 & -6 \end{array}$$

(رسم با روش دوم)


*** (قرمز، نمودار پیش فرض و آبی، نمودار جواب) ***

با توجه به نمودار f داریم $f(-2) = 0, f(-1) = 2, f(1) = 2, f(2) = 0$


انقباض عمودی در امتداد محور y ها با ضریب $\frac{1}{4}$ الف



قرینه نسبت به محور y ها ب




انقباض افقی در امتداد محور x ها با ضریب $\frac{1}{4}$ ج




قرینه نسبت به محور y ها و انبساط افقی در



امتداد محور x ها با ضریب ۲



قرینه نسبت به محور x ها، انبساط عمودی در امتداد محور y ها با ضریب ۲ ه




انتقال نمودار ۲ واحد به سمت چپ (و)



$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < -1 \Rightarrow \begin{array}{l|l} x & -2 & -1 \\ \hline y & 4 & 1 \end{array} \\ |x| & -1 \leq x \leq 1 \Rightarrow \begin{array}{l|l} x & -1 & 0 & 1 \\ \hline y & 1 & 0 & 1 \end{array} \\ \sqrt{x-1} & x > 1 \Rightarrow \begin{array}{l|l} x & 1 & 2 & 5 \\ \hline y & 0 & 1 & 2 \end{array} \end{cases}$$

رسم $y = f(2x)$


انقباض افقی در امتداد محور x ها با ضریب $\frac{1}{2}$



رسم $y = f(-2x)$

قرینه نسبت به محور y ها و انقباض افقی


این نمودار در امتداد محور x ها با ضریب $\frac{1}{2}$



رسم $y = -f(2x)$

قرینه نسبت به محور x ها و انقباض افقی

در امتداد محور x ها با ضریب $\frac{1}{2}$



۴- الف) نادرست (باید ۳ واحد به چپ)

ب) نادرست، g قرینه نمودار f نسبت به محور y است. ج) درست

۵- g از انتقال f به اندازه ۲ واحد به سمت چپ و قرینه نسبت به محور x ها و آنگاه انقباض عمودی در امتداد محور y ها به اندازه $\frac{1}{2}$ و آنگاه انتقال به اندازه ۳ واحد به پایین.

$$g(x) = -\frac{1}{2}|x+2|-3$$

۶- $\sqrt{x} \rightarrow \sqrt{-x} \rightarrow \sqrt{-x-2} \rightarrow \sqrt{-x-2}-5 \Rightarrow f(x) = \sqrt{-x-2}-5$

۷- الف) $g(-8) = \frac{1}{2}f(-8) = \frac{1}{2} \times 6 = 3 \Rightarrow (-8, 3) \in g$

ب) $g(8) = f(-8) = 6 \Rightarrow (8, 6) \in g$

ج) $g(-8) = f(-8) - 2 = 6 - 2 = 4 \Rightarrow (-8, 4) \in g$

د) $g(-8) = 2f(-8) = 2 \times 6 = 12 \Rightarrow (-8, 12) \in g$

۱- الف) $g(x) = -\frac{1}{2}f(x-1)+3$ انتقال ۱ واحد به راست، قرینه نسبت به محور x ها،

انقباض عمودی با ضریب $\frac{1}{2}$ ، انتقال ۳ واحد به بالا.

ب) $g(x) = -2f(x+4)-3$ انتقال ۴ واحد به چپ، قرینه نسبت به محور x ها، انبساط

عمودی با ضریب ۲، انتقال ۳ واحد به پایین.

ج) $g(x) = -2f(x-\frac{1}{3})+1$ انتقال $\frac{1}{3}$ واحد به راست، قرینه نسبت به محور x ها، انبساط

عمودی با ضریب ۲، انتقال ۱ واحد به بالا.

۹- نقاط $f(x) = \cos(x) \Rightarrow$ را مینا گرفته و بر این نقاط دستورات


x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f(x)$	1	0	-1	0	1

زیر را اعمال و سپس با توجه به شکل کلی نمودار پیش فرض، نمودار اصلی را رسم کنید.

$f(2x)$ نمودار f منقبض به صورت افقی با ضریب $\frac{1}{2}$.

$f(\frac{1}{2}x)$ نمودار f منبسط به صورت افقی با ضریب 2 .

$-f(x)$ نمودار f قرینه نسبت به محور x ها. $f(-x)$ نمودار f قرینه نسبت به محور y ها.



۱۰- نمودار دو تابع قرینه همدیگر نسبت به محور y ها

$\cdot R\sqrt{x} = R\sqrt{-x} = [0, +\infty)$ $\cdot D\sqrt{x} = [0, +\infty)$, $D\sqrt{-x} = (-\infty, 0]$

نمودار دو تابع $f(x), f(-x)$ قرینه همدیگر نسبت به محور y ها

$\cdot Rf(x) = Rf(-x)$ $\cdot g(x) = f(-x) \Rightarrow D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid -x \in D_f\}$

توضیح: چون نمودار قرینه نسبت به محور y هاست بنابراین تصویر نمودار بر محور y ها (یعنی برد)

تغییر نمی کند ولی دامنه نسبت به محور y ها قرینه می شود.

۱۱- ابتدا نسبت به محور y ها قرینه شده سپس اگر $|a| > 1$ در امتداد محور x ها

با ضریب $\frac{1}{|a|}$ منقبض و اگر $|a| < 1$ با ضریب $\frac{1}{|a|}$ منبسط می گردد.

$$(f/g)(x) = f(x)/g(x) = \frac{5x}{3x-7} \div \frac{x^5-1}{5x-15} = \frac{25x(x-3)}{(3x-7)(x^5-1)}$$

$$\begin{cases} 3x-7=0 \Rightarrow x=\frac{7}{3} \Rightarrow D_f = R - \{\frac{7}{3}\} \\ 5x-15=0 \Rightarrow x=3 \Rightarrow D_g = R - \{3\} \Rightarrow D_{f/g} = R - \{\frac{7}{3}, 3\} \\ g(x)=0 \Rightarrow x^5-1=0 \Rightarrow x=1 \Rightarrow \end{cases} \quad -1$$

$$\text{الف) } D_f = R, D_g = R, \begin{cases} f(x)=0 \Rightarrow 4x=0 \Rightarrow x=0 \\ g(x)=0 \Rightarrow 2-x=0 \Rightarrow x=2 \end{cases} \quad -2$$

$$(g/f)(x) = g(x)/f(x) = \frac{2-x}{4x}, D_{g/f} = R \cap R \cap (R - \{0\}) = R - \{0\}$$

$$(f \cdot f)(x) = f(x) \cdot f(x) = 16x^2, D_{f \cdot f} = R \cap R = R$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = 4x - 2 + x = 5x - 2, D_{f-g} = R \cap R = R$$

$$\text{ب) } x-2=0 \Rightarrow x=2 \Rightarrow D_f = R - \{2\}, 6-x=0 \Rightarrow x=6 \Rightarrow D_g = R - \{6\}$$

جواب ندارد $f(x)=0, g(x)=0$

$$(g/f)(x) = g(x)/f(x) = \frac{1}{6-x} \div \frac{4}{x-2} = \frac{x-2}{4(6-x)}, D_{g/f} = R - \{2, 6\}$$

$$(f \cdot f)(x) = f(x) \cdot f(x) = \frac{16}{(x-2)^2}, D_{f \cdot f} = R - \{2\}$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \frac{4}{x-2} - \frac{1}{6-x} = \frac{26-5x}{(x-2)(6-x)}, D_{f-g} = R - \{2, 6\}$$

$$ج) \quad x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow D_f = [2, +\infty) \quad , \quad x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2 \Rightarrow D_g = [-2, +\infty)$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow x-2 = 0 \Rightarrow x = 2 \quad , \quad g(x) = 0 \Rightarrow x+2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

$$(g/f)(x) = g(x)/f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x-2}} \quad , \quad D_{g/f} = [-2, +\infty) \cap [2, +\infty) \cap (R - \{2\}) = (2, +\infty)$$

$$(f \cdot f)(x) = f(x) \cdot f(x) = (\sqrt{x-2})^2 = x-2 \quad , \quad D_{f \cdot f} = [2, +\infty) \cap [2, +\infty) = [2, +\infty)$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{x-2} - \sqrt{x+2} \quad , \quad D_{f-g} = [2, +\infty)$$

$$د) \quad x+3 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3 \Rightarrow D_f = [-3, +\infty) \quad , \quad x=0 \Rightarrow D_g = R - \{0\}$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow x = -3 \quad , \quad g(x) = 0 \text{ جواب ندارد}$$

$$(g/f)(x) = g(x)/f(x) = \frac{2}{x} \div \sqrt{x+3} = \frac{2}{x\sqrt{x+3}} \quad , \quad D_{g/f} = (-3, +\infty) - \{0\}$$

$$(f \cdot f)(x) = f(x) \cdot f(x) = (\sqrt{x+3})^2 = x+3 \quad , \quad D_{f \cdot f} = [-3, +\infty)$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{x+3} - \frac{2}{x} \quad , \quad D_{f-g} = [-3, +\infty) - \{0\}$$

$$f(x) = \begin{cases} 5x-7 & x \geq 1 \\ -x-1 & x < 1 \end{cases} \quad , \quad g(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x-2 & x \geq -2 \\ -1 & x < -2 \end{cases}$$

-۳

$$الف) \quad (f+g)(-4) = f(-4) + g(-4) = (4-1) + (-1) = 2$$

$$ب) \quad (f-g)(3) = f(3) - g(3) = (5(3)-7) - (-\frac{1}{2}(3)-2) = \frac{23}{2}$$

$$ج) \quad (f/g)(0) = f(0)/g(0) = (-0-1)/(-\frac{1}{2}(0)-2) = \frac{1}{2}$$

$$د) \quad (f \cdot g)\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}-1\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)-2\right) = \frac{26}{9}$$

$$ه) (f \circ g)_{\left(-\frac{1}{2}\right)} = f\left(g\left(-\frac{1}{2}\right)\right) = f\left(-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right) - 2\right) = f\left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$$

$$و) (f \circ f)_{(7)} = f(f(7)) = f(5(7) - 7) = f(28) = 5(28) - 7 = 133$$

$$D_f = N, D_g = \{1, 2, 3, 4\}, D_{2f+g} = \{1, 2, 3, 4\}, D_{g \circ f} = \{1, 2, 3, 4\} \quad -\varepsilon$$

$$(2f+g)_{(1)} = 2f(1) + g(1) = 2(2) + 2(1) = 6, (g \circ f)_{(1)} = g(f(1)) = g(2) = 2(2) = 4$$

$$(2f+g)_{(2)} = 2f(2) + g(2) = 2(3) + 2(2) = 10, (g \circ f)_{(2)} = g(f(2)) = g(3) = 2(3) = 6$$

$$(2f+g)_{(3)} = 2f(3) + g(3) = 2(5) + 2(3) = 16, (g \circ f)_{(3)} = g(f(3)) = g(5) = 2(5) = 10$$

$$(2f+g)_{(4)} = 2f(4) + g(4) = 2(7) + 2(4) = 22, (g \circ f)_{(4)} = g(f(4)) = g(7) = 2(7) = 14$$

$$f(x) = \frac{1+x^2}{1-x^2}, 1-x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow D_f = R - \{\pm 1\}$$

$$g(x) = \sqrt{x(1-x)}, x(1-x) \geq 0 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1 \Rightarrow D_g = [0, 1] \quad -\delta$$

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in [0, 1] \mid \sqrt{x(1-x)} \neq \pm 1\}$$

$$\sqrt{x(1-x)} = 1 \Rightarrow x - x^2 = 1 \Rightarrow x^2 - x + 1 = 0, \Delta = -3 < 0 \Rightarrow \text{معادله جواب ندارد}$$

$$\sqrt{x(1-x)} = -1, \sqrt{x(1-x)} \geq 0, -1 < 0 \Rightarrow \text{معادله جواب ندارد}$$

$$\Rightarrow D_{f \circ g} = \{x \in [0, 1] \mid x \in R\} = [0, 1]$$

$$\text{الف) } 2r = x \Rightarrow r = \frac{x}{2} \Rightarrow r(x) = \frac{x}{2} \quad -\zeta$$

$$\text{ب) } A(r) = \pi r^2$$

$$\text{ج) } (A \circ r)(x) = A(r(x)) = \pi r^2 = \pi \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{\pi x^2}{4}, \frac{x}{2} \text{ مساحت دایره ای به شعاع}$$

$$f + g = \{(-4, f(-4) + g(-4)), (0, f(0) + g(0)), (3, f(3) + g(3))\} \\ = \{(4, 13 + (-7)), (0, 5 + (-3)), (3, -5 + 0)\} = \{(4, 6), (0, 2), (3, -5)\} \quad -7$$

$$f - g = \{(4, 13 - (-7)), (0, 5 - (-3)), (3, -5 - 0)\} = \{(4, 20), (0, 8), (3, -5)\}$$

$$f \times g = \{(4, 13 \times (-7)), (0, 5 \times (-3)), (3, -5 \times 0)\} = \{(4, -91), (0, -15), (3, 0)\}$$

چون $g(0) = 0$ پس $D_{f/g} \cdot \notin$ بنابراین

$$f/g = \{(4, 13 \div (-7)), (0, 5 \div (-3))\} = \{(4, -\frac{13}{7}), (0, -\frac{5}{3})\}$$

۱- x فاصله زمانی از ۱۳۸۶ تا سال مورد نظر

$$f(x) = 27 + 3x \quad \text{زمان اول}$$

$$g(x) = 12 + 2x \quad \text{زمان دوم}$$

$$f(x) + g(x) = 39 + 5x \quad \text{هر روز زمان}$$

$$x = 1396 - 1386 = 10 \Rightarrow (f + g)(10) = 39 + 5(10) = 89 \quad \text{مجموع فروش پس از ده سال (میلیون)}$$

$$f(x) = x^2 + 2x + 2 = (x+1)^2 + 1$$

$$\Rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x)+1)^2 + 1, \quad (f \circ g)(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$$

$$\Rightarrow (g(x)+1)^2 + 1 = (x-2)^2 + 1 \Rightarrow g(x)+1 = \pm(x-2) \quad -9$$

$$\Rightarrow \begin{cases} g(x)+1 = x-2 \Rightarrow g(x) = x-3 \\ \text{or} \\ g(x)+1 = -x+2 \Rightarrow g(x) = -x+1 \end{cases}$$

$$f(x) = \sqrt{1-x^2}, \quad 1-x^2 \geq 0 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1 \Rightarrow D_f = [-1, 1]$$

$$g(x) = \sqrt{x}, \quad x \geq 0 \Rightarrow D_g = [0, +\infty)$$

$$D_{f+g} = D_f \cap D_g = [0, 1] \quad -10$$

$$D_{(f+g) \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_{f+g}\} = \{x \in [-1, 1] \mid \sqrt{1-x^2} \in [0, 1]\}$$

پس باید $0 \leq \sqrt{1-x^2} \leq 1$ اما می دانیم $\sqrt{1-x^2} \geq 0$ از سویی

ادامه سوال ۱۰

$\sqrt{1-x^2} \leq 1 \Rightarrow 1-x^2 \leq 1 \Rightarrow x^2 \geq 0$ که همواره برقرار است، بنابراین

$$D(f+g) \circ f = \{x \in [-1,1] \mid \sqrt{1-x^2} \in [0,1]\} = \{x \in [-1,1] \mid x \in R\} = [-1,1]$$

$$\frac{3}{4} < 1 \Rightarrow f\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{1-\frac{3}{4}}} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{3}{2} > 1 \Rightarrow f\left(f\left(\frac{3}{4}\right)\right) = f\left(\frac{3}{2}\right) = 2\left(\frac{3}{2}\right) - \frac{3}{4} = \frac{9}{4} \quad -11$$

-۱۲ الف) نادرست زیرا

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x^2-4}) = (\sqrt{x^2-4})^2 - 4 = x^2 - 8$$

$$(f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(0) = 5 \quad \text{ب) نادرست زیرا}$$

$$(f \circ g)(5) = f(g(5)) = f(9) = \sqrt{9} = 3, \quad g(2) = 2(2) - 1 = 3 \quad \text{ج) درست زیرا}$$

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x+1 \Rightarrow \begin{cases} (f \circ g)(x) = \sqrt{x+1} \\ (g \circ f)(x) = \sqrt{x}+1 \end{cases} \quad \text{د) نادرست، مثال نقض}$$

$$(f \circ g)(x) = h(x) \Rightarrow f(2x+1) = 4x^2 + 4x + 7 = 4x^2 + 4x + 1 + 6$$

$$= (2x+1)^2 + 6 \xrightarrow{2x+1 \rightarrow x} f(x) = x^2 + 6 \quad -13$$

$$f(x) = \sqrt{x^2+5}, \quad x^2+5 \geq 0 \Rightarrow D_f = R \quad -14$$

$$g(x) = \sqrt{4-x^2}, \quad 4-x^2 \geq 0 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2 \Rightarrow D_g = [-2,2]$$

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in [-2,2] \mid \sqrt{4-x^2} \in R\} = [-2,2]$$

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\} = \{x \in \mathbb{R} \mid \sqrt{x^2 + 5} \in [-2, 2]\}$$

$$-2 \leq \sqrt{x^2 + 5} \leq 2 \Rightarrow \begin{cases} \sqrt{x^2 + 5} \geq -2 \Rightarrow x \in \mathbb{R} \\ \text{and} \\ \sqrt{x^2 + 5} \leq 2 \Rightarrow x^2 + 5 \leq 4 \Rightarrow x^2 \leq -1 \Rightarrow x \in \emptyset \end{cases}$$

اشتراک دو مجموعه بالا تهی است بنابراین $D_{g \circ f} = \emptyset$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{4 - x^2}) = \sqrt{4 - x^2} + 5 = \sqrt{9 - x^2}$$

$$(g \circ f)(x) = \{\}$$

الف) $f(g(1)) = f(6) = 5$

ب) $g(f(1)) = g(3) = 2$

-۱۵

ج) $f(f(1)) = f(3) = 4$

د) $g(g(1)) = g(6) = 3$

ه) $(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(4) = 1$

و) $(f \circ g)(6) = f(g(6)) = f(3) = 4$

$(f \circ g)(4) = f(g(4)) = f(6) = 5$ ، $(f \circ g)(2) = f(g(2)) = f(4) = 5$

-۱۶

$(f \circ g)(6) = f(g(6)) = f(8) = 13$ ، $(f \circ g)(8) = f(g(8)) = f(10) = 2$

۱- شماره گذاری چپ به راست و از بالا به پایین

(a) نه زوج و نه فرد (متقارن نسبت به مبدأ و محور y هانیست)

(b) فرد (نسبت به مبدأ متقارن است)

(c) زوج (متقارن نسبت به محور y هاست)

(d) فرد (نسبت به مبدأ متقارن است)

(e) زوج (نسبت به محور y ها متقارن است)

۲- دامنه متقارن $5 - x^2 \geq 0 \Rightarrow |x| \leq \sqrt{5} \Rightarrow x \in [-\sqrt{5}, \sqrt{5}]$ (الف)

$$f(-x) = (-x)\sqrt{5 - (-x)^2} = -x\sqrt{5 - x^2} = -f(x) \Rightarrow \text{تابع فرد}$$

ب) $x^3 - 1 = 0 \Rightarrow x^3 = 1 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow D_f = R - \{1\}$

دامنه متقارن نیست چون $1 \in D_f$ ولی $-1 \notin D_f$ پس نه زوج و نه فرد است.

ج) $x > 0 \Rightarrow f(x) = 1, -x < 0 \Rightarrow f(-x) = -1 \Rightarrow f(x) = -f(x)$

ولی در تابع فرد اگر $0 \in D_f$ باید $f(0) = 0$ ولی در این مثال $f(0) = 1$ پس نه زوج نه فرد

د) $f(x) = |x| \Rightarrow D_f = R$ و دامنه متقارن $f(-x) = |-x| = |x| = f(x) \Rightarrow$ زوج

ه) $f(x) = 2x + \sin x \Rightarrow D_f = R$ دامنه متقارن

$$f(-x) = 2(-x) + \sin(-x) = -2x - \sin x = -(2x + \sin x) = -f(x) \Rightarrow \text{فرد}$$

و) $f(x) = x^2 + 2x^4 \Rightarrow D_f = R$ دامنه متقارن

$$f(-x) = (-x)^2 + 2(-x)^4 = x^2 + 2x^4 = f(x) \Rightarrow \text{زوج}$$

۳- الف) درست می دانیم $Df \pm g = Df \times g = Df \cap Dg$ و اگر دو مجموعه متقارن باشند اشتراک (و اجتماع) آنها نیز نسبت به صفر متقارن است.

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$$

$$(f \times g)(-x) = f(-x) \times g(-x) = f(x) \times g(x) = (f \times g)(x) \quad \text{ب) درست}$$

$$(f \times g)(-x) = f(-x) \times g(-x) = -f(x) \times (-g(x)) = (f \times g)(x) \quad \text{ج) نادرست زوج}$$

$$(f \times g)(-x) = f(-x) \times g(-x) = -f(x) \times g(x) = -(f \times g)(x) \quad \text{د) نادرست فرد}$$

$$\text{الف) } g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = g(x) \Rightarrow \text{زوج} \quad -۴$$

$$\text{ب) } h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{(f(x) - f(-x))}{2} = -h(x) \Rightarrow \text{فرد}$$

$$\text{ج) } f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = g(x) + h(x)$$

$$\text{د) } f(x) = (2x^3) + (-1 \cdot x^2 + 2\sqrt{1+x^2} - 5) = (h(x)) + (g(x)) \Rightarrow \text{زوج } g \text{ و فرد } h$$

$$\text{۵- } f(-x) = f(x) \text{ فرد و } f(-x) = -f(x) \text{ زوج} \quad -۵$$

$$f(x) = -f(-x) = -f(x) \Rightarrow 2f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$$

پس تابع ثابت $f(x) = 0$ با دامنه دلخواه متقارن هم زوج و هم فرد است.

چون دامنه دلخواه و متقارن است پس پیشمار تابع ثابت صفر با دامنه دلخواه متقارن موجود است که هم زوج و هم فرد باشد.

$$\text{۶- } B(-a, -b) \Rightarrow \text{فرد و } B(-a, b) \Rightarrow \text{زوج} \quad \text{ب) } B(7, -2) \Rightarrow \text{فرد و } B(7, 2) \Rightarrow \text{زوج} \quad \text{الف)}$$

$$\text{ج) } B(-5, -3) \Rightarrow \text{فرد و } B(-5, 2) \Rightarrow \text{زوج} \quad \text{د) } B\left(\frac{2}{7}, 7\right) \Rightarrow \text{فرد و } B\left(\frac{2}{7}, -7\right) \Rightarrow \text{زوج}$$

۷- در بازه های $(-\infty, -4]$, $[4, +\infty)$ نزولی، در بازه $[0, 4]$ ثابت و در $[-4, 0]$ صعودی است.

رأس سهمی $(-4, -4)$ و با توجه به مثل برافورد با محور x ها $y = (x+4)^2 - 4$ پس

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{2}x + 9 & x > 4 \\ 3 & 0 < x \leq 4 \\ \frac{3}{2}x + 3 & -2 < x \leq 0 \\ (x+4)^2 - 4 & x \leq -2 \end{cases}$$

۸- الف) $D_f = [2, +\infty)$, if $x_1, x_2 \in D_f, x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 - 2 < x_2 - 2$

$$\Rightarrow \sqrt{x_1 - 2} < \sqrt{x_2 - 2} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow \text{تابع } f \text{ اکیدا صعودی}$$

ب) $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$, if $x_1, x_2 \in D_f, x_1 < x_2 \Rightarrow \frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$

$$\Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \text{ تابع } f \text{ اکیدا نزولی زیرا}$$

$$\text{ج) } f(x) = \begin{cases} -x + 2 + \delta = -x + 7 & x \geq 2 \\ x - 2 + \delta = x + 3 & x < 2 \end{cases}$$

برای $x < 2$ تابع اکیدا صعودی \Rightarrow if $x_1 < x_2 < 2 \Rightarrow x_1 + 3 < x_2 + 3 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$

برای $x > 2$ تابع اکیدا نزولی زیرا

$$\text{if } 2 < x_1 < x_2 \Rightarrow -x_1 > -x_2 \Rightarrow -x_1 + 7 > -x_2 + 7 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

د) if $x_1 < x_2 < -5 \Rightarrow -3x_1 - 11 > -3x_2 - 11 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \Rightarrow$ f نزولی

$$\text{if } 1 \leq x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + 2 < x_2 + 2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow$$
 f صعودی

بر $(-\infty, -5)$ نزولی و بر $[-5, 1) \cup (-\frac{19}{3}, -\infty)$ نزولی و بر $[-5, +\infty)$ صعودی است.

الف) $D_f = (-\infty, 6]$, $R_f = [-3, +\infty)$

-۹

ب) $f(x) > 0 \Rightarrow x \in (-\infty, \frac{24}{5})$, $f(x) < 0 \Rightarrow x \in (\frac{24}{5}, 6)$

توضیح: معادله خط گذرنده بر نقاط $(4, 2)$ و $(6, -3)$ برابر $y = -\frac{5}{2}x + 12$ بوده و مثل

برخورد آن با محور x ها نقطه $(\frac{24}{5}, 0)$ است.


ج) صعودی $f \Rightarrow x \in [1, 4] \cup [5, 6]$

نزولی $f \Rightarrow x \in (-\infty, 1] \cup [4, 6]$


$$د) f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x+1} & x \leq 1 \Leftrightarrow y = \sqrt{ax+b}, (0, 1), (1, 0) \in f \\ \frac{1}{4}x + 1 & 1 \leq x \leq 4 \Leftrightarrow y = ax + b, (1, 0), (3, 2) \in f \\ -\frac{5}{2}x + 12 & 4 < x \leq 5 \Leftrightarrow y = ax + b, (4, 2), (5, -3) \in f \\ -3 & 5 < x \leq 6 \end{cases}$$

ه) $f(-4) = \sqrt{-(-4)+1} = \sqrt{5}$, $f(5/3) = -3$, $f(\frac{7}{2}) = \frac{1}{4}(\frac{7}{2}) + 1 = \frac{15}{8}$

ب) قرینه نمودار نسبت به مبدأ را اضافه کنید.



۱- الف) قرینه نمودار نسبت به محور x ها



۱۱- برای برقراری تساوی $f(-x) = -f(x)$ باید $a = \pm \frac{1}{2}$ زیرا $4a^2 = 1 \Rightarrow a = \pm \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} f(-x) &= \log(-x + \sqrt{(-x)^2 + 4a^2}) = \log(-x + \sqrt{x^2 + 4a^2}) \\ &= \log\left(\frac{(-x)^2 - (\sqrt{x^2 + 4a^2})^2}{-x - \sqrt{x^2 + 4a^2}}\right) = \log\left(\frac{x^2 - x^2 - 4a^2}{-(x + \sqrt{x^2 + 4a^2})}\right) = \log\left(\frac{4a^2}{x + \sqrt{x^2 + 4a^2}}\right) \\ &= -\log\left(\frac{x + \sqrt{x^2 + 4a^2}}{4a^2}\right), \quad -f(x) = -\log(x + \sqrt{x^2 + 4a^2}) \end{aligned}$$

۱۲- f زوج $\Rightarrow f(-2) = f(2) = 5, f(-1) = f(1) = 4$ و متقارن $D_f = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$D_g = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ و متقارن $g(-2) = 1 = -g(2), g(-1) = 2 = -g(1), g(0) = 0 = -g(0)$

بنابراین g فرد است. (تذکره: برای f داریم $f(0) = f(-0) = 3$)

$$f(x) = \frac{1}{x} + 2, x \neq 0 \Rightarrow D_f = R - \{0\}$$

$$g(x) = \frac{1}{x-2}, x-2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2 \Rightarrow D_g = R - \{2\}$$

$$x \in D_g \Rightarrow x \neq 2, f(g(x)) = f\left(\frac{1}{x-2}\right) = \frac{1}{\frac{1}{x-2}} + 2 = x - 2 + 2 = x \quad -1$$

$$x \in D_f \Rightarrow x \neq 0, g(f(x)) = g\left(\frac{1}{x} + 2\right) = \frac{1}{\frac{1}{x} + 2 - 2} = \frac{1}{\frac{1}{x}} = x$$

۲- در تالیف اول چون f^{-1} قرینه نمودار f نسبت به خط $y = x$ است.

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow |x_1 - 2| + 3 = |x_2 - 2| + 3 \Rightarrow |x_1 - 2| = |x_2 - 2| \quad -3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 - 2 = x_2 - 2 \Rightarrow x_1 = x_2 \\ \text{or} \\ x_1 - 2 = -(x_2 - 2) \Rightarrow x_1 + x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \text{یعنی لزوماً } x_1, x_2 \text{ مساوی نیستند.}$$


برای یک به یک شدن کافیسیت دامنه را معرود به $x > 2$ یا $x < 2$ یا $x \leq 2$ یا $x \geq 2$ کرد.
مثلا برای $x > 2$ داریم $x > 2 \Rightarrow y = |x - 2| + 3 = x - 2 + 3 = x + 1$ که $y = x + 1$ است.

$$\begin{aligned} D_f = D_g = R, x \in R \Rightarrow (f \circ g)(x) &= f(\sqrt[3]{x+5}) = (\sqrt[3]{x+5})^3 - 5 = x \\ \text{الف) } x \in R \Rightarrow (g \circ f)(x) &= g(x^3 - 5) = \sqrt[3]{x^3 - 5 + 5} = \sqrt[3]{x^3} = x \end{aligned} \quad -4$$

$$\text{ب) } f(x) = \sqrt{x-2}, g(x) = x^2 + 2, D_f = [2, +\infty), D_g = [0, +\infty)$$

$$x \in [2, +\infty) \Rightarrow (g \circ f)(x) = g(\sqrt{x-2}) = (\sqrt{x-2})^2 + 2 = x - 2 + 2 = x$$

$$x \in [0, +\infty) \Rightarrow (f \circ g)(x) = f(x^2 + 2) = \sqrt{x^2 + 2 - 2} = \sqrt{x^2} = x \quad (x \geq 0 \text{ فرض})$$



۵- $f(x) = |x| + 1$ با توجه به نمودار تابع f یک به یک نیست

و نمودار f بالای $y = x$ است. پس

اولاً f وارون پذیر نیست و $\forall x \in \mathbb{R} \quad x < f(x)$

$$f(x_1) = f(x_2), x_1, x_2 \geq -5 \Rightarrow (x_1 + 5)^2 = (x_2 + 5)^2$$

$$\frac{x_1 + 5 \geq 0}{x_2 + 5 \geq 0} \rightarrow x_1 + 5 = x_2 + 5 \Rightarrow x_1 = x_2$$

الف)

-۶

$$y = (x + 5)^2 \Rightarrow \sqrt{y} = x + 5 \Rightarrow x = \sqrt{y} - 5$$

$$\frac{x \leftrightarrow y}{\rightarrow} y = \sqrt{x} - 5 = f^{-1}(x), x \geq 0$$

$$x_1, x_2 \geq 1 \Rightarrow x_1 - 1 \geq 0, x_2 - 1 \geq 0 \quad f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow -|x_1 - 1| + 1 = -|x_2 - 1| + 1$$

$$\Rightarrow |x_1 - 1| = |x_2 - 1| \Rightarrow x_1 - 1 = x_2 - 1 \Rightarrow x_1 = x_2$$

ب)

$$y = -|x - 1| + 1, x > 1 \Rightarrow y = -x + 1 + 1 = -x + 2 \Rightarrow x = -y + 2$$

$$\frac{x \leftrightarrow y}{\rightarrow} y = f^{-1}(x) = -x + 2$$

$$ج) f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow (x_1 - 2)^2 = (x_2 - 2)^2 \Rightarrow x_1 - 2 = \pm(x_2 - 2) \not\Rightarrow x_1 = x_2$$

مثال نقض: $(2, 1), (4, 1) \in f$

$$x_1, x_2 \geq -2, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \sqrt{x_1 + 2} - 2 = \sqrt{x_2 + 2} - 2$$

$$\Rightarrow x_1 + 2 = x_2 + 2 \Rightarrow x_1 = x_2$$

د)

$$y = \sqrt{x + 2} - 2 \Rightarrow \sqrt{x + 2} = y + 2 \Rightarrow x + 2 = (y + 2)^2 \Rightarrow$$

$$x = (y + 2)^2 - 2 \xrightarrow{x \leftrightarrow y} y = f^{-1}(x) = (x + 2)^2 - 2, x \geq -2$$

$$y = \frac{3x-2}{5x-3} \Rightarrow \Delta xy - 3y = 3x - 2 \Rightarrow \Delta xy - 3x = 3y - 2$$

(روش ۱)

$$\Rightarrow x(\Delta y - 3) = 3y - 2 \Rightarrow x = \frac{3y-2}{\Delta y-3} \xrightarrow{x \leftrightarrow y} y = f^{-1}(x) = \frac{3x-2}{5x-3}$$

-۷

(روش ۲)

$$x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{3}{5} \right\}, (f \circ f)(x) = f\left(\frac{3x-2}{5x-3}\right) = \frac{3\left(\frac{3x-2}{5x-3}\right) - 2}{5\left(\frac{3x-2}{5x-3}\right) - 3} =$$

$$\frac{9x-6-10x+6}{15x-10-15x+9} = \frac{-x}{-1} = x \Rightarrow f^{-1}(x) = f(x)$$

$$f^{-1}(x) = f(x) \Rightarrow (f \circ f)(x) = f(ax+b) = a(ax+b)+b$$

$$= a^2x + ab + b = x \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 1 \\ ab + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{if } a = +1 \Rightarrow b + b = 0 \Rightarrow b = 0 \Rightarrow y = x \\ \text{if } a = -1 \Rightarrow -b + b = 0 \Rightarrow y = -x + b \end{cases}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \text{ بنابراین } f \text{ یک به یک نبوده و در نتیجه وارون پذیر نیست.}$$

$$(f \circ g)(x) = f(3x-7) = 3x-7+3 = 3x-4 \Rightarrow y = 3x-4 \Rightarrow x = \frac{y+4}{3}$$

$$\xrightarrow{x \leftrightarrow y} (f \circ g)^{-1}(x) = \frac{x+4}{3}$$

$$g(x) = 3x-7 \Rightarrow y = 3x-7 \Rightarrow x = \frac{y+7}{3} \xrightarrow{x \leftrightarrow y} g^{-1}(x) = \frac{x+7}{3}$$

$$f(x) = x+3 \Rightarrow x = y-3 \xrightarrow{x \leftrightarrow y} f^{-1}(x) = x-3$$

$$(g^{-1} \circ f^{-1})(x) = g^{-1}(x-3) = \frac{x-3+7}{3} = \frac{x+4}{3}$$

-۱۰

$$\text{الف) } D_h = \left[0, \frac{10}{\sqrt{49}}\sqrt{10}\right], R_h = [0, 100]$$


-۱۱

ب) در دو زمان متفاوت در یک ارتفاع قرار نمی گیرند.

$$y = 100 - \frac{49}{10}t^2 \Rightarrow \frac{49}{10}t^2 = 100 - y \Rightarrow t^2 = \frac{10}{49}(100 - y)$$

$$\text{ج) } \Rightarrow t = \sqrt{\frac{10}{49}(100 - y)} \xrightarrow{t \leftrightarrow y} y = h^{-1}(t) = \sqrt{\frac{10}{49}(100 - t)}, t \in [0, 100]$$

د) زمانی که سنگ در یک ارتفاع خاص قرار دارد، مشخص می کند (به ازای زمان ارتفاع سنگ را می دهد)




-۱

$$x \in [-6, 6] \Rightarrow \frac{1}{3}x \in [-2, 2]$$


-۲

$$\left\{ \begin{array}{l} -2 \leq \frac{1}{3}x < -1 \Rightarrow -6 \leq x < -3 \Rightarrow y = -2 \\ -1 \leq \frac{1}{3}x < 0 \Rightarrow -3 \leq x < 0 \Rightarrow y = -1 \\ 0 \leq \frac{1}{3}x < 1 \Rightarrow 0 \leq x < 3 \Rightarrow y = 0 \\ 1 \leq \frac{1}{3}x < 2 \Rightarrow 3 \leq x < 6 \Rightarrow y = 1 \\ \frac{1}{3}x = 2 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow y = 2 \end{array} \right.$$




$$f\left(\frac{1}{5}\right) = \left[\frac{1}{5}\right] = 0, f\left(\frac{2}{5}\right) = \left[\frac{2}{5}\right] = 0, \frac{1}{5} \neq \frac{2}{5} \Rightarrow f \text{ یک به یک نیست پس وارون پذیر نیست}$$

$$\text{الف) } y = 2[x] \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -2 \leq x < -1 \Rightarrow [x] = -2 \Rightarrow y = -6 \\ -1 \leq x < 0 \Rightarrow [x] = -1 \Rightarrow y = -3 \\ 0 \leq x < 1 \Rightarrow [x] = 0 \Rightarrow y = 0 \\ 1 \leq x < 2 \Rightarrow [x] = 1 \Rightarrow y = 3 \\ x = 2 \Rightarrow [x] = 2 \Rightarrow y = 6 \end{array} \right.$$



-۳

$$b) y = [-x] \Rightarrow \begin{cases} -2 \leq -x < -1 \Rightarrow 1 < x \leq 2 \Rightarrow [-x] = -2 \Rightarrow y = -2 \\ -1 \leq -x < 0 \Rightarrow 0 < x \leq 1 \Rightarrow [-x] = -1 \Rightarrow y = -1 \\ 0 \leq -x < 1 \Rightarrow -1 < x \leq 0 \Rightarrow [-x] = 0 \Rightarrow y = 0 \\ 1 \leq -x < 2 \Rightarrow -2 < x \leq -1 \Rightarrow [-x] = 1 \Rightarrow y = 1 \\ -x = 2 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow [-x] = 2 \Rightarrow y = 1 \end{cases}$$




۵- کمترین مقدار مثبت برای T با توجه به برقراری تساوی برای اعداد صحیح برابر $T = 1$ است.



نمودار تابع را در فاصله ای به طول دوره تناوب رسم می کنیم.

$$T = 1 \Rightarrow 0 \leq x < 1 \Rightarrow [x] = 0 \Rightarrow y = x - [x] = x - 0 = x$$

$$\Rightarrow y = x \Rightarrow \begin{array}{c|c} x & 0 \quad 1 \\ \hline y & 0 \quad 1 \end{array}$$




۶- الف) انتقال به اندازه $\frac{1}{2}$ به پائین ب) انبساط با ضریب ۲ در امتداد محور y هاو انتقال یک واحد به بالا




۷- این دو تابع برابرند.

$$y = [x - 3] \Rightarrow \begin{cases} -2 \leq x - 3 < -1 \Rightarrow [x - 3] = -2 \Rightarrow y = -2 \quad (1 \leq x < 2) \\ -1 \leq x - 3 < 0 \Rightarrow [x - 3] = -1 \Rightarrow y = -1 \quad (2 \leq x < 3) \\ 0 \leq x - 3 < 1 \Rightarrow [x - 3] = 0 \Rightarrow y = 0 \quad (3 \leq x < 4) \\ 1 \leq x - 3 < 2 \Rightarrow [x - 3] = 1 \Rightarrow y = 1 \quad (4 \leq x < 5) \\ 2 \leq x - 3 < 3 \Rightarrow [x - 3] = 2 \Rightarrow y = 2 \quad (5 \leq x < 6) \end{cases}$$



$$y = [x] - 3 \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq x < 2 \Rightarrow [x] = 1 \Rightarrow y = -2 \\ 2 \leq x < 3 \Rightarrow [x] = 2 \Rightarrow y = -1 \\ 3 \leq x < 4 \Rightarrow [x] = 3 \Rightarrow y = 0 \\ 4 \leq x < 5 \Rightarrow [x] = 4 \Rightarrow y = 1 \\ 5 \leq x < 6 \Rightarrow [x] = 5 \Rightarrow y = 2 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2 & 0 < x < 1 \\ 4 & 1 \leq x < 2 \Rightarrow f(x) = 2[x] + 2 \\ 6 & 2 \leq x < 3 \end{cases}$$



۸-

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \quad -۱$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{4}{5} \text{ (چهارم اول } \alpha) \Rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5}, \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3}{5} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{4}$$

$$\cos \beta = -\frac{5}{13}, \sin^2 \beta + \left(-\frac{5}{13}\right)^2 = 1 \Rightarrow \sin^2 \beta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$$

$$\Rightarrow \sin \beta = \pm \frac{12}{13} \text{ (چهارم سوم } \beta) \Rightarrow \sin \beta = -\frac{12}{13}, \tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = -\frac{12}{13} \div -\frac{5}{13} = \frac{12}{5}$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \left(\frac{4}{5} \times -\frac{5}{13}\right) + \left(\frac{3}{5} \times -\frac{12}{13}\right) = -\frac{56}{65}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \left(\frac{3}{5} \times -\frac{5}{13}\right) + \left(\frac{4}{5} \times -\frac{12}{13}\right) = -\frac{63}{65}$$


$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{3}{4} + \frac{12}{5}}{1 - \frac{3}{4} \times \frac{12}{5}} = \frac{\frac{63}{20}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{63}{16}$$

$$\cos(\alpha - 90^\circ) = \frac{y}{r} = \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

$$S_1 = \frac{1 \times y}{2} = \frac{\sin \alpha}{2}$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \left(r \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \left(\frac{\alpha}{2}\right) \right) = \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$$


$$S_1 = S_2 \Rightarrow \sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}$$



$$y = 2 - 6 \sin^2 x = 2 - 6 \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)$$

$$= 2 - 3 + 3 \cos 2x = 3 \cos 2x$$

$$T = \frac{2\pi}{2} = \pi \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & \frac{\pi}{4} & \frac{\pi}{2} & \frac{3\pi}{4} \\ \hline y & 3 & 0 & 3 \end{array}$$



-۳

$$\sin(\alpha + \alpha) = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha \Rightarrow \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos(\alpha + \alpha) = \cos \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \sin \alpha \Rightarrow \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

-۴

$$\tan(\alpha + \alpha) = \frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha} \Rightarrow \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

-۵

$$\sin \alpha = -\frac{12}{13}, \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \cos \alpha = -\frac{5}{13} \quad (\alpha \text{ در ربع سوم})$$

-۶

چون $\frac{\pi}{2} \leq \frac{\alpha}{2} \leq \frac{3\pi}{4}$ پس $\frac{\alpha}{2}$ در ربع دوم است.

$$\sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{2} = \frac{1 + \frac{5}{13}}{2} = \frac{9}{13} \Rightarrow \sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{9}{13}} \quad (\frac{\alpha}{2} \text{ در ربع دوم})$$

$$\cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 + \cos \alpha}{2} = \frac{1 - \frac{5}{13}}{2} = \frac{4}{13} \Rightarrow \cos \frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{4}{13}} \quad (\frac{\alpha}{2} \text{ در ربع دوم}) \Rightarrow \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = -\frac{3}{2}$$

$$\sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \left(\sin x \cos \frac{\pi}{4} + \cos x \sin \frac{\pi}{4}\right) =$$

الف)

$$\sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos x\right) = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) (\sin x + \cos x) = \sin x + \cos x$$

-۷

$$ب) (\sin x \cos x)^2 = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x = 1 + 2 \sin x \cos x = 1 + \sin 2x$$

$$ج) \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x} = \frac{2 \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)}{1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\frac{2 \sin x}{\cos x}}{\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{2 \sin x \cos^2 x}{\cos x \times (1)} = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

$$د) \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = \frac{1 - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}}{1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x}}{\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{1} = \cos 2x$$

ادامه سوال ۷

$$\begin{aligned} \text{ه) } \cos 4x &= 2\cos^2(2x) - 1 = 2(2\cos^2 x - 1)^2 - 1 \\ &= 2(4\cos^4 x - 4\cos^2 x + 1) - 1 = 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1 \end{aligned}$$

۸- پاره قطعی دلتوازه رسم و از نقطه دلتوازه بر آن عمودی به طول ۱ رسمو انتهای عمود را A می نامیم. از A به زاویه $90 - \alpha$, $90 - \beta$ نسبت به پاره قطعی AH رسم تا پاره قطعی اولیه را در B, C قطع کند. با توجه به تعریف نسبتهای مثلثاتی


$$CH = \frac{1}{\tan \beta}, \quad BH = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$$AC = \frac{1}{\sin \beta}, \quad AB = \frac{1}{\sin \alpha} \Rightarrow h = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \beta \sin \alpha}$$

$$S_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\tan \beta} + \frac{1}{\tan \alpha} \right) (1) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\sin \beta \sin \alpha} \right)$$

$$S_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sin \alpha} \right) \left(\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \beta} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \right)$$

$$S_1 = S_2 \Rightarrow \text{مکمل}$$



۹- با توجه به تعریف نسبتها و قانون سینوسها داریم .

$$AB = \cos \beta = b \cos \alpha$$


$$AC = \sin \beta, \quad AD = b \sin \alpha$$

$$\frac{\sin(90 + \alpha)}{1} = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{x} \Rightarrow x = \frac{\sin(\beta - \alpha)}{\cos \alpha}$$

$$S_{BCD} = S_{ABC} - S_{BDA}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(\beta - \alpha)}{\cos \alpha} \right) (b \cos \alpha) = \frac{1}{2} (\sin \beta) (b \cos \alpha) - \frac{1}{2} (b \sin \alpha) (\cos \beta)$$

$$\Rightarrow \sin(\beta - \alpha) = \sin \beta \cos \alpha - \sin \alpha \cos \beta$$



$$\sin x - \cos x = 1 \Rightarrow \sqrt{2} \sin(x - \frac{\pi}{4}) = 1 \Rightarrow \sin(x - \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin(\frac{\pi}{4})$$

الف) $\Rightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2} \\ \text{or} \\ x - \frac{\pi}{4} = 2k\pi + \pi - \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = 2k\pi + \pi \end{cases}$

جوابهای در بازه $[-\pi, \pi]$ عبارتند از $(-\pi, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \pi)$

$$2 \sin \theta \cdot \cos \theta + \sqrt{2} \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta (2 \sin \theta + \sqrt{2}) = 0$$

ب) $\Rightarrow \begin{cases} \cos \theta = 0 = \cos(\frac{\pi}{2}) \Rightarrow \theta = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2} \\ \text{or} \\ \sin \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin(-\frac{\pi}{4}) \Rightarrow \begin{cases} \theta = 2k\pi - \frac{\pi}{4} \\ \text{or} \\ \theta = 2k\pi + \frac{5\pi}{4} \end{cases} \end{cases}$

جوابهای در بازه $[-\pi, \pi]$ عبارتند از $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4})$

$$\tan x \cdot \tan 2x = 1 \Rightarrow \frac{\sin x \cdot \sin 2x}{\cos x \cdot \cos 2x} = 1 \Rightarrow \cos x \cdot \cos 2x - \sin x \cdot \sin 2x = 0$$

ج) $\Rightarrow \cos(2x + x) = 0 \Rightarrow \cos 3x = 0 = \cos \frac{\pi}{2} \Rightarrow 3x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} \pm \frac{\pi}{6}$

البته باید توجه داشت که جوابهای مطرح را از جوابهای به دست آمده حذف کنیم یعنی

$$\text{مجموعه جواب} = \left\{ \frac{2k\pi}{3} \pm \frac{\pi}{6} \mid k \in \mathbb{Z} \right\} - \left\{ 2k\pi \pm \frac{\pi}{2}, k\pi \pm \frac{\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$$

جوابهای در بازه $[-\pi, \pi]$ عبارتند از $(-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$ که اعداد $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ چون مطرح

راصغرمی کردند از جوابها حذف شدند.

$$g) \Delta = 1^2 - 4(2(-1)) = 9 > 0 \Rightarrow \sin t = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sin t = \frac{-1-3}{4} = -1 \Rightarrow t = 2k\pi - \frac{\pi}{2} \\ \text{or} \\ \sin t = \frac{-1+3}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow t = 2k\pi + \frac{\pi}{6} \text{ or } t = 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \end{array} \right.$$


$$\cos 2x - \cos x + 1 = 0 \Rightarrow 2\cos^2 x - 1 - \cos x + 1 = 0 \Rightarrow 2\cos^2 x - \cos x = 0$$

$$e) \Rightarrow \cos x (2\cos x - 1) = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \cos x = 0 \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2} \\ \text{or} \\ \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \end{array} \right.$$

جوابهای در بازه $[-\pi, \pi]$ عبارتند از $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$


$$\sin x + \sin 2x - \sin 2x = 0 \Rightarrow 2\sin 2x \cdot \cos x - \sin 2x = 0 \Rightarrow$$

$$g) \sin 2x (2\cos x - 1) = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sin 2x = 0 \Rightarrow 2x = k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{2} \\ \text{or} \\ \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{3} \end{array} \right.$$



جوابهای در بازه $[-\pi, \pi]$ عبارتند از $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, -\pi, \pi, -\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3})$

$$\begin{aligned} (2)^2 &= (\sqrt{2})^2 + (1+\sqrt{2})^2 - 2(\sqrt{2})(1+\sqrt{2})\cos\alpha \\ \Rightarrow 4 &= 2 + 4 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}(1+\sqrt{2})\cos\alpha \\ \Rightarrow \cos\alpha &= \frac{2(1+\sqrt{2})}{2\sqrt{2}(1+\sqrt{2})} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = 45^\circ \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} (\sqrt{2})^2 &= 2^2 + (1+\sqrt{2})^2 - 2(2)(1+\sqrt{2})\cos\beta \\ \Rightarrow 2 &= 4 + 4 + 2\sqrt{2} - 4(1+\sqrt{2})\cos\beta \\ \Rightarrow \cos\beta &= \frac{-2(2+\sqrt{2})}{-4(1+\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)}{2(1+\sqrt{2})} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \Rightarrow \beta &= 45^\circ \Rightarrow \theta = 180 - (45 + 45) = 90^\circ \end{aligned}$$

-۲

$$0 < a < 1 \Rightarrow \cos^{-1} a = \theta, \sin^{-1} a = \frac{\pi}{2} - \theta \Rightarrow \cos^{-1} a + \sin^{-1} a = \theta + \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} \quad -1$$

$$-1 < a < 0 \Rightarrow \sin^{-1} a = -\theta, \cos^{-1} a = \frac{\pi}{2} + \theta \Rightarrow \sin^{-1} a + \cos^{-1} a = -\theta + \frac{\pi}{2} + \theta = \frac{\pi}{2}$$





۲- دمثلث به حالت وتر و یک ضلع همبیشتر پس اگر

$$\sin^{-1}(x) = \theta \Rightarrow \sin^{-1}(-x) = -\theta \Rightarrow \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}(x)$$

دمثلث به حالت وتر و یک زاویه همبیشتر پس اگر

$$\cos^{-1}(x) = \theta \Rightarrow \cos^{-1}(-x) = \pi - \theta \Rightarrow \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x)$$




$$\cos \theta = x \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{1-x^2}$$

$$\Rightarrow \sin(\cos^{-1} x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\sin \theta = x \Rightarrow \cos \theta = \sqrt{1-x^2}$$

$$\Rightarrow \cos(\sin^{-1} x) = \sqrt{1-x^2}$$



-۳

$$\tan^{-1} x = \theta \Rightarrow \tan \theta = x, \sin \theta = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} \Rightarrow \sin(\tan^{-1} x) = \frac{x}{\sqrt{1 + x^2}} \quad -۴$$

$$\cos(\tan^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} \quad \text{وبه همین ترتیب}$$

- ۵- می دانیم برای تابع $y = \sin^{-1} x$ دامنه برابر $[-1, 1]$ است (دامنه متقارن) و طبق مسأله ۲ داریم
- $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}(x)$ بنابراین تابع معکوس سینوس فرد است.
- همچنین $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}(x)$ پس $y = \cos^{-1}(x)$ نه زوج و نه فرد است.
- و نیز برای $y = \tan^{-1}(x)$ دامنه برابر $(-\infty, +\infty)$ است (دامنه متقارن) و
- $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}(x)$ بنابراین تابع معکوس تانژانت فرد است.

$$x > 0 \Rightarrow \begin{cases} 0 < \tan^{-1} x < \frac{\pi}{2} \\ 0 < \tan^{-1} \frac{1}{x} < \frac{\pi}{2} \end{cases} \Rightarrow 0 < \tan^{-1} x + \tan^{-1} \frac{1}{x} < \pi \quad -۶$$

$$\cos(\tan^{-1} x + \tan^{-1} \frac{1}{x}) = \cos \theta$$

$$\Rightarrow \cos(\tan^{-1} x) \cdot \cos(\tan^{-1} \frac{1}{x}) - \sin(\tan^{-1} x) \cdot \sin(\tan^{-1} \frac{1}{x}) = \cos \theta$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \times \frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{1+(\frac{1}{x})^2}} \right) - \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \times \frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{1+(\frac{1}{x})^2}} \right)$$

$$= \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = 0 = \cos \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

الف)
$$\begin{array}{c|ccccccc} x & -0.1 & -0.01 & -0.001 & 0 & 0.001 & 0.01 & 0.1 \\ \hline y & -1.1 & -1.01 & -1.001 & ? & -0.999 & -0.99 & -0.9 \end{array}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} y = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} y = -1$

ب)
$$\begin{array}{c|ccccccc} x & -1.1 & -1.01 & -1.001 & -1 & -0.999 & -0.99 & -0.9 \\ \hline y & 2.1 & 2.02 & 2.002 & ? & 2.029 & 2.029 & 2.071 \end{array}$$

$\lim_{x \rightarrow -1^+} y = \lim_{x \rightarrow -1^-} y = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} y = 2$

ج)
$$\begin{array}{c|ccccccc} x & 1.9 & 1.99 & 1.999 & 2 & 2.001 & 2.01 & 2.1 \\ \hline y & 1.9 & 1.99 & 1.999 & ? & 4.002 & 4.02 & 4.1 \end{array}$$

در چپ و راست نابرابر پس تابع در $x = 2$ دارای حد نیست $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} y = 4, \lim_{x \rightarrow 2^-} y = 2$

د)
$$\begin{array}{c|ccccccc} x & -0.1 & -0.01 & -0.001 & 0 & 0.001 & 0.01 & 0.1 \\ \hline y & 0.994 & 0.9999 & 0.999999 & ? & 0.999999 & 0.9999 & 0.994 \end{array}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} y = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} y = 1$


ه)
$$\begin{array}{c|ccccccc} x & 0.9 & 0.99 & 0.999 & 1 & 1.001 & 1.01 & 1.1 \\ \hline y & -1/57 & -4/99 & -15/81 & ? & 15/81 & 4/99 & 1/57 \end{array}$$

تابع در $x = 1$ حد ندارد $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty, \lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$

و)
$$\begin{array}{c|ccccccc} x & -0.1 & -0.01 & -0.001 & 0 & 0.001 & 0.01 & 0.1 \\ \hline y & 0.499 & 0.49999 & 0.4999999 & ? & 0.4999999 & 0.49999 & 0.499 \end{array}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} y = 0.5 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} y = 0.5$

الف)




$$y = [x], a = 1/2 \Rightarrow y = \begin{cases} \dots & \dots \\ 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & 1 \leq x < 2 \\ \dots & \dots \end{cases} - 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1/2^+} y = \lim_{x \rightarrow 1/2^-} y = 1$$

ب)

$$a = 2, y = \begin{cases} x^2 + 1 & x < 2 \\ 6 & x = 2 \\ -x^2 + 9 & x > 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{c|cc} x & 1 & 1/5 & 2 \\ \hline y & 2 & 2/5 & 5 \end{array}$$


$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} y = 5, \lim_{x \rightarrow 2^-} y = 5 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} y = 5$$



ج)

$$a = 2, y = x - [x] = \begin{cases} \dots & \dots \\ x - 1 & 1 \leq x < 2 \\ x - 2 & 2 \leq x < 3 \\ \dots & \dots \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{c|cc} x & 1 & 2 \\ \hline y & 0 & 1 \end{array}$$


$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} y = 2, \lim_{x \rightarrow 2^-} y = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} y \text{ ندارد}$$



د)


$$a = -3, y = 1 - \sqrt{1-x}$$

$$\begin{array}{c|ccc} x & -8 & -3 & 1 \\ \hline y & -2 & -1 & 1 \end{array} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -3} y = -1$$




ه) $a=0, y = \frac{x}{|x|}, \begin{array}{c|ccc} x & -2 & -1 & 1 & 2 & 3 \\ \hline y & -1 & -1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$


$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} y = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} y$ ندارد




۳- وقتی مقدار x در آن همسایگی به a نزدیک می شود مقدار y برای هر دو تابع f, g یکسان است. یعنی اگر مقدار $f(x)$ به عددی نزدیک شود معادل آن یعنی $g(x)$ هم به همان عدد نزدیک میشود.




$\leftarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} y = 1, \lim_{x \rightarrow 2^-} y = -1$




$\lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} y = 0, 1 \notin D_f \rightarrow$



$\leftarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} y = 0, f(0) = 1$



$\lim_{x \rightarrow -1^+} y = \lim_{x \rightarrow -1^-} y = 0 = f(-1) \rightarrow$




تابع در $x=0$ دارای حد چپ برابر صفر است ولی از راست چون اعداد گویا و گنگ در بین هم پراکنده اند، مقدار تابع دو مقدار ۱، ۲ را اختیار میکنند و به هیچکدام نزدیک نمی شود.



$$x(t) = t^2 - t, t \geq 0 \Rightarrow \begin{array}{c|cccc} x & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline y & 0 & 0 & 2 & 6 & 12 \end{array}$$

$\frac{\Delta x}{\Delta t}$	$\frac{x(2/1) - x(2)}{2/1 - 2}$	$\frac{x(2/0.1) - x(2)}{2/0.1 - 2}$	$\frac{x(2/0.01) - x(2)}{2/0.01 - 2}$
answer	3/1	3/0.1	3/0.01

سرعت متوسط در نزدیکی $t=2$ به عدد ۳ نزدیک می شود
یعنی سرعت لحظه ای در لحظه $t=2$ برابر ۳ است.



۶- شیب مماس در میزان تغییرات y به میزان تغییرات x در همسایگی نقطه مورد نظر است.

$\frac{\Delta y}{\Delta x}$	$\frac{f(1.1)-f(1)}{1.1-1}$	$\frac{f(1.01)-f(1)}{1.01-1}$	$\frac{f(1.001)-f(1)}{1.001-1}$
answer	۱.۲	۱.۰۲	۱.۰۰۲

این میزان به عدد ۱ نزدیک می شود پس شیب در $(1, -1)$ برابر ۱ است.

$$A = (1, -1), m = 1, y - y_1 = m(x - x_1) \Rightarrow y + 1 = 1(x - 1) \Rightarrow y = x - 2$$

معادله مماس

$$\text{الف) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \times \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(\sqrt{x}+2)}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x}+2) = \sqrt{4}+2=4 \quad -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)}{x-1}$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1) = n-1+1 = n$$

$$\text{ج) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} + \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 + \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 = 1 + 1^2 = 2$$

$$\text{د) } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x + 2}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x + 2)}{(x+1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x + 2}{x-1} = \frac{1+1+2}{-1-1} = -2$$

$$\text{ه) } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \sqrt{x+1} = 0 \times \sin(1) = 0$$

$$\text{و) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos x) = 2$$

$$\text{ز) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - 2 \sin^2(\frac{x}{2}))}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2(\frac{x}{2})}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

$$\text{ح) } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sqrt{1 - \cos x}}{\sin \frac{x}{2}} = \frac{\sqrt{1 - \cos \pi}}{\sin \frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos 2x}{\sin x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\sin x - \cos x}$$

b)

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\sin x - \cos x} = -(\cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4}) = -\sqrt{2}$$

۲- هنگامی که x به a نزدیک می شود اگر $f(x)$ به L نزدیک شود به معنای آنست که فاصله $f(x)$ تا L کم و کمتر شده و به صفر نزدیک می شود به عبارت دیگر مقدار $f(x) - L$ به صفر

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) - L = 0 \quad \text{یعنی نزدیک می شود.}$$

۳- برای مقایسه از x که $f(x)$ مثبت است (قسمتی از نمودار که بالای محور x هست) دو تابع f یا f برابرند و برای مقایسه از x که $f(x)$ منفی است (زیر محور x ها) به جای آنکه تابع از مقایسه منفی به صفر نزدیک شود از مقایسه مثبت به صفر نزدیک می شود. پس در هر دو حالت عد برابر صفر است.

۴- برهان قلف) اگر $f + g$ در $x = a$ دارای حد باشد چون f در $x = a$ حد دارد بنا بر قضایای حد $(f + g) - f = g$ هم در $x = a$ حد دارد که خلاف فرض است.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}, g(x) = \begin{cases} -1 & x > 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}, (f+g)(x) = \begin{cases} 0 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} = 0, x \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = 1$$

-۵

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + g(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + g(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) + g(x) = 0$$

$$f(x) = |x|, g(x) = \frac{|x|}{x}, (f \cdot g)(x) = \frac{|x|^2}{x} = \frac{x^2}{x} = x, x \neq 0$$

-۶

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \text{ ندارد}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f \cdot g)(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$


-۷ بلی در اطراف صفر تعریف شده است. غیر زیرا به ازای $x = \frac{1}{2k\pi}, k \in \mathbb{Z}$ مقدار $\sin \frac{1}{x}$

برابر صفر و به ازای $x = \frac{1}{2k\pi + \frac{\pi}{2}}, k \in \mathbb{Z}$ مقدار $\sin \frac{1}{x}$ برابر ۱ می باشد و این دو عبارت


را به ازای k مناسب به هر مقداری توان به صفر نزدیک گرفت. بنابراین در همسایگی صفر به عدد ثابتی نزدیک نمی شود و حد ندارد.

$$|\sin \frac{1}{x}| \leq 1, |x| \geq 0 \Rightarrow |x| \times |\sin \frac{1}{x}| \leq |x| \times 1 \Rightarrow |x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|, \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

پس طبق قی فشرده گی $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$




الف)



$$y = |x - 1| + 2 \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 3 & 2 & 3 \end{array} \quad -1$$

تابع در تمام نقاط پیوسته است و ناپیوستگی ندارد.

ب)




$$y = x + [x] = \begin{cases} \dots & \dots \\ x & 0 \leq x < 1, \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline y & 0 & 1 \end{array} \\ x + 1 & 1 \leq x < 2, \quad \begin{array}{c|cc} x & 1 & 2 \\ \hline y & 2 & 3 \end{array} \\ x + 2 & 2 \leq x < 3, \quad \begin{array}{c|cc} x & 2 & 3 \\ \hline y & 4 & 5 \end{array} \\ \dots & \dots \end{cases}$$

تابع در تمام نقاط $x = n \in \mathbb{Z}$ ناپیوسته است.

ج)


$$y = x + |x| = \begin{cases} 2x & x \geq 0, \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline y & 0 & 2 \end{array} \\ x & x < 0, \quad \begin{array}{c|cc} x & 0 & -1 \\ \hline y & 0 & 0 \end{array} \end{cases}$$



تابع در تمام نقاط $x \in \mathbb{R}$ پیوسته است و ناپیوستگی ندارد.

د)

$$y = \begin{cases} x(x-1) & x \leq 1, \quad \begin{array}{c|ccc} x & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \hline y & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{array} \\ -x + 2 & x > 1, \quad \begin{array}{c|cc} x & 1 & 2 \\ \hline y & 1 & 0 \end{array} \end{cases}$$



ادامه سوال ۱ قسمت (د)

تابع در تمام نقاط به جز $x = 1$ پیوسته است.


یادآوری: $x(x-1) = x^2 - x = x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ پس رأس سهمی $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$ است.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} y = \lim_{x \rightarrow 1^+} x - 2a = 1 - 2a \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2 - ax + 1 = 1 - a + 1 = 2 - a \end{cases} \Rightarrow 1 - 2a = 2 - a \Rightarrow a = -1$$

۳- برای پیوستگی تساوی اشیار باید برقرار باشد که دستگاهی بدون جواب است. پس به ازای هیچ مقدار از a تابع در $x = 0$ پیوسته نیست.


$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax}{x} = a \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} y = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax}{-x} = -a \end{cases} \Rightarrow a = -a = 1$$

$f(0) = 1$



۴- تابع $x = 0 \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x^3 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

در $x = 0$ ولی در این نقطه پیوسته نیست.



۵- تابع در $x = 0$ در است ندارد و در $x = 1$ در چپ ندارد و

در این نقاط ناپیوسته است.

۶- اگر دو تابع f, g در $x = a$ پیوسته باشند یعنی $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) \quad \text{آنگاه}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) + g(a) = (f + g)(a)$$

به همین روش

$$\lim_{x \rightarrow a} (f \times g)(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x) = f(a) \times g(a) = (f \times g)(a)$$

ولی برای تقسیم اگر $g(x)$ در یک همسایگی a غیر صفر باشد آنگاه

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}$$

۷- اگر تابع f در $x = a$ پیوسته بوده و تابع g در $x = f(a)$ پیوسته باشد

آنگاه تابع $g \circ f$ در $x = a$ پیوسته است و

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = (g \circ f)(a)$$

$$\text{الف) } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{c - c}{x - a} = 0 = f'(a) \quad -1$$

$$\text{ب) } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(rx + \delta) - (ra + \delta)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x - a)}{x - a} = r = f'(a)$$

$$\begin{aligned} \text{ج) } \lim_{t \rightarrow a} \frac{x(t) - x(a)}{t - a} &= \lim_{t \rightarrow a} \frac{t^r - a^r}{t - a} = \lim_{t \rightarrow a} \frac{(t - a)(t^{r-1} + t^{r-2}a + \dots + a^{r-1})}{t - a} \\ &= a^{r-1} + a^{r-2} + \dots + a^0 = ra^{r-1} = x'(a) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{د) } \lim_{u \rightarrow a} \frac{y(u) - y(a)}{u - a} &= \lim_{u \rightarrow a} \frac{\frac{u}{\sqrt{u}} - \frac{a}{\sqrt{a}}}{u - a} = \lim_{u \rightarrow a} \frac{\frac{u + ua - a - au}{\sqrt{u}\sqrt{a}}}{u - a} \\ &= \lim_{u \rightarrow a} \frac{u - a}{(\sqrt{u})(\sqrt{a})(u - a)} = \lim_{u \rightarrow a} \frac{1}{(\sqrt{u})(\sqrt{a})} = \frac{1}{(\sqrt{a})^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ه) } \lim_{x \rightarrow a} \frac{k(x) - k(a)}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{a}}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{\sqrt{a} - \sqrt{x}}{\sqrt{xa}}}{(x - a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{a} - \sqrt{x}}{\sqrt{xa}(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-1}{\sqrt{xa}(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \frac{-1}{2a\sqrt{a}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{الف) } m = y'(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{2}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1 - x^2}{2(1+x^2)}}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-x)(1+x)}{2(1+x^2)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(1+x)}{2(1+x^2)} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2} \quad -2 \end{aligned}$$

ادامه سوال ۲ (الف)

$$x = 1 \Rightarrow y(1) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow A(1, \frac{1}{2}) \Rightarrow y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 1$$
 معادله مماس

$$m = -\frac{1}{2} \Rightarrow m' = 2 \Rightarrow y - \frac{1}{2} = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - \frac{3}{2}$$
 معادله قائم

$$m = y'(-1) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{4-x^2} - \sqrt{2}}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-x^2}{(x+1)(\sqrt{4-x^2} + \sqrt{2})}$$

ب)

$$= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(1-x)(1+x)}{(x+1)(\sqrt{4-x^2} + \sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-x}{\sqrt{4-x^2} + \sqrt{2}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = -1 \Rightarrow y(-1) = \sqrt{4-(-1)^2} = \sqrt{3} \Rightarrow m = \frac{\sqrt{2}}{2}, A(-1, \sqrt{3})$$

$$y - \sqrt{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}(x+1) \Rightarrow y = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \frac{2\sqrt{2}}{2}$$
 معادله مماس

$$m = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow m' = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}, A(-1, \sqrt{3})$$


$$\Rightarrow y - \sqrt{3} = -\sqrt{2}(x+1) \Rightarrow y - \sqrt{3} = -\sqrt{2}x - \sqrt{2} \Rightarrow y = -\sqrt{2}x$$
 معادله قائم


الف) $y(x) = 2|x+1| \Rightarrow$

x	-2	-1	0
y	2	0	2

در نقطه $A(-1, 0)$ مشتق پذیر نیست و

$$y'_+(-1) = \frac{2}{1} = 2, y'_-(-1) = \frac{-2}{1} = -2$$





$$y(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 0 \\ -x^2 + 1 & x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l|l} x & -2 \quad -1 \quad 0 \\ \hline y & 5 \quad 2 \quad 1 \end{array}$$

$$\Rightarrow \begin{array}{l|l} x & 0 \quad 1 \quad 2 \\ \hline y & 1 \quad 0 \quad -3 \end{array}$$

ادامه سوال ۳

در تمام نقاط مشتق پذیر است $y'_+(0) = y'_-(0) = 0$

ج) $y(x) = 1 - x^2 = \begin{cases} 1 - x^2 & -1 \leq x \leq 1 \\ x^2 - 1 & x > 1 \text{ or } x < -1 \end{cases}$


در نقاط $x = 1, x = -1$ مشتق پذیر نیست زیرا

$$y'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1 - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2$$

$$y'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1 - x^2 - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x)(1+x)}{x-1} = -2$$

$$y'_+(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{1 - x^2 - 0}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{(1-x)(1+x)}{x+1} = 2$$


$$y'_-(-1) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 - 1 - 0}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{(x-1)(x+1)}{x+1} = -2$$



د) $y(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ -2x + 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ -1 & x > 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l|l} x & 0 \quad 1 \\ \hline y & 1 \quad -1 \end{array}$

در نقاط $x = 0, x = 1$ مشتق پذیر نیست.

$$y'_-(0) = 0, y'_+(0) = -2, y'_+(1) = 0, y'_-(1) = -2$$




$$y_1(x) = \sqrt{x} \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & 0 & 1 & 4 & 9 \\ \hline y & 0 & 1 & 2 & 3 \end{array}, y_2 = 2x \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & 0 & 1 & 2 \\ \hline y & 0 & 2 & 4 \end{array}$$

$$y_1'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, y_2'(x) = 2, y_1'(x) = y_2'(x)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = 2 \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{16}, 2\left(\frac{1}{16}\right) + b = \sqrt{\frac{1}{16}}$$

$$\Rightarrow b = \frac{1}{4} - \frac{1}{8} = \frac{1}{8} \Rightarrow y = 2x + \frac{1}{8}$$

پس اگر به اندازه $\frac{1}{8}$ نمودار $y = 2x$ را بالا ببریم دو نمودار در $A\left(\frac{1}{16}, \frac{1}{4}\right)$ مماس خواهند شد.



۵- نمودار $g(x)$ از انتقال نمودار $f(x)$ به اندازه b واحد به بالا یا پائین به دست می آید (علامت b بنا بر این چون دو خط مماس مرسوم موازی می شوند شیب آنها تغییری نمی کند.

یعنی اگر مشتق آنها در نقطه دلخواه موجود باشد با هم برابر است.


$$g'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + b - (f(a) + b)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'(a)$$

$$m_{OA} = \frac{a^2 + 1 - 0}{a - 0} = \frac{a^2 + 1}{a}$$

$$m_{OA} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^2 + 1) - (a^2 + 1)}{x - a}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x - a)(x + a)}{x - a} = 2a \Rightarrow \frac{a^2 + 1}{a} = 2a \Rightarrow a^2 + 1 = 2a^2$$

$$\Rightarrow a = \pm 1 \Rightarrow A(1, 2), B(-1, 2)$$



$$g'(b) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{g(x) - g(b)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f(ax) - f(ab)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b} a \left(\frac{f(ax) - f(ab)}{ax - ab} \right)$$

$$= af'(ab) \Rightarrow g'(x) = af'(ax)$$

الف) $y' = 2x^2 + \frac{4}{x^5}$ ب) $y' = (2x^2 - 2x)(x - \sqrt{x} + 5) + (1 - \frac{1}{2\sqrt{x}})(x^2 - x^2 - 1) - 1$

ج) $y' = 2(4 - 2x)(x^2 + x + 5) - 2(2x + 1)(x^2 + x + 5) + (2x + 1)^2(4 - 2x)$

د) $y' = \frac{-6x^2}{(x^3 - 1)^2}$ ه) $y' = \frac{\sqrt{x} + 2 - \frac{1}{2\sqrt{x}}(x)}{(\sqrt{x} + 2)^2} = \frac{\sqrt{x} + 4}{2(\sqrt{x} + 2)^2}$


۲- موازی نیمساز ربع اول و سوم یعنی شیب برابر ۱ $(y'(x) = 1)$

$y' = 2x^2 - 2 = 1 \Rightarrow 2x^2 = 3 \Rightarrow x^2 = 1.5 \Rightarrow x = \pm 1 \Rightarrow A(1, -7), B(-1, -5)$ دو نقطه

۳- $y = -4(x^2 - 2x + 4) + 16 + 1 = -4(x - 2)^2 + 17 \Rightarrow$

x	۱	۲	۳
y	۱۳	۱۷	۱۳

مماس موازی محور x ها یعنی شیب برابر صفر پس $x = 2$



$x = 2 \Rightarrow y = -4(2 - 2)^2 + 17 = 17 \Rightarrow B(2, 17)$

فقط در نقطه B (رأس سهمی) مماس بر منحنی موازی محور x هاست.


که این نقطه ماکسیمم تابع است.

$y = x^2 \Rightarrow$

x	-۱	۰	۱
y	۱	۰	۱

تنها یک نقطه این فاصیبت را دارد.


$$\left. \begin{array}{l} y = mx + b \Rightarrow y' = m \\ y = x^2 \Rightarrow y' = 2x \end{array} \right\} \Rightarrow 2x = m \Rightarrow x = \frac{m}{2}$$



ادامه سوال ۴

$$y = \sqrt{|x|} \Rightarrow \frac{x}{y} \begin{array}{c|c} -4 & -1 & 0 & 1 & 4 \\ \hline 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} y = mx + b \Rightarrow y' = m \\ y = \sqrt{|x|} \Rightarrow y' = \frac{|x|}{2x\sqrt{|x|}}, x \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \text{if } m > 0 \Rightarrow x > 0 \Rightarrow x = \frac{1}{4m^2} \\ \text{if } m < 0 \Rightarrow x < 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{4m^2} \end{cases}$$



اگر m مثبت باشد مثل برافورد طول مثبت و
اگر m منفی طول مثل برافورد منفی است.

در هر صورت تنها یک نقطه دارای خاصیت مفروض است.

$$y = x^2 \Rightarrow \frac{x}{y} \begin{array}{c|c} -1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 \end{array}$$


$$m = \frac{y-a^2}{x-a} = 2a \Rightarrow y = 2ax - a^2 \quad ①$$

$$m' = \frac{y-b^2}{y-b} = 2 \Rightarrow y = 2bx - b^2 \quad ②$$

$$m \times m' = -1, \quad ①, \quad ② \Rightarrow 2a \times 2b = -1 \Rightarrow ab = -\frac{1}{4} \quad ③$$

پس باید مقادیر a, b را چنان یافت که $ab = -\frac{1}{4}$ که بیشمار جواب دارد. در این صورت

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{a+b}{2} \\ y = ab = -\frac{1}{4} \end{array} \right. \text{ داریم, شامل دستگاه شامل } y = -\frac{1}{4} \text{ است.}$$



$$\left(\frac{1}{f}\right)'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{1}{f}\right)(x) - \left(\frac{1}{f}\right)(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(a)}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(a) - f(x)}{f(x)f(a)}}{\frac{x - a}{1}} \quad -۶$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{-(f(x) - f(a))}{f(x)f(a)(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-1}{f(x)f(a)} \times \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = -\frac{1}{f(a)^2} \times f'(a)$$

$$f(x)^k = x \Rightarrow (f(x)^k)' = (x)' \Rightarrow kf'(x)f(x)^{k-1} = 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = \frac{1}{k f(x)^{k-1}} = \frac{1}{k x^{\frac{k-1}{k}}} = \frac{1}{k} x^{\left(\frac{1}{k} - 1\right)} \quad -۷$$

$$r > 0, r = \frac{m}{n} \Rightarrow (x^r)' = (x^{\frac{m}{n}})' = \left((x^{\frac{1}{n}})^m\right)' = m(x^{\frac{1}{n}})'(x^{\frac{1}{n}})^{m-1}$$

$$= m \left(\frac{1}{n}\right) (x^{\frac{1}{n}-1}) (x^{\frac{m-1}{n}}) = \frac{m}{n} x^{\frac{m-1}{n}} = rx^{r-1} \quad -۸$$

$$r < 0, r = \frac{m}{n} \Rightarrow (x^r)' = ((x^{-r})^{-1})' = (-1)(x^{-r})'(x^{-r})^{-2}$$

$$= (-1)((-r)(x^{-r-1})(x^{2r})) = rx^{r-1}$$

$$y = 6x^{\frac{1}{3}} - 2x^{\frac{1}{4}} \Rightarrow y' = 6\left(\frac{1}{3}\right)(x)^{\frac{1}{3}-1} - 2\left(\frac{1}{4}\right)(x)^{\frac{1}{4}-1}$$

$$\Rightarrow y' = 2x^{-\frac{2}{3}} - \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{4}} = \frac{2}{\sqrt{x^{\frac{2}{3}}}} - \frac{1}{2\sqrt[4]{x^{\frac{3}{4}}}} \quad -۹$$

$$\left. \begin{aligned} s &= \pi R^2 \\ P &= 2\pi R \Rightarrow R = \frac{P}{2\pi} \end{aligned} \right\} \Rightarrow S = \pi \left(\frac{P}{2\pi} \right)^2 = \frac{P^2}{4\pi} \Rightarrow S' = \frac{P}{2\pi}$$

$$S_0 = \pi = \pi R_0^2 \Rightarrow R_0 = 1 \Rightarrow P_0 = 2\pi(1) = 2\pi \Rightarrow S' = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

الف) $\frac{4}{3}\pi R^3 = 2t \Rightarrow R^3 = \frac{3}{2}t \Rightarrow R = \sqrt[3]{\frac{3}{2}t} = \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \cdot \sqrt[3]{t} \Rightarrow R(t) = \sqrt[3]{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{2\pi t^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{4\pi t^2}}$

ب) $S = 4\pi R^2 = 4\pi \left(\sqrt[3]{\frac{3}{2}t} \right)^2 = 4\pi \left(\frac{3}{2}t \right)^{\frac{2}{3}} \Rightarrow S(t) = 4\pi \left(\frac{3}{2}t \right)^{\frac{2}{3}} = 4\sqrt[3]{\frac{\pi}{2t}}$

ج) $S = 4\pi R^2 \Rightarrow R^2 = \frac{S}{4\pi} \Rightarrow R = \sqrt{\frac{S}{4\pi}} \Rightarrow R(S) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \left(\frac{S}{4\pi} \right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4\sqrt{\pi S}}$

د) $S = 4\pi R^2 \Rightarrow S(R) = 4\pi R^2, 4500 \cdot \pi = \frac{4}{3}\pi R^3 \Rightarrow R = \sqrt[3]{3375} = 15$
 $\Rightarrow S(R) = 4\pi(15) = 120\pi$

الف) $S(t) = 25t - \frac{5}{2}t^2 = -\frac{5}{2}(t-5)^2 + \frac{125}{2} \Rightarrow$

t	4	5	6
S(t)	60	125/2	60


دامنه اعتبار تابع از $t=0$ تا توقف کامل یعنی $S(t)=0$ است که

$D_S = [0, +5]$ پس $S(t) = 25 - 5t = 0 \Rightarrow t = 5$

ب) $V = S'(t) = 25 - 5t = 0, t=0 \Rightarrow V = 25 - 5(0) = 25 \text{ m/s}$

ج) $V = 0 \Rightarrow 25 - 5t = 0 \Rightarrow t = 5$

د) $t = 5 \Rightarrow S(5) = 25(5) - \frac{5}{2}(5)^2 = \frac{125}{2} = 62.5$



۴- الف) $300 = 3 \times 100$ متر فاصله را در نه دقیقه طی کرده است.

ب) 100 متر را در دو دقیقه طی کرده است پس $\frac{100}{2} = 50$ یعنی سرعت 50 متر بر دقیقه است.

ج) ایستاره بوده است چون مسافتی طی نشده است.

د) 100 متر را در یک دقیقه طی کرده پس با سرعت 100 متر بر دقیقه به طرف خانه اش حرکت کرده است. (دوید)

ه) دم در خانه اش ایستاده بوده و برای خودش آواز می خوانده است.

و) چون 300 متر را در 2 دقیقه طی کرده است، می توان گفت با سرعت متوسط 150 متر در دقیقه به طرف مدرسه می دویده است.

ز) دم در مدرسه ایستاده و منتظر بوده بیند آیا معلم ریاضی می آید یا نه !!!

الف) $y' = 2 \cos 2x$ ب) $y' = \tan \frac{x}{2} + \frac{x}{2} (1 + \tan^2 \frac{x}{2})$ -۱

ج) $y' = 2(\cos 2x)(2 \sin^2 2x) = 2 \sin 4x \cdot \sin 2x$ د) $y' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$

ه) $y = \frac{1}{\cot x + 1} \Rightarrow y' = -1(-1)(1 + \cot^2 x)(\cot x + 1)^{-2} = \frac{1 + \cot^2 x}{(1 + \cot x)^2}$

و) $y' = \frac{(2x - \sin 2x)(1 + \cos^2 x) + \sin 2x(x^2 - \sin^2 x)}{(1 + \cos^2 x)^2}$

$$y'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-2 \sin(\frac{x+a}{2}) \cdot \sin(\frac{x-a}{2})}{2(\frac{x-a}{2})} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} -\sin(\frac{x+a}{2}) \cdot \frac{\sin(\frac{x-a}{2})}{(\frac{x-a}{2})} = -\sin(\frac{a+a}{2}) \times 1 = -\sin a$$

-۲

$y = \sin x \Rightarrow y' = \cos x, x = 0 \Rightarrow \cos 0 = 1 = m = \tan \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

$y = \tan x \Rightarrow y' = 1 + \tan^2 x, x = 0 \Rightarrow 1 + \tan^2 0 = 1 = m = \tan \theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$

-۳

$y = \sin 2x \Rightarrow y' = 2 \cos 2x = 0$ موازی محور x ها است چون شیب صفر است. -۴

$\cos 2x = 0 \Rightarrow 2x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{2} \pm \frac{\pi}{4} \Rightarrow A(\frac{2k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, 1), B(\frac{2k\pi}{2} - \frac{\pi}{4}, -1)$

$y = \sin x + \cos x$

۰- شیب خط $y = 2x - 1$ برابر ۲ است.

$\Rightarrow y' = \cos x - \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x + \frac{\pi}{4}) = 2 \Rightarrow \cos(x + \frac{\pi}{4}) = 2\sqrt{2} > 1$ معادله جواب ندارد.

۶- شیب خط $y = mx + 2$ برابر m است و

$$y = \tan 2x \Rightarrow y' = 2(1 + \tan^2 2x) = \frac{2}{\cos^2 2x} = m$$

$$\Rightarrow \cos^2 2x = \frac{2}{m}, \quad 0 \leq \cos^2 2x \leq 1 \Rightarrow 0 \leq \frac{2}{m} \leq 1 \Rightarrow m \geq 2$$

$$y = 1 + 2 \sin^2 2x = 1 + 2\left(\frac{1 - \cos 4x}{2}\right) = 2 - \cos 4x \Rightarrow y' = 4 \sin 4x \quad -7$$

پس حرکت این متحرک به صورت تناوبی با دوره تناوب $T = \frac{2\pi}{4} = \pi$ است.

$$y' = 0 \Rightarrow 4 \sin 4x = 0 \Rightarrow 4x = k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi}{4} \Rightarrow A\left(\frac{k\pi}{4}, 1\right) \text{ or } B\left(\frac{k\pi}{4}, 2\right)$$

$$y'_{max} = 4, \quad \sin 4x = \pm 1 \Rightarrow 4x = k\pi + \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = (2k + 1)\frac{\pi}{4}$$

$$\text{الف) } y' = \frac{2x(1+x^2) - 2x(x^2)}{(1+x^2)^2} \times \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}} = \frac{x}{(1+x^2)^2} \sqrt{\frac{1+x^2}{x^2}} \quad -1$$

تابع در $x=0$ مشتق پذیر نیست.

$$\text{ب) } f(t) = \cos \sqrt[3]{t} \Rightarrow f'(t) = \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} \times -\sin \sqrt[3]{t} = -\frac{\sin \sqrt[3]{t}}{3\sqrt[3]{t^2}} \quad \text{در } t=0 \text{ مشتق پذیر نیست.}$$

$$\text{ج) } g(\alpha) = \sqrt[5]{1+\tan \alpha} \Rightarrow g'(\alpha) = (1+\tan^2 \alpha) \left(\frac{1}{5\sqrt[5]{(1+\tan \alpha)^4}} \right) = \frac{1+\tan^2 \alpha}{5\sqrt[5]{(1+\tan \alpha)^4}}$$

اگر $\tan \alpha = -1$ یعنی $\alpha = k\pi - \frac{\pi}{4}$ مشتق پذیر نیست.

البته در $\alpha = k\pi + \frac{\pi}{2}$ مشتق پذیر نیست که جزء دامنه نمی باشد.

$$y(\alpha) = \tan^2 \left(\frac{\pi}{3} + \sin^{-1} \alpha \right)$$

$$\Rightarrow y'(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{1-\alpha^2}} (1+\tan^2 \left(\frac{\pi}{3} + \sin^{-1} \alpha \right)) (2 \tan \left(\frac{\pi}{3} + \sin^{-1} \alpha \right))$$

اگر $\alpha = \pm 1$ تابع مشتق پذیر نیست.

البته در $\alpha = \frac{1}{2}$ مشتق پذیر نیست که جزء دامنه نمی باشد.

$$\text{د) } x(t) = \sqrt{1+\sqrt{1+t^2}} \Rightarrow x'(t) = 2t \left(\frac{1}{2\sqrt{1+t^2}} \right) \left(\frac{1}{2\sqrt{1+\sqrt{1+t^2}}} \right) = \frac{t}{2\sqrt{1+t^2} \cdot \sqrt{1+\sqrt{1+t^2}}}$$

زیرا اریکالها مثبت و مفرج هیچگاه صفر نمی شود پس در تمام نقاط مشتق پذیر است.

$$k(z) = \sqrt{1 + \cos^2 \sqrt{1+z^2}}$$

$$g) \Rightarrow k'(z) = 2z \left(\frac{1}{2\sqrt{1+z^2}} \right) (-\sin \sqrt{1+z^2}) (2 \cos \sqrt{1+z^2}) \left(\frac{1}{2\sqrt{1+\cos^2 \sqrt{1+z^2}}} \right)$$


$$\Rightarrow k'(z) = \frac{-z \sin 2\sqrt{1+z^2}}{2\sqrt{1+z^2} \cdot \sqrt{1+\cos^2 \sqrt{1+z^2}}}$$

زیر اذیکالها مثبت و مخرج هیچگاه صفر نمی شود پس در تمام نقاط مشتق پذیر است.

$$f'(\cdot) = \lim_{x \rightarrow \cdot} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \cdot} \sin \frac{1}{x}$$

و چون نرارد

$$g'(\cdot) = \lim_{x \rightarrow \cdot} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \cdot} x \cdot \sin \frac{1}{x} = \cdot$$



(زیرا $-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \Rightarrow -x \leq x \cdot \sin \frac{1}{x} \leq x$ و در دو طرف نامساوی صفر است)

پس طبق قضیه فشردگی $\lim_{x \rightarrow \cdot} x \sin \frac{1}{x} = \cdot$

$$D_f = [-\infty, +\infty] = \mathbb{R}, \quad R_f = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$T = 2\pi \Leftrightarrow f(x + 2\pi) = \sin^{-1}(\sin(x + 2\pi)) = \sin^{-1}(\sin(x)) = f(x)$$

-۳


$$f(x) = \sin^{-1}(\sin x) \Rightarrow$$

x	$-\frac{\pi}{2}$	\cdot	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π	$\frac{5\pi}{2}$	3π
y	$-\frac{\pi}{2}$	\cdot	$\frac{\pi}{2}$	\cdot	$-\frac{\pi}{2}$	\cdot	$\frac{\pi}{2}$	\cdot

ادامه سوال ۳ در نقاطی که $x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$ مشتق ناپذیر است.


در نقاطی که $(4k-1)\frac{\pi}{2} < x < (4k+1)\frac{\pi}{2}$ شیب +۱ است پس $f'(x) = +1$

در نقاطی که $(4k+1)\frac{\pi}{2} < x < (4k+3)\frac{\pi}{2}$ شیب -۱ است پس $f'(x) = -1$



$$\tan \alpha = \frac{1}{x} \Rightarrow \alpha = \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right), D_{\alpha(x)} = R, R_{\alpha(x)} = (0, \pi)$$

$$\alpha'(x) = -\frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{1}{x}\right)^2} \right) = -\frac{1}{x^2} \left(\frac{x^2}{x^2 + 1} \right) = -\frac{1}{x^2 + 1}$$



مقدار α ب افزایش x کاهش می یابد و علامت $\alpha'(x)$ همواره منفی بنابراین تابع آکیدا نزولی.

$$L^2 = 2^2 + 4^2 - 2(2 \times 4) \cos \alpha = 20 - 16 \cos \alpha, 0 < \alpha < 180$$

الف)

$$\Rightarrow D_{L(\alpha)} = (0, 180), L = \sqrt{20 - 16 \cos \alpha}, L > 0 \Rightarrow R_{L(\alpha)} = (0, +\infty)$$

نکته چون $\cos \alpha \leq 1$ بنابراین $20 - 16 \cos \alpha > 0$ همواره برقرار است.

ب) $L^2 = 20 - 16 \cos \alpha \Rightarrow \cos \alpha = \frac{20 - L^2}{16} \Rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{20 - L^2}{16}\right)$

$$\sin(180 - \alpha) = \frac{h}{2} \Rightarrow h = 2 \sin \alpha, S = \frac{4 \times h}{2} = 2h = 4 \sin \alpha$$

ج)

$$\Rightarrow S(\alpha) = 4 \cos \alpha \Rightarrow \begin{cases} 0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \Rightarrow S(\alpha) > 0 \\ \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi \Rightarrow S(\alpha) < 0 \end{cases}$$